


Lehrbuch

der

elementaren Mathematik

von

Victor Schlegel,
Oberlehrer am Gymnasium in Waren.



Dritter Theil.

Trigonometrie.

(Mit einer vierstelligen Logarithmentafel.)


Wolfenbüttel

Druck und Verlag von Julius Zwissler.

1880.

Für den Schulgebrauch wird empfohlen, die Logarithmentafel separat
binden zu lassen.

1085
142 F
157 a



Trigonometrie.

Lehrbuch
der
elementaren Mathematik

von
Victor Schlegel,
Oberlehrer am Gymnasium in Waren.

~~~~~  
**Dritter Theil.**  
Trigonometrie.

(Mit einer vierstelligen Logarithmentafel.)

---

**Wolfenbüttel**  
Druck und Verlag von Julius Zwissler.  
1880.







## Vorrede.

Bei der Bearbeitung des vorliegenden, die Trigonometrie enthaltenden Theils meines Lehrbuches habe ich mich im Wesentlichen an den von H. Grassmann in seinem „Lehrbuch der Trigonometrie“ (Berlin 1865 b. Enslin) befolgten Gang angeschlossen, der durch langjährige Erfahrung als erprobt gelten kann. Zu den Eigenthümlichkeiten dieses Ganges gehört die Beschränkung der anfänglichen Betrachtung auf den Cosinus, der deswegen vorangestellt zu werden verdient, weil in dem Verhältniss, durch welches er dargestellt wird, nur Stücke der Schenkel des Winkels vorkommen, und weil bei der Erweiterung des Funktionsbegriffes auf stumpfe Winkel beim Cosinus die Zeichenbestimmung auf das Einfachste erfolgt. Ferner die Zurückführung aller übrigen Funktionen auf die Funktion des Cosinus, wodurch die Ableitung aller übrigen Formeln aus einer einzigen, geometrisch herzustellenden Formel ermöglicht wird. Bei der Berechnung der Dreiecke habe ich alle Vortheile zu benutzen gesucht, welche durch feststehende und durch abgekürzte Bezeichnungen erreicht werden können. Als sehr nützlich kann ich auch die Ausführung aller dieser Rechnungen nach dem Schema empfehlen, welches S. 68 und 69 angewendet ist, weil es die Uebersichtlichkeit der Rechnung und die Bequemlichkeit des Nachrechnens ungemein erhöht. Auf den analytischen Zusammenhang der verschiedenen Fälle, auf welchen Diekmann neuerdings hingewiesen hat (Programm Essen 1877), ist dabei durch Nr. 49 gebührend Rücksicht genommen, allerdings ohne Benutzung des für diese einfachen Aufgaben mir überflüssig erscheinenden Determinanten-Apparates. Vierecke und sonstige Polygone habe ich nicht in Betracht gezogen. Dieselben scheinen mir unter den Aufgaben eine passendere Stelle zu finden, als im Texte des Lehrbuches. Einiges über Vierecke findet man in den Aufgaben 396—405. Dagegen ist die trigonometrische Lösung der quadratischen und cubischen Gleichung vollständig durchgeführt.

Im Ganzen fasse ich die Trigonometrie nicht so ausschliesslich von der geometrischen Seite auf, wie es in den meisten Lehrbüchern geschieht, sondern betrachte sie nur als eine Anwendung der allgemeinen Funktionslehre auf die Geometrie. Dies darzuthun, dient der Abschnitt „Die Winkelfunktionen in trans-



## VI

cendenter und Reihenform“ (S. 25—40). Zur richtigen Beurtheilung der trigonometrischen Funktionen scheint es mir äusserst wichtig, dass der Lernende die eine oder andere jener Reihen kennen lerne und so einen Einblick gewinne in den Zusammenhang zwischen algebraischen und transcendenten Funktionen. Dass man dabei Gelegenheit hat, die Berechnung der Logarithmen und der Zahl  $\pi$  in so äusserst einfacher Form kennen zu lernen, halte ich ebenfalls für ein beachtenswerthes Moment. Der wichtigste Grund für die Hinzufügung eines solchen Abschnittes scheint mir aber der zu sein, dass erst durch ihn die Arithmetik ihren vollständigen Abschluss erhält, ebenso wie die Lehre von den Gleichungen (wenigstens für Schulzwecke) durch die trigonometrischen Auflösungsmethoden.

Was endlich die dem Buche hinzugefügte Logarithmentafel betrifft, so darf ich mich hinsichtlich des Gebrauchs vierstelliger Logarithmen überhaupt auf die empfehlenden Worte Bremikers (in dem Vorwort zu seiner vierstelligen Logarithmentafel, Berlin 1874 bei Weidmann) berufen. Ueber die trigonometrische Tafel habe ich noch Folgendes zu bemerken: Ich konnte mich nicht entschliessen, die Bremiker'sche Eintheilung des Grades in 100 Theile zu adoptiren. So lange die Decimaltheilung nicht auch auf den Vollwinkel ausgedehnt wird, scheint mir eine theilweise Durchführung derselben unzweckmässig. Ich glaube aber überhaupt nicht, dass auf dem, dem bürgerlichen Leben ganz fernstehenden, Gebiete der Winkelmessung die Decimaltheilung jemals durchgeführt werden wird, weil ihre Vortheile zu den alsdann nöthigen Umrechnungen (allein auf astronomischem Gebiete!) in gar keinem Verhältniss ständen. — Andererseits glaubte ich die Logarithmen in so enger Aufeinanderfolge geben zu sollen, dass die Interpolation der Proportionaltheile möglichst vereinfacht wird. Im Uebrigen kann ich auf die Einleitung zu den Tafeln selbst verweisen.

Möge auch dieser Theil des Werkes sich einer wohlwollenden Aufnahme erfreuen.

Waren im August 1879.

V. Schlegel.



# Inhalt des dritten Theils.

## Einleitung (1—5).

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Der Begriff der Funktion (1—5) . . . . . | Seite<br>1 |
|------------------------------------------|------------|

## Reine Trigonometrie.

### A. Die Winkelfunktionen als geschlossene Ausdrücke (6—33).

#### I. Funktionen spitzer Winkel (6—19).

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. Der Cosinus (6—11) . . . . . | 4 |
|---------------------------------|---|

6. 7. Einleitung. — 8. Erklärung. — 9. Die Cosinus von Complementwinkeln. — 10. Cosinus der Summe zweier spitzer Winkel. Cosinus des Doppelten eines Winkels. Cosinus der Hälfte eines Winkels. — 11. Berechnung der Cosinus spitzer Winkel. Tafel der Cosinus der spitzen Winkel von  $\frac{1}{2}$  zu  $\frac{1}{2}$  Grad.

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 2. Die übrigen Funktionen (12—19) . . . . . | 10 |
|---------------------------------------------|----|

12. Vorbemerkung. — 13. a) Der Sinus. b) Die Tangens. c) Die Secans, Cosecans, Cotangens. — 14. Eintheilung der Funktionen nach ihrem Zusammenhange. a) Coordinirte, b) Reciproke Funktionen. — 15. Eintheilung der Funktionen nach ihrem Wachsthum. — 16. Die Grenzwerte der Funktionen eines spitzen Winkels. — 17. Bestimmung von Winkeln und Funktionen durch einander. — 18. Berechnung von Funktionen spitzer Winkel. Funktionen der Winkel von  $60^\circ$ ,  $45^\circ$ ,  $72^\circ$ . — 19. Geometrische Darstellung der Funktionen eines spitzen Winkels.

#### II. Funktionen beliebiger Winkel (20—33).

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 1. Der Cosinus (20—25) . . . . . | 16 |
|----------------------------------|----|

20. Vorbemerkung. — 21. Erklärung. — 22. Die Cosinus von Supplementwinkeln. — 23. Die Cosinus der Grenzwinkel  $2R$ ,  $3R$ ,  $4R$ . — 24. Product zweier Cosinus. — 25. Cosinus der Summe zweier Winkel.

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 2. Die übrigen Funktionen (26—33) . . . . . | 21 |
|---------------------------------------------|----|

26. Vorbemerkung. — 27. Erklärungen. — 28. Beziehungen zwischen den Funktionen zweier von einander abhängiger Winkel. a) Complementwinkel. b) Supplementwinkel. c) Entgegengesetzte Winkel. — 29. Funktionen der Grenzwinkel  $2R$ ,  $3R$ ,  $4R$ . — 30. Funktionen der Summe und der Differenz zweier Winkel. — 31. Funktionen des Doppelten eines Winkels. — 32. Funktionen der Hälfte eines Winkels. — 33. Summe und Differenz zweier Sinus oder zweier Cosinus.

### B. Die Winkelfunktionen

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| in transcendenter und Reihenform (34—44) . . . | 25 |
|------------------------------------------------|----|

34. Vorbemerkung. — 35. Darstellung der Funktion  $a^x$  in Reihenform. — 36. Die Zahl  $e$ . — 37. Die Funktionen  $\cos$  und  $\sin$  in transcendenter und in Reihenform. — 38. Die Funktionen des Logarithmus und der Wurzel. —



39. Die inversen trigonometrischen Funktionen. — 40. Die Funktion *arcustangens* in Reihenform. — 41. Zusammenhang zwischen den Funktionen *log* und *arctg*. — 42. Die logarithmische Reihe. — 43. Berechnung von Logarithmen. — 44. Berechnung von  $\pi$ .

## Angewandte Trigonometrie.

### A. Die Berechnung der Dreiecke (45—61).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I. Das rechtwinklige Dreieck (45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41 |
| II. Das schiefwinklige Dreieck (46—61)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42 |
| 46. Vorbemerkung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 1. Erste Methode (47—49)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42 |
| a) Geometrisches Verfahren. — 47. Der Sinussatz. — 48. Der Cosinussatz. — 49. b) Algebraisches Verfahren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 2. Zweite Methode (50—61)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45 |
| a) Der Satz vom umbeschriebenen Kreise. — 50. Vorbemerkung. — 51. Anwendung des Satzes vom umbeschriebenen Kreise. — b) Der Tangentialsatz. — 52. Vorbemerkung. — 53. Ableitung des Tangentialsatzes aus dem Sinussatz. — 54. Anwendung des Tangentialsatzes. — c) Der Satz vom einbeschriebenen Kreise. — 55. Vorbemerkung. — 56. Bestimmung von $\rho$ durch die Seiten des Dreiecks. — 57. Ableitung des Satzes vom einbeschriebenen Kreise aus dem Cosinussatz. — 58. Anwendung des Satzes vom einbeschriebenen Kreise. — 59. Formeln zur Berechnung der Fläche eines Dreiecks. — 60. Erweiterung. Der Satz vom anbeschriebenen Kreise. — 61. Berechnung des Dreiecks aus anderen Stücken als Seiten und Winkeln. |    |

### B. Die Auflösung von Gleichungen (62—68).

|                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I. Die Gleichung vom zweiten Grade (62—65)                                                                                                                                                                                                    | 55 |
| 62. Vorbemerkung. — 63. Erster Fall: $x^2 + ax = +b$ . — 64. Zweiter Fall: $x^2 + ax = -b$ . — 65. Reduction der algebraischen Lösung der gemischt-quadratischen Gleichung auf die trigonometrische Form.                                     |    |
| II. Die Gleichung vom dritten Grade (66—68)                                                                                                                                                                                                   | 59 |
| 66. Erster Fall: $y^3 - 3py = 2q$ ; ( $p^3 > q^2$ ). — 67. Reduction der algebraischen Lösung der cubischen Gleichung auf die trigonometrische Form. Zweiter Fall: $y^3 - 3py = 2q$ ; ( $p^3 < q^2$ ). — 68. Dritter Fall: $y^3 + 3py = 2q$ . |    |
| Uebersicht der Formeln und Regeln                                                                                                                                                                                                             | 64 |

## A n h a n g.

|                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Uebungssätze und Aufgaben                                                                                  | 72 |
| Rationale Dreiecke                                                                                         | 80 |
| 1. Rechtwinklige Dreiecke. — 2. Schiefwinklige Dreiecke. — 3. Methode zur Aufstellung rationaler Dreiecke. |    |
| Register                                                                                                   | 87 |
| Berichtigungen                                                                                             | 87 |
| Tafel vierstelliger Logarithmen                                                                            | 91 |



# Einleitung.

## Der Begriff der Funktion.

1. Wenn zwischen zwei mathematischen Grössen  $y$  und  $x$  eine Beziehung besteht, welche sich nicht ändert, wenn der Werth der einen Grösse  $x$  sich ändert, so heisst  $y$  eine Funktion von  $x$  (vgl. Th. I, S. 3). Jede Aenderung von  $x$  zieht eine bestimmte Aenderung von  $y$  nach sich, und jedem Werthe von  $x$  entspricht im Allgemeinen ein einziger bestimmter Werth von  $y$ . — Beispiele solcher Beziehungen liefern die Gleichungen der 7 Rechnungsarten:

$$\begin{aligned} y &= a + x, & y &= ax, & y &= x^a, & y &= a^x, \\ y &= a - x, & y &= \frac{a}{x}, & y &= \sqrt[x]{a}, & y &= {}^a\!l x, \\ y &= x - a, & y &= \frac{x}{a}, & y &= \sqrt[a]{x}, & y &= {}^x\!l a. \end{aligned}$$

In allen diesen Fällen bleibt die durch die Gleichung ausgedrückte Beziehung zwischen  $y$  und  $x$  unverändert, wenn man der Grösse  $x$  nach einander verschiedene Werthe giebt. Jede Aenderung von  $x$  zieht, wenn  $a$  beständig denselben Werth behält, eine bestimmte Aenderung von  $y$  nach sich, und jedem Werthe von  $x$  entspricht im Allgemeinen ein bestimmter Werth von  $y$ . In allen diesen Fällen kann man daher sagen,  $y$  sei eine Funktion von  $x$ . Es ist also z. B. die Summe eine Funktion jedes einzelnen Summanden; ebenso ist ein Polynom, welches ausser einer Anzahl unveränderlicher Grössen die veränderliche Grösse  $x$  enthält, eine Funktion von  $x$ ; in einer Gleichung mit zwei Unbekannten ist jede Unbekannte eine Funktion der andern (vgl. Th. I, S. 68, erste Anm.). — Ist  $z$  eine Funktion von  $y$ , und  $y$  eine Funktion von  $x$ , so ist auch



$z$  eine Funktion von  $x$ . Denn denkt man sich aus den beiden Gleichungen, welche jene Zusammenhänge darstellen,  $y$  eliminiert, so bleibt eine Gleichung, welche bedeutet, dass  $z$  eine Funktion von  $x$  ist.

2. In der Arithmetik wurden einem Buchstaben wohl verschiedene Werthe beigelegt, indessen war von einer stetigen Aenderung einer Zahl nicht die Rede. Nachdem aber in der rechnenden Geometrie Strecken und Winkel durch Zahlen dargestellt worden sind, wird es nothwendig, den Begriff der stetigen Aenderung, wie sie eine Strecke durch Verschiebung des erzeugenden Punktes, und ein Winkel durch Drehung der erzeugenden Geraden erleidet, auch auf die Zahlen auszudehnen, durch welche diese Gebilde dargestellt werden. Die Zahl tritt dadurch in die Reihe der Funktions-Grössen (vgl. Th. I, S. 3).

3. Eine Funktion heisst algebraisch oder transcendent, jenachdem die Gleichung, welche zur Darstellung der Funktionsbeziehung dient, algebraisch oder transcendent ist (vgl. Th. I, Nr. 91). Von den oben angeführten 12 Funktionen sind also diejenigen der ersten und zweiten Rechnungsstufe, ferner  $x^a$  und  $\sqrt[a]{x} (= x^{\frac{1}{a}})$  algebraisch, die übrigen 4 transcendent.

4. Die in den Sätzen und Formeln der rechnenden Geometrie auftretenden Funktionsbeziehungen zwischen zwei Strecken waren sämtlich algebraisch; es bedurfte nicht der Einführung neuer Funktionen, um die Beziehungen zwischen zwei oder mehreren Strecken darzustellen. Ebenso liessen sich die Beziehungen zwischen zwei Winkeln überall durch algebraische Funktionen darstellen. Dagegen ist die Beziehung zwischen Strecken einerseits und Winkeln andererseits noch nicht zum Gegenstande der Rechnung gemacht worden. Nur eine allgemeine Andeutung über solche Beziehungen gaben die Sätze Th. II, 98, 107, wo von der Grösse der zwei gleichen oder ungleichen Seiten eines Dreiecks gegenüberliegenden Winkel die Rede ist, und einige andre, z. B. 123. — Gleichwohl geht aus dem Umstande, dass die Winkel eines Dreiecks durch seine Seiten, und seine Seitenverhältnisse durch seine Winkel vollkommen bestimmt sind, hervor, dass es Gleichungen, also auch Funktionen geben muss, welche diese Bestimmung ausdrücken. Und wenn in der rechnenden Geometrie (Th. II, 362) bereits die Aufgabe gelöst wurde: „aus zwei Sei-



ten eines rechtwinkligen Dreiecks die dritte zu berechnen“, so tritt als natürliche Verallgemeinerung derselben die Aufgabe an uns heran: „aus drei beliebigen Stücken eines beliebigen Dreiecks die übrigen zu berechnen“.

5. Um diese Aufgabe lösen zu können, stellt man zuerst die Seitenverhältnisse des rechtwinkligen Dreiecks als Funktionen eines seiner Winkel (Winkelfunktionen) dar. Hieraus ergibt sich die Lehre von den Winkelfunktionen oder Trigonometrie,\*) welche ein specieller Zweig der allgemeinen Funktionslehre (vgl. Th. I, S. 3) ist. — Unter den Anwendungen der Trigonometrie ist in erster Linie diejenige Anwendung auf die Geometrie zu nennen, welche mit der Lösung der oben erwähnten allgemeinen Aufgabe zusammenfällt. Diese Anwendung (von welcher die ganze Wissenschaft ihren Namen hat) nennen wir „Trigonometrie im engeren Sinne“.

---

\*) Die Lehre von den Winkelfunktionen wird meist Goniometrie genannt; es empfiehlt sich aber mehr, dem allgemeinen Theile der Wissenschaft, welcher sich mit diesen Funktionen beschäftigt, auch den üblichen allgemeinen Namen „Trigonometrie“ zu geben, und die specielle Anwendung auf die Lösung der Dreiecksaufgaben als „Tr. im engeren Sinne“ zu bezeichnen. — Auch der Name „Geometrie“ ist ja weit über seine ursprüngliche Bedeutung hinausgewachsen

---



# Reine Trigonometrie.

## A. Die Winkelfunktionen als geschlossene Ausdrücke.

### I. Funktionen spitzer Winkel.

#### 1. Der Cosinus.

**6. Einleitung.** — Aus dem Satze: „Zwei Dreiecke sind ähnlich, wenn sie in zwei Winkeln übereinstimmen“ (Th. II, 245) folgt, dass zwei rechtwinklige Dreiecke ähnlich sind, wenn sie in einem spitzen Winkel übereinstimmen. — Die Gestalt eines rechtwinkligen Dreiecks ist also durch einen seiner spitzen Winkel vollkommen bestimmt. — Da aber das Verhältniss zweier Seiten eines Dreiecks gleich ist dem Verhältniss der homologen Seiten jedes ihm ähnlichen Dreiecks (Th. II, 243), so ist auch jedes Seitenverhältniss eines rechtwinkligen Dreiecks durch einen seiner spitzen Winkel vollkommen bestimmt.

**7.** Betrachtet man zuerst das Verhältniss der den spitzen Winkel  $\alpha$  (Fig. 1) einschliessenden Seiten  $b$  und  $c$ , also  $\frac{b}{c}$ , so bleibt dasselbe (nach Th. II, 243) ungeändert, wenn das Dreieck




Fig. 1.

sich so ändert, dass  $\alpha$  und der rechte Winkel erhalten bleiben (z. B. wenn die durch  $BC$  bestimmte Gerade sich verschiebt). — Aendert aber das Dreieck sich so, dass der Winkel  $\alpha$  bis  $\alpha_1$  abnimmt, während  $b$  und der rechte Winkel erhalten bleiben, so ist  $B_1C < BC$ , folglich (Th. II, 117)  $B_1A < BA$ ,  $\frac{1}{c_1} > \frac{1}{c}$  (Th. I, Anm. z. 83a),

und  $\frac{b}{c_1} > \frac{b}{c}$ ; d. h.: auch das Verhältniss der den Winkel  $\alpha$  einschliessenden Seiten ändert sich. Ferner entspricht bei dieser Aenderung offenbar jedem Werthe von  $\alpha$  ein bestimmter Werth von  $c$ , also auch von  $\frac{b}{c}$ . Und da beständig  $b$  und  $c$  die den Winkel  $\alpha$  einschliessenden Seiten des



rechtwinkligen Dreiecks sind, so bleibt auch die Beziehung zwischen  $\alpha$  und  $\frac{b}{c}$  beständig dieselbe. Diese beiden Grössen erfüllen also die in Nr. 1 gestellten Anforderungen des Funktions-Zusammenhanges, und es kommt nur noch darauf an, für denselben einen Namen und ein Zeichen festzusetzen.

8. *Erklärung.* — Unter dem Cosinus eines spitzen Winkels  $\alpha$  im rechtwinkligen Dreieck versteht man das Verhältniss der dem Winkel anliegenden Kathete  $b$  zur Hypotenuse  $c$ .

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}.$$

Anm. Da es für den Werth des Verhältnisses  $\frac{b}{c}$ , also des  $\cos \alpha$ , gleichgiltig ist, in welchem rechtwinkligen Dreieck man den Winkel  $\alpha$  betrachtet, so folgt, dass der  $\cos \alpha$  eben nur eine Funktion des Winkels  $\alpha$  ist, die von der Beschaffenheit jenes Dreiecks ganz unabhängig ist.

*Eigenschaften des Cosinus.* — 1) In Nr. 7 wurde gezeigt, dass, wenn der Winkel  $\alpha$  abnimmt, das Verhältniss  $\frac{b}{c}$  zunimmt.

Ist also  $\cos \alpha = \frac{b}{c}, \cos \alpha_1 = \frac{b}{c_1},$

und

$$\alpha > \alpha_1,$$

so ist

$$\frac{b}{c} < \frac{b}{c_1},$$

d. h.:

$$\cos \alpha < \cos \alpha_1.$$

In Worten: Der grössere von zwei spitzen Winkeln hat 1. den kleineren Cosinus (und umgekehrt).

2) Nimmt  $\alpha$  bis 0 ab, während  $b$  unverändert bleibt, so rückt  $B$  nach  $C$ , es wird  $c = b$ , und man hat

$$\cos 0 = 1. \quad 2.$$

Nimmt  $\alpha$  bis  $R$  zu, so rückt  $B$  in unendliche Entfernung,  $C$  wird  $= \infty$ , und  $\frac{b}{c} = 0$  (Th. I, 149). Man hat also:

$$\cos R = 0. \quad 3.$$

Anm. Es sind also 0 und 1 die Grenzen, zwischen denen der Cosinus eines spitzen Winkels sich bewegt, während der Winkel selbst von  $R$  bis 0 abnimmt. — Dass der Cosinus eines Winkels, als Quotient zweier Strecken, stets eine Zahl ist, folgt aus Th. II, 19.

9. *Die Cosinus von Complementwinkeln.* — Aus der Formel des Pythagoräischen Satzes,  $a^2 + b^2 = c^2$ , folgt:

$$\left(\frac{a}{c}\right)^2 + \left(\frac{b}{c}\right)^2 = 1.$$



Nun ist nach der Definition des Cosinus (Fig. 1)


$$\frac{a}{c} = \cos \beta, \quad \frac{b}{c} = \cos \alpha,$$

4. also  $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta = 1$ , \*) wenn  $\alpha + \beta = R$ .

Anm. Die aus 4 sich ergebende Formel  $\cos \beta = \pm \sqrt{1 - \cos^2 \alpha}$  ermöglicht die Berechnung des Cosinus eines Winkels aus demjenigen seines Complementwinkels. Kennt man also die Cosinus der zwischen 0 und  $45^\circ$  liegenden Winkel, so kann man mittelst dieser Formel die Cosinus der zwischen  $45^\circ$  und  $R$  liegenden berechnen.

10. *Cosinus der Summe zweier spitzer Winkel.* — Auf einem

Fig. 2.



nicht gemeinsamen Schenkel des einen von zwei anstossenden Winkeln  $\alpha$  und  $\alpha_1$  sei die Strecke

$$AB = 1$$

abgetragen. Um dann die Winkel  $\alpha$ ,  $\alpha_1$ ,  $\alpha + \alpha_1$  in rechtwinklige Dreiecke zu bringen, fällt man  $BC \perp AC$ ,  $CB_1 \perp AB_1$ ,  $BC_1 \perp AC_1$ . Dann ist im Dreieck  $ABC_1$

$$\cos(\alpha + \alpha_1) = AC_1 = AB_1 - C_1B_1.$$

Zieht man dann  $BA_1 \parallel AB_1$  bis zum Schnittpunkt  $A_1$  mit der Verlängerung von  $B_1C$ , so ist  $C_1B_1 = BA_1$  (Th. II, 126). Also:

$$\cos(\alpha + \alpha_1) = AB_1 - BA_1 = \frac{AB_1}{AC} \cdot \frac{AC}{1} - \frac{BA_1}{BC} \cdot \frac{BC}{1}.$$

Nun ist nach der Definition des Cosinus

$$1) \frac{AB_1}{AC} = \cos \alpha_1; \quad 2) \frac{AC}{1} = \frac{AC}{AB} = \cos \alpha.$$

Ferner ist  $\overline{AB_1C} \sim \overline{CA_1B}$  (Th. II, 245); also, wenn  $\beta$  und  $\beta_1$  die Complementwinkel von  $\alpha$  und  $\alpha_1$  sind,  $A_1BC = B_1CA = \beta_1$ , und

$$3) \frac{BA_1}{BC} = \cos \beta_1; \quad 4) \frac{BC}{1} = \frac{BC}{AB} = \cos \beta.$$

Setzt man die Werthe 1) bis 4) in dem Ausdruck für  $\cos(\alpha + \alpha_1)$  ein, so folgt:

$$5. \quad \cos(\alpha + \alpha_1) = \cos \alpha \cdot \cos \alpha_1 - \cos \beta \cdot \cos \beta_1, \quad \text{wenn } \left. \begin{matrix} \alpha + \beta \\ \alpha_1 + \beta_1 \end{matrix} \right\} = R.$$

Anm. Diese Formel gilt zunächst nur, wenn nicht allein  $\alpha$  und  $\alpha_1$ , sondern auch  $\alpha + \alpha_1$  spitz ist.

\*) Statt  $(\cos \alpha)^2$  schreibt man gewöhnlich  $\cos^2 \alpha$  (Cosinusquadrat  $\alpha$ ).



*Cosinus des Doppelten eines Winkels.* — Setzt man in 5.  $\alpha_1 = \alpha$ , so ist auch  $\beta_1 = \beta$ , und man erhält:

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \cos^2 \beta. \quad 6.$$

*Cosinus der Hälfte eines Winkels.* — Durch Addition von

$$4. \quad 1 = \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta$$

und

$$6. \quad \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \cos^2 \beta$$

folgt:

$$1 + \cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha;$$

also:

$$\cos \alpha = + \sqrt{\frac{1 + \cos 2\alpha}{2}},$$

oder, wenn man  $2\alpha = \gamma$  setzt, woraus  $\alpha = \frac{\gamma}{2}$  folgt:

$$\cos \frac{\gamma}{2} = + \sqrt{\frac{1 + \cos \gamma}{2}}. \quad 7.$$

Anm. Formel 7 ermöglicht die Berechnung der Cosinus beliebig kleiner Winkel, die man durch fortgesetzte Halbierung eines Winkels erhält, dessen Cosinus man kennt. Formel 5 zeigt dann, wie man aus den Cosinus dieser kleinen Winkel wieder diejenigen grösserer zusammensetzen kann.

**11. Berechnung der Cosinus spitzer Winkel.** — a)  $\cos 60^\circ$ . — Das gleichseitige Dreieck wird durch eine seiner Höhen in zwei rechtwinklige Dreiecke getheilt, in deren jedem die kleinere Kathete die Hälfte der Hypotenuse ist. Da also das Verhältniss der dem Winkel von  $60^\circ$  anliegenden Kathete zur Hypotenuse gleich  $\frac{1}{2}$  ist, so hat man

$$\cos 60^\circ = \frac{1}{2}. \quad 8.$$

b)  $\cos 7,5^\circ$ . — Aus 8 erhält man nach 7 (oder 4),  $\cos 30^\circ = \frac{1}{2} \sqrt{3} = 0,8660$ . Hieraus weiter nach 7,  $\cos 15^\circ = 0,9659$ ,  $\cos 7,5^\circ = 0,9914$ .

Anm. Die hier auftretenden vierstelligen Decimalbrüche sind natürlich Näherungswerthe, die durch numerische Bestimmung der Quadratwurzel (Th. I, S. 174, oder mit Hilfe der Logarithmen) gefunden werden.

c) Die Cosinus der Vielfachen von  $7,5^\circ$ . — Aus den schon bekannten Cosinus der Winkel von  $7,5^\circ$  und  $15^\circ$  findet man nach 4,  $\cos 82,5^\circ = 0,1305$ ,  $\cos 75^\circ = 0,2588$ . — Ferner die Cosinus derjenigen Vielfachen von  $7,5^\circ$ , welche nicht  $> 45^\circ$  sind, nach 5,  $\cos 22,5^\circ = \cos (15^\circ + 7,5^\circ) = 0,9238$ ,  $\cos 37,5^\circ = \cos (30^\circ + 7,5^\circ) = 0,7934$ ,  $\cos 45^\circ = \cos (30^\circ + 15^\circ) = 0,7071$ . — Endlich die Cosinus derjenigen Vielfachen von  $7,5^\circ$ , welche  $> 45^\circ$  sind, nach 4,  $\cos 52,5^\circ = 0,6088$ ,  $\cos 67,5^\circ = 0,3828$ . — Die folgende Tabelle giebt diese Resultate geordnet mit Angabe der Differenzen je zweier auf einander folgender Cosinus.



| <sup>0</sup> | cos.   | diff.  | <sup>0</sup> | cos.   | diff.  |
|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------|
| 90           | 0,0000 |        | 45           | 0,7071 |        |
|              |        | 0,1305 |              |        | 0,0863 |
| 82,5         | 0,1305 |        | 37,5         | 0,7934 |        |
|              |        | 0,1283 |              |        | 0,0726 |
| 75           | 0,2588 |        | 30           | 0,8660 |        |
|              |        | 0,1239 |              |        | 0,0579 |
| 67,5         | 0,3827 |        | 22,5         | 0,9239 |        |
|              |        | 0,1173 |              |        | 0,0420 |
| 60           | 0,5000 |        | 15           | 0,9659 |        |
|              |        | 0,1088 |              |        | 0,0255 |
| 52,5         | 0,6088 |        | 7,5          | 0,9914 |        |
|              |        | 0,0983 |              |        | 0,0086 |
| 45           | 0,7071 |        | 0            | 1,0000 |        |

Anm. In dieser Tabelle ist bei  $\cos 67,5^0$  und  $\cos 22,5^0$  die oben berechnete vierte Decimalstelle durch die genauere ersetzt. Da überhaupt die Richtigkeit der letzten Decimalstelle unsicher ist (vgl. Th. I, Nr. 164), so wird nachher diese Stelle ganz weggelassen werden.

d) Die Cosinus der Vielfachen von  $0,5^0$ . — Dieselben können aus den Zahlenwerthen der obigen Tabelle bis auf 3 Decimalstellen genau gefunden werden, wenn man für jeden halben Grad zwischen 90 und 82,5 den 15<sup>ten</sup> Theil der Differenz 0,1305, also 0,0087, ebenso für jeden halben Grad zwischen 82,5 und 75 den 15<sup>ten</sup> Theil der Differenz 0,1283, also 0,00855 addirt. — Auf die Intervalle  $75^0$ — $67,5^0$  und  $67,5^0$ — $60^0$  angewendet würde dieses Verfahren auf die Differenzen 0,00826 und 0,00782 führen, deren Unterschied schon zu gross ist, um nicht die Richtigkeit der dritten Decimalstelle zu stören. Theilt man aber den Unterschied dieser Differenzen, 0,00044 in 15 gleiche Theile (0,00003), und bildet, von 0,00826 (als der mittelsten Differenz des ersten Intervalles) ausgehend, durch 7-malige Addition und 22-malige Subtraction von 0,00003 die Differenzreihe (mit Weglassung der Nullen) 847, 844, 841, ... 763, 760, so erhält man durch successive Addition dieser Differenzen zu  $\cos 75^0$  die Cosinus der Winkel von  $\frac{1}{2}$  zu  $\frac{1}{2}$  Grad bis  $60^0$ . — Die Abrundung der vierten Stelle (nach Th. I, 169) liefert dann die drei ersten Decimalstellen aller Cosinus richtig. (Nur bei  $73^0$  ist gegen die Regel die Erhöhung der letzten Stelle zu unterlassen, bei  $64,5^0$  auszuführen.) Die Berechnung von  $\cos 0^0$  bis  $\cos 30^0$  erfolgt dann nach 4, die von  $\cos 30^0$  bis  $\cos 45^0$  nach 5, endlich die von  $\cos 45^0$  bis  $\cos 60^0$  wieder nach 4. Auf diese Weise erhält man die folgende Tafel.




Tafel der Cosinus der spitzen Winkel von  $1\frac{1}{2}$  zu  $1\frac{1}{2}$  Grad.

| 0    | cos   | 0    | cos   | 0    | cos   | 0    | cos   | 0    | cos   | 0    | cos   |
|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| 90   | 0,000 | 75   | 0,259 | 60   | 0,500 | 45   | 0,707 | 30   | 0,866 | 15   | 0,966 |
| 89,5 | 0,009 | 74,5 | 0,267 | 59,5 | 0,508 | 44,5 | 0,713 | 29,5 | 0,870 | 14,5 | 0,968 |
| 89   | 0,017 | 74   | 0,276 | 59   | 0,515 | 44   | 0,719 | 29   | 0,875 | 14   | 0,970 |
| 88,5 | 0,026 | 73,5 | 0,284 | 58,5 | 0,522 | 43,5 | 0,725 | 28,5 | 0,879 | 13,5 | 0,972 |
| 88   | 0,035 | 73   | 0,292 | 58   | 0,530 | 43   | 0,731 | 28   | 0,883 | 13   | 0,974 |
| 87,5 | 0,044 | 72,5 | 0,301 | 57,5 | 0,537 | 42,5 | 0,737 | 27,5 | 0,887 | 12,5 | 0,976 |
| 87   | 0,052 | 72   | 0,309 | 57   | 0,545 | 42   | 0,743 | 27   | 0,891 | 12   | 0,978 |
| 86,5 | 0,061 | 71,5 | 0,317 | 56,5 | 0,552 | 41,5 | 0,749 | 26,5 | 0,895 | 11,5 | 0,980 |
| 86   | 0,070 | 71   | 0,326 | 56   | 0,559 | 41   | 0,755 | 26   | 0,899 | 11   | 0,982 |
| 85,5 | 0,078 | 70,5 | 0,334 | 55,5 | 0,566 | 40,5 | 0,760 | 25,5 | 0,903 | 10,5 | 0,983 |
| 85   | 0,087 | 70   | 0,342 | 55   | 0,574 | 40   | 0,766 | 25   | 0,906 | 10   | 0,985 |
| 84,5 | 0,096 | 69,5 | 0,350 | 54,5 | 0,581 | 39,5 | 0,772 | 24,5 | 0,910 | 9,5  | 0,986 |
| 84   | 0,105 | 69   | 0,358 | 54   | 0,588 | 39   | 0,777 | 24   | 0,914 | 9    | 0,988 |
| 83,5 | 0,113 | 68,5 | 0,367 | 53,5 | 0,595 | 38,5 | 0,783 | 23,5 | 0,917 | 8,5  | 0,989 |
| 83   | 0,122 | 68   | 0,375 | 53   | 0,602 | 38   | 0,788 | 23   | 0,921 | 8    | 0,990 |
| 82,5 | 0,131 | 67,5 | 0,383 | 52,5 | 0,609 | 37,5 | 0,793 | 22,5 | 0,924 | 7,5  | 0,991 |
| 82   | 0,139 | 67   | 0,391 | 52   | 0,616 | 37   | 0,799 | 22   | 0,927 | 7    | 0,993 |
| 81,5 | 0,148 | 66,5 | 0,399 | 51,5 | 0,623 | 36,5 | 0,804 | 21,5 | 0,930 | 6,5  | 0,994 |
| 81   | 0,156 | 66   | 0,407 | 51   | 0,629 | 36   | 0,809 | 21   | 0,934 | 6    | 0,995 |
| 80,5 | 0,165 | 65,5 | 0,415 | 50,5 | 0,636 | 35,5 | 0,814 | 20,5 | 0,937 | 5,5  | 0,995 |
| 80   | 0,174 | 65   | 0,423 | 50   | 0,643 | 35   | 0,819 | 20   | 0,940 | 5    | 0,996 |
| 79,5 | 0,182 | 64,5 | 0,431 | 49,5 | 0,649 | 34,5 | 0,824 | 19,5 | 0,943 | 4,5  | 0,997 |
| 79   | 0,191 | 64   | 0,438 | 49   | 0,656 | 34   | 0,829 | 19   | 0,946 | 4    | 0,998 |
| 78,5 | 0,199 | 63,5 | 0,446 | 48,5 | 0,663 | 33,5 | 0,834 | 18,5 | 0,948 | 3,5  | 0,998 |
| 78   | 0,208 | 63   | 0,454 | 48   | 0,669 | 33   | 0,839 | 18   | 0,951 | 3    | 0,999 |
| 77,5 | 0,216 | 62,5 | 0,462 | 47,5 | 0,676 | 32,5 | 0,843 | 17,5 | 0,954 | 2,5  | 0,999 |
| 77   | 0,225 | 62   | 0,469 | 47   | 0,682 | 32   | 0,848 | 17   | 0,956 | 2    | 0,999 |
| 76,5 | 0,233 | 61,5 | 0,477 | 46,5 | 0,688 | 31,5 | 0,853 | 16,5 | 0,959 | 1,5  | 1,000 |
| 76   | 0,242 | 61   | 0,485 | 46   | 0,695 | 31   | 0,857 | 16   | 0,961 | 1    | 1,000 |
| 75,5 | 0,250 | 60,5 | 0,492 | 45,5 | 0,701 | 30,5 | 0,862 | 15,5 | 0,964 | 0,5  | 1,000 |



## 2. Die übrigen Funktionen.

**12. Vorbemerkung.** — Im rechtwinkligen Dreieck (Fig. 1) lassen sich im Ganzen sechs Seitenverhältnisse aufstellen, nämlich:



$$\frac{b}{c}, \frac{a}{c}, \frac{a}{b}; \frac{c}{b}, \frac{c}{a}, \frac{b}{a}.$$

Von diesen ist bis jetzt das erste,  $\frac{b}{c}$ , als Funktion des Winkels  $\alpha$  nachgewiesen und bezeichnet worden. Dasselbe soll im Folgenden mit den übrigen Verhältnissen geschehen.

**13. a) Der Sinus.** — Nach der Definition des Cosinus ist  $\frac{a}{c} = \cos \beta$ . Nun ist nach 4  $\cos \beta$  oder  $\frac{a}{c}$  eine Funktion von  $\cos \alpha$ , also auch von  $\alpha$ . (Nr. 1 am Schluss.)

*Erklärung.* — Unter dem Sinus (*sin*) eines spitzen Winkels  $\alpha$  im rechtwinkligen Dreieck versteht man das Verhältniss der dem Winkel gegenüberliegenden Kathete  $a$  zur Hypotenuse  $c$ .

$$\sin \alpha = \frac{a}{c}.$$

**b) Die Tangens.** — Da  $\frac{a}{c} : \frac{b}{c} = \frac{a}{b}$ , so ist auch  $\frac{a}{b}$  eine Funktion von  $\alpha$ .

*Erklärung.* — Unter der Tangens (*tg*) eines spitzen Winkels  $\alpha$  im rechtwinkligen Dreieck versteht man das Verhältniss der dem Winkel gegenüberliegenden Kathete  $a$  zur anliegenden Kathete  $b$ .

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}.$$

**c) Die Secans, Cosecans, Cotangens.** — Wie  $\frac{b}{c}$ ,  $\frac{a}{c}$  und  $\frac{a}{b}$ , so sind auch die umgekehrten Werthe dieser Brüche, nämlich  $\frac{c}{b}$ ,  $\frac{c}{a}$  und  $\frac{b}{a}$ , Funktionen von  $\alpha$ .

*Erklärungen.* — Unter der Secans (*sec*) eines spitzen Winkels  $\alpha$  versteht man den umgekehrten Werth seines Cosinus; unter der Cosecans (*cosec*) den umgekehrten Werth



seines Sinus; unter der Cotangens (*cot*) den umgekehrten Werth seiner Tangens.

$$\sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha} = \frac{c}{b}.$$

$$\operatorname{cosec} \alpha = \frac{1}{\sin \alpha} = \frac{c}{a}.$$

$$\cot \alpha = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha} = \frac{b}{a}.$$

Anm. Wie lauten also die Erklärungen dieser drei Funktionen durch die Seitenverhältnisse in Worten?

*Uebersicht* der sechs Seitenverhältnisse im rechtwinkligen Dreieck, und der durch sie dargestellten Funktionen des Winkels  $\alpha$ .

| $\sin \alpha$ | $\cos \alpha$ | $\operatorname{tg} \alpha$ | $\cot \alpha$ | $\sec \alpha$ | $\operatorname{cosec} \alpha$ |
|---------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| $\frac{a}{c}$ | $\frac{b}{c}$ | $\frac{a}{b}$              | $\frac{b}{a}$ | $\frac{c}{b}$ | $\frac{c}{a}$                 |

9.

#### 14. Eintheilung der Funktionen nach ihrem Zusammenhange. —

a) *Coordinirte Funktionen*. — Aus den Definitionen der sechs Funktionen (oder wenn man im Dreieck  $\overline{ABC}$  oder in 9 gleichzeitig  $a$  mit  $b$ , und  $\alpha$  mit  $\beta$  vertauscht), folgt:

$$\sin \beta = \frac{b}{c} = \cos \alpha; \quad \operatorname{tg} \beta = \frac{b}{a} = \cot \alpha; \quad \sec \beta = \frac{c}{a} = \operatorname{cosec} \alpha;$$

$$\cos \beta = \frac{a}{c} = \sin \alpha; \quad \cot \beta = \frac{a}{b} = \operatorname{tg} \alpha; \quad \operatorname{cosec} \beta = \frac{c}{b} = \sec \alpha.$$

Vermöge dieses Zusammenhanges heissen Sinus und Cosinus einander coordinirt; ebenso Tangens und Cotangens, Secans und Cosecans. Und die letzten Formeln enthalten zusammen den Satz:

Jede Funktion eines spitzen Winkels ist gleich 10. der coordinirten Funktion seines Complementwinkels.


Anm. Hiernach zerfallen die sechs Funktionen in drei Paare coordinirter Funktionen. — In der Uebersicht 9 ist jedes der drei Paare von dem folgenden durch einen Doppelstrich getrennt.

b) *Reciproke Funktionen*. — Zwei Funktionen heissen reciprok zu einander, wenn die eine der umgekehrte Werth der andern ist. Demnach sind reciprok: Sinus und Cosecans, Cosinus und Secans, Tangens und Cotangens.



Anm. Hierdurch zerfallen die sechs Funktionen in drei Paare reziproker Funktionen. In der Uebersicht 9 stehen die beiden Funktionen jedes dieser Paare einander symmetrisch gegenüber. — Tangens und Cotangens sind gleichzeitig reziprok und coordinirt. — Man übe sich, zu jeder gegebenen Funktion die coordinirte und die reciproke anzugeben.

**15. Eintheilung der Funktionen nach ihrem Wachsthum.** — In Nr. 7 wurde gezeigt, dass, wenn im rechtwinkligen Dreieck



(Fig. 1) der Winkel  $\alpha$  bis  $\alpha_1$  abnimmt, während  $b$  ungeändert bleibt, zwischen den Seiten der Dreiecke  $abc$  und  $a_1b_1c_1$  die Beziehungen bestehen:

$$1) \quad a_1 < a; \quad c_1 < c.$$

Ausserdem ist

$$2) \quad \alpha_1 < \alpha; \quad \beta < \beta_1.$$

Aus 1) folgt:

$$\frac{a_1}{b} < \frac{a}{b}; \quad \frac{b}{a_1} > \frac{b}{a}; \quad \frac{c_1}{b} < \frac{c}{b}; \quad \frac{b}{c_1} > \frac{b}{c};$$

oder (9)

$$3) \quad \operatorname{tg} \alpha_1 < \operatorname{tg} \alpha; \quad \operatorname{cot} \alpha_1 > \operatorname{cot} \alpha; \quad \sec \alpha_1 < \sec \alpha; \quad \cos \alpha_1 > \cos \alpha.$$

Ferner ist nach 10

$$\operatorname{cosec} \beta = \sec \alpha; \quad \sin \beta = \cos \alpha;$$

$$\operatorname{cosec} \beta_1 = \sec \alpha_1; \quad \sin \beta_1 = \cos \alpha_1;$$

also nach 3)

$$4) \quad \operatorname{cosec} \beta > \operatorname{cosec} \beta_1; \quad \sin \beta < \sin \beta_1.$$

Aus den Formeln 2), 3), 4) folgt nun, dass zu dem kleineren von zwei Winkeln die kleinere Sinus-, Tangens- und Secans-Funktion, aber die grössere Cosinus-, Cotangens-, und Cosecans-Funktion gehört. Oder: wenn der Winkel abnimmt, so nehmen die ersteren Funktionen ab, die letzteren zu.

Vermöge dieses Zusammenhanges heissen Sinus, Tangens, Secans, welche sich mit dem zugehörigen Winkel in gleichem Sinne ändern, zusammen directe Funktionen; dagegen Cosinus, Cotangens, Cosecans, welche sich mit dem zugehörigen Winkel in entgegengesetztem Sinne ändern, indirecte Funktionen (Cofunktionen). — Man kann demnach das letzte Resultat in der Form aussprechen:

11. Nimmt ein spitzer Winkel zu, so nehmen seine directen Funktionen zu, seine indirecten ab.

Anm. Hiernach zerfallen die sechs Funktionen in zwei Tripel. — In der Uebersicht 9 stehen die directen Funktionen an ungerader, die indirecten an gerader Stelle. — Man gebe den gemeinsamen Namen von zwei beliebig gewählten Funktionen an. Welche Paare lassen sich unter keinen gemeinsamen Namen bringen?



**16. Die Grenzwerthe der Funktionen eines spitzen Winkels. —**

a) Nimmt im rechtwinkligen Dreieck der Winkel  $\alpha$  bis 0 ab, während  $b$  ungeändert bleibt, so wird  $a = 0$ ,  $c = b$ . Dann folgt aus 9:


$$\begin{aligned} \sin 0 &= 0; & \operatorname{tg} 0 &= 0; & \sec 0 &= 1; \\ \cos 0 &= 1; & \cot 0 &= \infty; & \operatorname{cosec} 0 &= \infty. \end{aligned} \quad 12.$$

b) Nimmt dagegen der Winkel  $\alpha$  bis  $R$  zu, so rückt  $B$  auf  $CB$  (Fig. 1) in unendliche Entfernung,  $a$  und  $c$  wachsen ins Unendliche, und ihr Verhältniss nähert sich der Einheit als Grenze. Dann folgt aus 9:

$$\begin{aligned} \sin R &= 1; & \operatorname{tg} R &= \infty; & \sec R &= \infty; \\ \cos R &= 0; & \cot R &= 0; & \operatorname{cosec} R &= 1. \end{aligned} \quad 13.$$

Aus der Vergleichung von 12 und 13 folgt, dass der Satz 10 auch noch für die Funktionen der Grenzwinkel 0 und  $R$  gilt. Ferner folgt, dass für einen spitzen Winkel stets Sinus und Cosinus zwischen 0 und 1, Tangens und Cotangens zwischen 0 und  $\infty$ , Secans und Cosecans zwischen 1 und  $\infty$  liegen. Diese Beziehungen sind durch Fig. 3 veranschaulicht.

Anm. In nebenstehender Figur drücken die Richtungen jedes Pfeiles die Aenderungen eines Winkels von 0 bis  $R$  aus, und die gleiche Richtung der parallelen Dreiecksseite drückt die gleichzeitige Aenderung der neben dem Pfeile stehenden Funktion aus.

**17. Bestimmung von Winkeln und Funktionen durch einander. —**

Aus den oben gegebenen Definitionen der trigonometrischen Funktionen folgt, dass der Werth jeder Funktion durch den gegebenen Winkel vollständig bestimmt ist. Aber auch umgekehrt ist die Grösse eines Winkels durch einen zugehörigen Funktionswerth vollständig bestimmt. Denn wenn zu einem gegebenen Funktionswerthe zwei verschiedene Winkel gehörten, so widerspräche dies dem Satze 11, nach welchem, wenn einer dieser Winkel in den andern übergeht, auch der zugehörige Funktionswerth beständig grösser oder beständig kleiner werden muss, also jedenfalls die ursprüngliche Grösse nicht wieder annehmen kann.

Wie jede Funktion durch den zugehörigen Winkel, so ist auch jede Funktion eines Winkels durch eine andere Funktion



desselben Winkels vollständig bestimmt, und kann durch sie ausgedrückt werden. Dies geschieht mit Hilfe der folgenden Formeln:

Nach 4 ist  $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta = 1;$

nach 10:  $\cos \beta = \sin \alpha,$

14. folglich:  $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1.$

Ferner folgt aus 9:

15.  $\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \operatorname{tg} \alpha.$

a) Mittelst der Formeln 14 und 15 kann nun jede der drei Funktionen Sinus, Cosinus, Tangens durch eine der beiden anderen ausgedrückt werden. b) Ebenso jede der drei Funktionen Cosecans, Secans, Cotangens durch eine der beiden andern, wenn man in 14 und 15 jede Funktion durch die zu ihr reciproke ausdrückt. c) Endlich jede der drei ersten (letzten) Funktionen durch jede der drei letzten (ersten), wenn man in jeder der in a) erhaltenen Formeln eine der beiden Funktionen durch die zu ihr reciproke ausdrückt.

Anm. Man bestimme die Anzahl aller dieser Formeln, und löse Aufgaben, wie: Die fünf übrigen Funktionen durch den Cosinus auszudrücken.

**18. Berechnung von Funktionen spitzer Winkel. — Vorbemerkung.** — Aus Nr. 17 folgt, dass, wenn der Werth einer Funktion eines spitzen Winkels (z. B. des Cosinus) bekannt ist, daraus die Werthe aller übrigen Funktionen berechnet werden können. — Um nun den Werth irgend einer Funktion eines spitzen Winkels berechnen zu können, muss dieser Winkel einem rechtwinkligen Dreieck angehören, in welchem eine Seite allein durch eine zweite (ohne Benutzung der dritten) ausgedrückt werden kann. Denn nur dann wird das Verhältniss dieser Seiten eine blosse Zahl sein. Diese Bedingung erfüllen aber nur diejenigen rechtwinkligen Dreiecke, welche Hälften von Bestimmungsdreiecken in elementar construirbaren regelmässigen Polygonen sind. Denn nach Th. II Nr. 156—160

lassen sich die Katheten  $\frac{s_n}{2}$  dieser rechtwinkligen Dreiecke allein durch die Hypotenuse  $r$  ausdrücken. — Es sind für diesen Zweck nur noch die Bestimmungsdreiecke des regelmässigen Vierecks und Zehnecks zu betrachten, da dasjenige des Sechsecks bereits oben (Formel 8) den  $\cos 60^\circ$  geliefert hat, und das des Fünfzehnecks Winkel enthält, für



welche zunächst der Cosinus besser mittelst der Formeln 5 und 7 bestimmt wird. Diese letzteren Formeln machen auch die Betrachtung der aus dem 6-, 4-, 10- und 15-Eck ableitbaren Polygone überflüssig.

a) *Funktionen des Winkels von  $60^\circ$ .* — Nach Formel 8 ist

$$\cos 60^\circ = \frac{1}{2}.$$

b) *Funktionen des Winkels von  $45^\circ$ .* — Das Bestimmungsdreieck des Quadrates ist gleichschenkelig-rechtwinklig, also  $a = b$ . Dann folgt aus 9:

$$\operatorname{tg} 45^\circ = 1. \quad 16.$$

c) *Funktionen des Winkels von  $72^\circ$ .* — Ist  $x$  die Seite des regelmässigen Zehneckes, und  $r$  der Radius des umschriebenen Kreises, so ist (Th. II, 368)

$$x^2 = r(r - x),$$

woraus folgt:  $x = \frac{r}{2}(\sqrt{5} - 1).$

Fällt man nun im Bestimmungsdreieck des regelmässigen Zehneckes die Höhe auf die Basis, so ist

$$\cos 72^\circ = \frac{x}{2r},$$

oder, wenn man  $x$  durch seinen eben gefundenen Werth ersetzt:

$$\cos 72^\circ = \frac{\sqrt{5} - 1}{4}. \quad 17.$$


Anm. Man berechne a) die übrigen Funktionen der Winkel von  $60^\circ$ ,  $45^\circ$ ,  $72^\circ$ , b) den Cosinus und die übrigen Funktionen der Winkel von  $30^\circ$ ,  $15^\circ$ ,  $36^\circ$ ,  $18^\circ$ ,  $9^\circ$ , c) den Cosinus und die übrigen Funktionen solcher spitzer Winkel, die aus den angegebenen durch Addition entstehen.

**19. Geometrische Darstellung der Funktionen eines spitzen Winkels.** — Beschreibt man aus der Ecke  $A$  eines bei  $C$  rechtwinkligen Dreiecks  $\overline{ABC}$  eine Kreislinie mit der Hypotenuse  $AB$  als Radius, und setzt  $AB = 1$ , so ist (Fig. 4)

$$1) \sin \alpha = \frac{BC}{AB} = BC.$$

Verlängert man  $AC$  bis  $C_1$ , und  $AB$  bis zum Schnittpunkte  $B_1$  mit der in  $C_1$  gezogenen Tangente, so ist  $\overline{ABC} \sim \overline{AB_1C_1}$  (Th. II, 245), und

Fig. 4.





$$2) \quad \operatorname{tg} \alpha = \frac{BC}{AC} = \frac{B_1C_1}{AC_1} = B_1C_1.$$

$$3) \quad \sec \alpha = \frac{AB}{AC} = \frac{AB_1}{AC_1} = AB_1.$$

Führt man dieselben Constructionen in Bezug auf  $\beta$ , den Complementwinkel von  $\alpha$ , aus, so erhält man mit Berücksichtigung von 10:

$$4) \quad \cos \alpha = \sin \beta = \frac{BD}{AB} = BD.$$

$$5) \quad \cot \alpha = \operatorname{tg} \beta = \frac{BD}{AD} = \frac{B_2D_2}{AD_2} = B_2D_2.$$

$$6) \quad \operatorname{cosec} \alpha = \sec \beta = \frac{AB}{AD} = \frac{AB_2}{AD_2} = AB_2.$$

Anm. Aus dem Umstande, dass bei dieser geometrischen Darstellung der Funktionen die Strecken  $B_1C_1$  und  $B_2D_2$  Tangenten, dagegen  $AB_1$  und  $AB_2$  Secanten der Kreislinie sind, erklären sich die Namen der Funktionen Tangens und Secans, sowie Cotangens und Cosecans (tangens, secans complementi). Die Bedeutung des Namens sinus s. im Register.

## II. Funktionen beliebiger Winkel.

### 1. Der Cosinus.

**20. Vorbemerkung.** — Um den Begriff des Cosinus auf beliebige Winkel ausdehnen zu können, muss eine neue Definition dieser Funktion aufgestellt werden. Diese Definition muss erstens, damit kein Widerspruch entsteht, die früher für den spitzen Winkel gegebene als speciellen Fall in sich schliessen. Zweitens kann man verlangen, dass die für die Cosinus spitzer Winkel geltenden Formeln 4 und 5 auch für stumpfe Winkel in Geltung bleiben. Ist nun in der Formel 5

$$\cos(\alpha + \alpha_1) = \cos \alpha \cdot \cos \alpha_1 - \sin \alpha \cdot \sin \alpha_1 \quad (\alpha + \beta = \alpha_1 + \beta_1 = R)$$

$\alpha > 45^\circ$  und  $\alpha_1 > 45^\circ$ , so ist  $\beta < 45^\circ$  und  $\beta_1 < 45^\circ$ ; mithin  $\cos \alpha < \cos \beta$  und  $\cos \alpha_1 < \cos \beta_1$  (11), folglich  $\cos \alpha \cdot \cos \alpha_1 < \cos \beta \cdot \cos \beta_1$ . Es ist also  $\cos(\alpha + \alpha_1)$  in diesem Falle negativ, und da gleichzeitig  $\alpha + \alpha_1$  ein stumpfer Winkel ist, so zeigt sich, dass die Formel für stumpfe Winkel nur dann in Geltung bleiben kann, wenn man den Cosinus eines stumpfen Winkels als negativ ansieht. (Die Formel 4 wird sich



später als specieller Fall von 5 ausweisen; daher braucht hier ihr Weiterbestehen nicht untersucht zu werden.)

Um die erste Forderung zu erfüllen, machen wir die beiden Schenkel eines beliebigen Winkels  $\alpha$  einander gleich ( $SA = SB$ , Fig. 5), projeciren einen Schenkel  $SB$  (den Endschenkel) auf den anderen  $SA$  (den Anfangsschenkel), und verstehen unter dem Cosinus des Winkels  $\alpha$  den Quotienten aus dieser Projection  $SB_1$  und dem Anfangsschenkel  $SA$ .

Anm. Im spitzwinkligen Dreieck  $SBB_1$  (Fig. 5a) würde nach der früheren Definition  $\cos \alpha = \frac{SB_1}{SB}$  sein. Da nun  $SB = SA$  ist, so sieht man, wie für spitze Winkel die neue Definition mit der alten übereinstimmt.

Um die zweite Forderung zu erfüllen, bezeichnen wir den Quotienten  $\frac{SB_1}{SA}$  als positiv, wenn die Strecken  $SB_1$  und  $SA$  gleiche, als negativ, wenn sie entgegengesetzte Richtung haben.

Anm. Die Darstellung des Gegensatzes der Richtungen auf einer Geraden durch positive und negative Zahlen ist bereits in Th. II, Nr. 22 und 23 ausgeführt worden. Ebenso die Lehre von der Projection mit Berücksichtigung dieses Gegensatzes in Th. II, Nr. 140. — Aus Fig. 5b ist ersichtlich, dass bei Berücksichtigung dieses Gegensatzes der Cosinus des stumpfen Winkels  $\alpha$  in der That, wie verlangt, durch eine negative Zahl ausgedrückt wird. — Zu beachten ist, dass bei dieser neuen Auffassung des Streckenbegriffs, durch welche die Richtung der Strecke als wesentliches Unterscheidungsmerkmal herangezogen wird, nur Quotienten von Strecken auf derselben oder auf parallelen Geraden die Bedeutung einer reellen Zahl haben (vgl. Th. II, Nr. 34). Solche Quotienten werden daher auch im Folgenden ausschliesslich benutzt.

**21. Erklärung.** — Unter dem Cosinus eines beliebigen Winkels  $\alpha$ , dessen Schenkel gleich lang gemacht sind, versteht man die Projection des einen Schenkels auf den andern, dividiert durch den andern.

$$\cos \alpha = \frac{SB_1}{SA} \quad (\text{Fig. 5}).$$

Anm. Die Grösse des Verhältnisses  $\frac{SB_1}{SA}$ , also des  $\cos \alpha$ , ist von der

Fig. 5a.





Fig. 5b.





Länge der auf den Schenkeln abgetragenen Strecke unabhängig. Denn sei  $SA^1 = SB^1$  eine andere auf den Schenkeln abgetragene Strecke, und  $SB_1^1$  die Projection von  $SB^1$  auf  $SA^1$ , so ist  $\frac{SB_1^1}{SB^1} = \frac{SB_1}{SB}$  (Th. II, 349)  $= \frac{SA^1}{SA}$ , also:  $\frac{SB_1^1}{SA^1} = \frac{SB_1}{SA}$ . — Die Grösse des  $\cos \alpha$  ist aber auch von der Wahl des zu projecirenden Schenkels unabhängig. Denn ist  $SA_1$  die Projection von  $SA$  auf  $SB$  (Fig. 5), so ist  $\overline{SBB_1} \cong \overline{SAA_1}$ , also  $SA_1 = SB_1$ , und  $\frac{SA_1}{SB} = \frac{SB_1}{SA} = \cos \alpha$ .

Da die Definition des Cosinus eines Winkels nur die Richtung seiner Schenkel berücksichtigt, nicht aber die Grösse der Drehung, durch welche ein Schenkel in die Richtung des andern gelangen kann, so sind die Cosinus aller Winkel, welche dieselben Schenkel haben, oder deren Schenkel sich zur Deckung bringen lassen, einander gleich. Nennt man solche Winkel congruent, so gilt demnach der Satz:

18. Congruente Winkel haben gleiche Cosinus.

oder:

$$\cos(4nR \pm \alpha) = \cos \alpha,$$

wobei  $n$  die Null und alle ganzen Zahlen bedeutet.

Anm. Die verschiedenen Bedeutungen eines durch seine Schenkel gegebenen Winkels sind in Th. II, Nr. 33 erste Anm., Nr. 44 letzte Anm. auseinandergesetzt. — Congruent sind demnach insbesondere 1) zwei Winkel, die sich nur um eine ganze Anzahl von Umdrehungen unterscheiden ( $\alpha$  und  $4nR + \alpha$ ), 2) zwei Winkel, die zusammen  $4R$  betragen ( $\alpha$  und  $4R - \alpha$ ), 3) zwei Winkel, die sich nur durch den Sinn der Drehung unterscheiden ( $+\alpha$  und  $-\alpha$ ). — Man sieht, dass alle diese Winkel in dem Ausdrücke  $4nR \pm \alpha$  enthalten sind.

Aus 18 folgt u. a. für  $n=0$  und das untere Zeichen von  $\alpha$ :

19.  $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$ .

22. Die Cosinus von Supplementwinkeln. — Sind  $\alpha$  und  $\gamma$

Fig. 6.

(Fig. 6) zwei Nebenwinkel, so ist

$$\cos \alpha = \frac{SB_1}{SA}, \quad \cos \gamma = \frac{SB_1}{SC},$$

oder, da  $SC = -SA$  ist:

$$\cos \gamma = -\cos \alpha,$$

20.  $\cos(2R - \alpha) = -\cos \alpha$ .

23. Die Cosinus der Grenzwinkel  $2R$ ,  $3R$ ,  $4R$ . — Setzt man in 20  $\alpha = 0$ , so folgt

$$\cos 2R = -\cos 0 = -1. \quad (2)$$

Da ferner der Winkel  $2R$  congruent mit  $R$  ist, so ist nach 18

$$\cos 3R = \cos R = 0. \quad (3)$$



Da endlich der Winkel  $4R$  congruent mit  $0$  ist, so ist nach 18

$$\cos 4R = \cos 0 = +1. \quad (2)$$

Also, zusammengestellt:

$$\begin{array}{c|cccc} \cos & 0, & R, & 2R, & 3R & 4R \dots \\ \hline & +1, & 0, & -1, & 0 & +1 \dots \end{array} \quad 21.$$

Nennt man die Winkel zwischen  $0$  und  $R$ ,  $R$  und  $2R$ ,  $2R$  und  $3R$ ,  $3R$  und  $4R$  bzw. die Winkel im ersten, zweiten, dritten, vierten Quadranten, so folgt aus 21:

Der Cosinus eines Winkels ist im *ersten* und *vierten* 22. Quadranten *positiv*, im *zweiten* und *dritten negativ*. — Der Cosinus eines Winkels nimmt zwischen  $+1$  und  $-1$  im *ersten* und *zweiten* Quadranten *ab*, im *dritten* und *vierten* *zu*.

**24. Product zweier Cosinus.** — Aus einem Punkte  $S$  seien drei gleichlange Strecken gezogen,  $SC$ ,  $SB$ ,  $SA$ . Projicirt man nun  $SC$  auf  $SB$ , und diese Projection wieder auf  $SA$ , so ist, wenn  $BSC = \beta$  und  $ASB = \alpha$  gesetzt wird (Fig. 7):

$$\cos \beta = \frac{SC_1}{SB} = \frac{SB_1}{SA};$$

$$\cos \alpha = \frac{SC_2}{SB_1};$$

daher durch Multiplication:

$$\cos \alpha \cdot \cos \beta = \frac{SC_2}{SA}.$$

In Worten: Projicirt man von drei aus einem Punkte gehenden Strecken die erste auf die zweite, und diese Projection auf die dritte, so ist die letzte Projection, dividirt durch die dritte Strecke, gleich dem Producte der Cosinus der beiden Zwischenwinkel. 23.

Anm. Fig. 7a zeigt die Construction, wenn beide Zwischenwinkel spitz sind, Fig. 7b, wenn einer derselben stumpf ist. — Der Satz 23 lässt sich auch auf mehr als zwei Winkel ausdehnen

**25. Cosinus der Summe zweier Winkel.** — Um den Cosinus der Summe zweier beliebiger Winkel  $ASB = \alpha$  und  $BSC = \beta$  (Fig. 8) durch die Cosinus von  $\alpha$  und  $\beta$  auszudrücken, verlängert man  $AS$ , errichtet  $SD \perp SB$ , macht  $SA = SB = SC = SD$ ,

Fig. 7a.






Fig. 7b.





und erhält so die Winkel  $CSD = R - \beta$  und  $DSE = R - \alpha$  (Th. II, 58). — Projicirt man dann, wie in der vorigen Nr.,

Fig. 8.



$SC$  auf  $SB$ ,  $SC_1$  auf  $SA$ ; ferner  $SC$  auf  $SD$ ,  $SC_3$  auf  $SA$ , endlich  $SC$  auf  $SA$ , so ist

$$1) \cos(\alpha + \beta) = \frac{SC_0}{SA}.$$

Nun ist

$$2) SC_0 = SC_2 + C_2C_0 \text{ (Th. II, 23).}$$

Da ferner  $SC_1CC_3$  ein Rechteck ist (drei Winkel sind  $R$ !), so ist  $C_1C \neq SC_3$ , also besteht zwischen den Projectionen  $C_2C_0$  und  $SC_4$  dieser Strecken die Beziehung:

$$3) C_2C_0 = SC_4 \text{ (Th. II, 349).}$$

Demnach ist, wenn man 3) in 2) einsetzt:

$$SC_0 = SC_2 + SC_4,$$

und dies in 1) eingesetzt, giebt:

$$4) \cos(\alpha + \beta) = \frac{SC_2}{SA} + \frac{SC_4}{SA}.$$

Nun ist nach 23:

$$5) \frac{SC_2}{SA} = \cos \alpha \cdot \cos \beta;$$

$$\frac{SC_4}{SA} = \cos CSD \cdot \cos DSA = \cos(R - \beta) \cdot \cos(R + \alpha),$$

oder, da  $R + \alpha$  und  $R - \alpha$  Supplementwinkel sind, und in Folge dessen nach 20

$$23a. \cos(R + \alpha) = -\cos(R - \alpha)$$

$$\text{ist, } 6) \frac{SC_4}{SA} = -\cos(R - \beta) \cdot \cos(R - \alpha).$$

Setzt man endlich 5) und 6) in 4) ein, so folgt:

$$24. \cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \cos(R - \alpha) \cdot \cos(R - \beta).$$

Anm. Die Ableitung dieser Formel bleibt ungeändert, wie auch die Winkel  $\alpha$  und  $\beta$  beschaffen sein mögen. — Der Vergleich mit 5 zeigt, dass letztere Formel in der That, wie verlangt wurde, nunmehr für beliebige Winkel gilt. Dasselbe findet natürlich für die aus 5 abgeleiteten Formeln 6 und 7 statt. Uebrigens wird Formel 24 ihre definitive Gestalt erst mit Hilfe des Sinus-Begriffes erhalten.



## 2. Die übrigen Funktionen.

**26. Vorbemerkung.** — Wie der Begriff des Cosinus, so bedürfen auch diejenigen der übrigen Funktionen einer Erweiterung, und zwar einer solchen, welche ihre Beziehungen zum Cosinus unverändert lässt. Wir definiren daher die übrigen Funktionen mit Hilfe des Cosinus, und erreichen dadurch ausserdem den Vortheil, dass ihre Eigenschaften sich aus denen des Cosinus durch blosse Rechnung ableiten lassen.

**27. Erklärungen.** — a) Unter dem Sinus eines beliebigen Winkels  $\alpha$  versteht man den Cosinus seines Complementwinkels.

$$\sin \alpha = \cos (R - \alpha). \quad 25.$$

b) Unter der Tangens eines beliebigen Winkels versteht man den Quotienten zwischen Sinus und Cosinus des Winkels.

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}. \quad 26.$$

c) Unter Secans, Cosecans, Cotangens eines beliebigen Winkels  $\alpha$  versteht man bezw. die reciproken Werthe von Cosinus, Sinus, Tangens des Winkels.

$$\sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha}; \operatorname{cosec} \alpha = \frac{1}{\sin \alpha}; \cot \alpha = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha}. \quad 27.$$

Anm. Mit Hilfe der Formeln 25, 26, 27 lassen sich alle übrigen Funktionen durch den Cosinus allein ausdrücken. — Unter den Eigenschaften der Funktionen werden künftig in der Regel nur diejenigen von  $\cos$ ,  $\sin$  und  $\operatorname{tg}$  berücksichtigt werden, da mittelst 27 die Eigenschaften der drei übrigen Funktionen sich leicht aus jenen ableiten lassen.

**28. Beziehungen zwischen den Funktionen zweier von einander abhängiger Winkel.** —

a) *Complementwinkel.* — Den Cosinus des Complementwinkels giebt 25. Den Sinus erhält man, wenn man in 25  $(R - \alpha)$  für  $\alpha$  setzt, die Tangens aus beiden Funktionen nach 26. — So folgt:

$$\cos (R - \alpha) = \sin \alpha; \sin (R - \alpha) = \cos \alpha; \operatorname{tg} (R - \alpha) = \cot \alpha. \quad 28.$$

Vervollständigt man diese Formeln mittelst 27, so erkennt man, dass der Satz 10 auch für beliebige Winkel gilt.

b) *Supplementwinkel.* — Den Cosinus des Supplementwinkels giebt 20. Den Sinus erhält man, wenn man in 25  $(2R - \alpha)$  für  $\alpha$  setzt, die Tangens aus 26. — So folgt:

$$\begin{aligned} \sin (2R - \alpha) &= \cos [R - (2R - \alpha)] = \cos (\alpha - R) \\ &= \cos (R - \alpha) \text{ (nach 19)} = \sin \alpha \text{ (nach 25)}. \end{aligned}$$



Also:

$$29. \cos(2R - \alpha) = -\cos \alpha; \sin(2R - \alpha) = \sin \alpha; \operatorname{tg}(2R - \alpha) = -\operatorname{tg} \alpha.$$

Supplementwinkel haben gleiche Sinus, aber entgegengesetzte Cosinus.

c) *Entgegengesetzte Winkel.* — Den Cosinus des entgegengesetzten Winkels giebt 19. Den Sinus erhält man, wenn man in 25 ( $-\alpha$ ) für  $\alpha$  setzt, die Tangens aus 26. — So folgt:

$$\begin{aligned} \sin(-\alpha) &= \cos(R + \alpha) = -\cos(R - \alpha) \text{ (nach 23a)} \\ &= -\sin \alpha \text{ (nach 25).} \end{aligned}$$

Also:

$$30. \cos(-\alpha) = \cos \alpha; \sin(-\alpha) = -\sin \alpha; \operatorname{tg}(-\alpha) = -\operatorname{tg} \alpha.$$

Entgegengesetzte Winkel haben entgegengesetzte Sinus, aber gleiche Cosinus.

29. *Funktionen der Grenzwinkel  $2R, 3R, 4R$ .* — Die Cosinus der Grenzwinkel giebt 21. Hieraus erhält man die übrigen Funktionen mittelst 25—27. Die Resultate sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt.

31.

|      | <i>sin</i> | <i>cos</i> | <i>tg</i> | <i>cot</i> | <i>sec</i>  | <i>cosec</i> |
|------|------------|------------|-----------|------------|-------------|--------------|
| 0    | 0          | +1         | 0         | $+\infty$  | +1          | $\mp\infty$  |
| $R$  | +1         | 0          | $+\infty$ | 0          | $\pm\infty$ | +1           |
| $2R$ | 0          | -1         | 0         | $-\infty$  | -1          | $\pm\infty$  |
| $3R$ | -1         | 0          | $-\infty$ | 0          | $\mp\infty$ | -1           |
| $4R$ | 0          | +1         | 0         | $+\infty$  | +1          | $\mp\infty$  |

Anm. Die Bestimmung des Vorzeichens von  $\infty$  bei den beiden letzten Funktionen erfolgt durch die Bemerkung, dass der Uebergang der Funktion aus dem Positiven ins Negative durch den Werth  $\infty$  hindurch stattfindet (bei den übrigen Funktionen erfolgt er durch 0 hindurch. Vgl. Th. II, S. 43 unten!)

30. *Funktionen der Summe und der Differenz zweier Winkel.* —

a) Ersetzt man in 24 die Cosinus der Complementwinkel (nach 25) durch die Sinus der Winkel, so folgt:

$$32. \cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta.$$

b) Es ist

$$33. \cos(\alpha - \beta) = \cos[\alpha + (-\beta)] = \cos \alpha \cdot \cos(-\beta) - \sin \alpha \cdot \sin(-\beta); \quad (32)$$

$$\text{oder: } \cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta + \sin \alpha \cdot \sin \beta. \quad (30)$$



c) Es ist

$$\begin{aligned}\sin(\alpha + \beta) &= \cos[(R - \alpha) - \beta] \quad (25) \\ &= \cos(R - \alpha) \cdot \cos \beta + \sin(R - \alpha) \cdot \sin \beta; \quad (33)\end{aligned}$$

oder:

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta. \quad (28) \quad 34.$$

d) Es ist

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin[\alpha + (-\beta)] = \sin \alpha \cdot \cos(-\beta) + \cos \alpha \cdot \sin(-\beta); \quad (34)$$

oder:

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta - \cos \alpha \cdot \sin \beta. \quad (30) \quad 35.$$

e) Dividirt man 34 durch 32, und dividirt rechts jedes Glied des Zählers und des Nenners durch  $\cos \alpha \cdot \cos \beta$ , so folgt nach 26:

$$\operatorname{tg}(\alpha + \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta}{1 - \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta}. \quad 36.$$

f) Dividirt man 35 durch 33, und verfährt wie in e), so folgt:

$$\operatorname{tg}(\alpha - \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta}{1 + \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta}. \quad 37.$$

*Spezieller Fall.* — Setzt man in 33  $\alpha = \beta$ , so folgt mit Rücksicht auf 21:

$$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1. \quad 38.$$

Anm. Es gilt also Formel 14 auch für beliebige Winkel. — Die Substitution  $\alpha = \beta$ , auf 35 und 37 angewendet, giebt das Resultat  $0 = 0$ . — Dieselbe Substitution wird in der folgenden Nr. auf die Formeln 32, 34, 36 angewendet werden.

**31. Funktionen des Doppelten eines Winkels.** — Setzt man in den Formeln 32, 34, 36  $\alpha = \beta$ , so folgt:

$$\text{a) } \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha, \quad 39.$$

oder mit Benutzung von 38:

$$\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha = 2\cos^2 \alpha - 1. \quad 39a.$$

$$\text{b) } \sin 2\alpha = 2\sin \alpha \cdot \cos \alpha. \quad 40.$$

$$\text{c) } \operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2\operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}. \quad 41.$$

**32. Funktionen der Hälfte eines Winkels.** — a) Addirt man 38 und 39, nachdem man in 39 die beiden Seiten vertauscht, so folgt:

$$2\cos^2 \alpha = 1 + \cos 2\alpha,$$

und hieraus

$$\cos \alpha = \sqrt{\frac{1 + \cos 2\alpha}{2}},$$



oder, wenn man  $2\alpha = \beta$ , und folglich  $\alpha = \frac{\beta}{2}$  setzt:

$$42. \quad \cos \frac{\beta}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos \beta}{2}}.$$

b) Subtrahirt man 39 von 38, nachdem man in 39 die beiden Seiten vertauscht, so folgt:

$$2 \sin^2 \alpha = 1 - \cos 2\alpha,$$

und hieraus:  $\sin \alpha = \sqrt{\frac{1 - \cos 2\alpha}{2}},$

oder, wenn man  $2\alpha = \beta$ , und folglich  $\alpha = \frac{\beta}{2}$  setzt:

$$43. \quad \sin \frac{\beta}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \beta}{2}}.$$

c) Dividirt man 43 durch 42, so folgt:

$$44. \quad \operatorname{tg} \frac{\beta}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \beta}{1 + \cos \beta}},$$

oder, je nachdem man den Bruch unter der Wurzel mit  $1 + \cos \beta$  oder  $1 - \cos \beta$  erweitert, nach 38:

$$44a. \quad \operatorname{tg} \frac{\beta}{2} = \frac{\sin \beta}{1 + \cos \beta} = \frac{1 - \cos \beta}{\sin \beta}.$$

Anm. Die Funktion  $\operatorname{tg} \frac{\beta}{2}$  hat die Eigenschaft, dass sich alle Funktionen von  $\beta$  rational durch dieselbe ausdrücken lassen. Man führe diese Rechnung aus 1) für den Cosinus (mittelst 44), 2) für den Sinus (mittelst 38), 3) für die Tangens (mittelst 26).

**33. Summe und Differenz zweier Sinus oder zweier Cosinus.** — Setzt man in den Formeln 32—35 überall  $\sigma$  für  $\alpha$  und  $\delta$  für  $\beta$ , so giebt:

$$34) + 35) \quad \sin(\sigma + \delta) + \sin(\sigma - \delta) = 2 \cdot \sin \sigma \cdot \cos \delta;$$

$$34) - 35) \quad \sin(\sigma + \delta) - \sin(\sigma - \delta) = 2 \cdot \cos \sigma \cdot \sin \delta;$$

$$33) + 32) \quad \cos(\sigma - \delta) + \cos(\sigma + \delta) = 2 \cdot \cos \sigma \cdot \cos \delta;$$

$$33) - 32) \quad \cos(\sigma - \delta) - \cos(\sigma + \delta) = 2 \cdot \sin \sigma \cdot \sin \delta.$$

Setzt man nun links

$$45. \quad \sigma = \frac{\alpha + \beta}{2}, \quad \delta = \frac{\alpha - \beta}{2},$$

$$45a. \quad \text{woraus folgt} \quad \sigma + \delta = \alpha, \quad \sigma - \delta = \beta,$$

so nehmen die vier Formeln folgende Gestalt an:



$$\left. \begin{aligned} \sin \alpha + \sin \beta &= 2 \cdot \sin \sigma \cdot \cos \delta; \\ \sin \alpha - \sin \beta &= 2 \cdot \cos \sigma \cdot \sin \delta; \\ \cos \beta + \cos \alpha &= 2 \cdot \cos \sigma \cdot \cos \delta; \\ \cos \beta - \cos \alpha &= 2 \cdot \sin \sigma \cdot \sin \delta. \end{aligned} \right\} \quad 46.$$

Anm. Diese Formeln dienen dazu, eine Summe oder Differenz zweier Sinus oder Cosinus (zum Zweck der bequemeren logarithmischen Berechnung) in ein Product von Funktionen zu verwandeln.

## B. Die Winkelfunktionen in transcenderter und Reihenform.

**34. Vorbemerkung.** — Zwischen den Winkelfunktionen und der transcendenten Funktion  $a^x$  besteht der Zusammenhang, dass die ersteren sich durch die letztere ausdrücken lassen. Da nun, wie im Folgenden gezeigt werden soll, die Funktion  $a^x$  sich als unendliche, nach Potenzen von  $x$  fortschreitende Reihe darstellen lässt, so gilt dasselbe für die Winkelfunktionen. — Der Nutzen dieser Darstellung besteht darin, dass die Winkelfunktionen als unendliche Reihen in algebraischer Form erscheinen, und in Folge dessen ihre Berechnung mit beliebig weit gehender Genauigkeit ausgeführt werden kann.

Für den Zweck dieser neuen Darstellung der Winkelfunktionen benutzt man nicht mehr den rechten Winkel mit seinen Theilen: Grad, Minute, Secunde, als Masseinheiten, sondern es wird der Winkel, als Centriwinkel eines beliebigen Kreises betrachtet, durch den zugehörigen Bogen ersetzt, und dieser durch den Radius gemessen. Ist nämlich  $\alpha$  ein beliebiger Winkel,  $a$  der zugehörige Bogen in dem mit  $r$ , und  $a_1$  der zugehörige Bogen in dem mit  $r_1$  beschriebenen Kreise, so ist (Th. II, 287)

$$\frac{\alpha}{4R} = \frac{a}{2r\pi} = \frac{a_1}{2r_1\pi};$$

also 
$$\frac{a}{r} = \frac{a_1}{r_1} = x,$$

und  $x$  als Quotient zweier Strecken eine Zahl. Ferner folgt:

$$\alpha = \frac{2R}{\pi} \cdot x; \quad x = \frac{\pi\alpha}{2R}. \quad 47.$$

Diese Formeln zeigen, wie ein in der einen Masseinheit gegebener Winkel durch die andere ausgedrückt werden kann. Insbesondere ist für

$$\alpha = R, \quad 2R, \quad 4R.$$

$$x = \frac{\pi}{2}, \quad \pi, \quad 2\pi.$$



Anm. Wie gross ist  $\alpha$  für  $x=1$ ? D. h.: wie gross ist der Centriwinkel, dessen zugehöriger Bogen dem Radius gleich ist?

**35. Darstellung der Funktion  $a^x$  in Reihenform.** — Wir setzen

$$(1) \quad F_x = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots,$$

und suchen die Coefficienten  $a_0, a_1, a_2 \dots$  so zu bestimmen, dass die hiernach für  $F_x, F_y$  und  $F_{x+y}$  gebildeten Reihen der Bedingung

$$(2) \quad F_x \cdot F_y = F_{(x+y)}$$

genügen. Es soll also sein

$$\begin{aligned} & F_x(a_0 + a_1 y + a_2 y^2 + a_3 y^3 + \dots) \\ &= a_0 + a_1(x+y) + a_2(x+y)^2 + a_3(x+y)^3 + \dots, \end{aligned}$$

oder, nach Potenzen von  $y$  geordnet:

$$\begin{aligned} & a_0 F_x + a_1 F_x y + a_2 F_x y^2 + \dots \\ &= (a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots) + y(a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + \dots) \end{aligned}$$

Da nun diese Formel für jeden Werth von  $y$  gelten soll, so müssen die Coefficienten gleichhoher Potenzen von  $y$  einander gleich sein, z. B. die Coefficienten von  $y$ :

$$\begin{aligned} & a_1 a_0 + a_1 a_1 x + a_1 a_2 x^2 + a_1 a_3 x^3 + \dots \\ &= a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + 4a_4 x^3 + \dots \end{aligned}$$

Da diese Formel für jeden Werth von  $x$  gelten soll, so müssen die Coefficienten gleichhoher Potenzen von  $x$  einander gleich sein; d. h.:

$$a_1 a_0 = a_1; \quad a_1 a_1 = 2a_2; \quad a_1 a_2 = 3a_3; \quad a_1 a_3 = 4a_4; \quad \dots \quad a_1 a_{n-1} = n a_n;$$

oder:

$$a_0 = 1; \quad a_2 = \frac{a_1^2}{2!}; \quad a_3 = \frac{a_1^3}{3!}; \quad a_4 = \frac{a_1^4}{4!}; \quad \dots \quad a_n = \frac{a_1^n}{n!}.$$

Durch Einsetzung dieser Werthe in (1) erhält man:

$$(3) \quad F_x = 1 + a_1 x + \frac{a_1^2}{2!} x^2 + \frac{a_1^3}{3!} x^3 + \dots$$

Setzt man nun in (2)  $x=1$ , und  $y$  nach einander gleich 1, 2, 3, ...  $(x-1)$ , so folgt:

$$(F_1)^2 = F_2; \quad F_1 \cdot F_2 = F_3; \quad F_1 \cdot F_3 = F_4; \quad \dots \quad F_1 \cdot F_{x-1} = F_x,$$

und durch Multiplication aller dieser Formeln:

$$(4) \quad (F_1)^x = F_x.$$

Setzt man endlich den Werth, welchen  $F_1$  für  $a_1 = 1$  annimmt, gleich  $e$ , sodass



$$(5) \quad e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots \quad 48.$$

ist, so folgt aus (4) und (3)

$$(6) \quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \quad 49.$$

Aus (6) erhält man nun leicht die Reihe für  $a^x$ . Setzt man nämlich in (6)  $a_1 x$  für  $x$ , so folgt mit Rücksicht auf (3)

$$(7) \quad e^{a_1 x} = F_x, \text{ oder } (e^{a_1})^x = F_x.$$

Setzt man endlich

$$e^{a_1} = a,$$

woraus

$$(8) \quad a_1 = \overset{e}{l} a \quad 50.$$

folgt, so geht (7) über in

$$(9) \quad a^x = 1 + a_1 x + \frac{a_1^2}{2!} x^2 + \frac{a_1^3}{3!} x^3 + \dots \quad 51.$$

**36. Die Zahl  $e$ .** — Das Bildungsgesetz der Reihe (5) besteht darin, dass man das  $n^{\text{te}}$  Glied aus dem  $(n-1)^{\text{ten}}$  durch Multiplication mit  $\frac{1}{n-1}$  erhält. Sie ist also weder arithmetisch noch geometrisch. Es ist nun zuerst zu untersuchen, ob der Werth der Reihe mit wachsender Gliederzahl sich einer bestimmten Grösse nähert, oder ins Unendliche wächst. Im ersten Falle hat  $e$  einen bestimmten Werth, im zweiten den Werth  $\infty$ .

Eine unendliche Reihe heisst convergent oder divergent, je nachdem ihr Werth mit wachsender Gliederzahl sich einer festen Grenze nähert, oder über jede Grenze hinaus wächst. Unter dem Quotienten einer unendlichen Reihe versteht man den positiven Werth des Quotienten zwischen irgend einem ihrer Glieder und dem vorhergehenden. Nun ist die unendliche geometrische Reihe (s. Th. I, Nr. 143) convergent, wenn ihr Quotient kleiner als Eins ist. Dieser Quotient ist für je zwei auf einander folgende Glieder stets derselbe. Umsomehr wird daher eine allgemeine unendliche Reihe convergent sein, wenn ihr Quotient von irgend einem Gliede an beständig kleiner als Eins ist und beständig abnimmt, sodass er von irgend einem Gliede der Reihe an beständig kleiner bleibt als irgend eine gegebene Zahl  $q$ , die kleiner als Eins ist. Denn die ganze Reihe würde noch convergiren, wenn man sie von diesem Gliede an mit dem unveränderlichen Quotienten  $q$  fortsetzte. Ihr erster, endlicher Theil wäre dann eine



endliche Grösse, ihr zweiter eine convergirende unendliche geometrische Reihe. Man kann also den Satz aussprechen:

51a. Eine unendliche Reihe convergirt, wenn ihr Quotient von irgend einem Gliede an beständig kleiner bleibt, als eine gegebene Zahl, die kleiner als Eins ist.

Der Quotient der Reihe (9) ist nun

$$\frac{a_1^n}{n!} x^n : \frac{a_1^{n-1}}{(n-1)!} x^{n-1} = \frac{a_1 x}{n}.$$

Da  $a_1$  und  $x$  unveränderlich sind, während  $n$  beständig wächst, so ist der Quotient von dem ersten Gliede an, für welches  $a_1 x < n$  ist, kleiner als Eins, und nimmt beständig ab. Demnach convergirt die Reihe (9) für jeden reellen Werth von  $a_1$  und  $x$ .

Es ist also auch  $e^x$  für jeden endlichen Werth von  $x$  selbst eine endliche Grösse, und die Reihe (6) ist convergent. — Demnach ist auch  $e$  eine endliche Grösse, deren Berechnung in Form eines Decimalbruches den Werth liefert:

52. 
$$e = 2,718281828 \dots$$

Anm. Die Zahl  $e$  ist Grundzahl des natürlichen Logarithmensystems (vgl. Th. I, S. 137, Fussnote).

**37. Die Funktionen  $\cos$  und  $\sin$  in transcendenter und in Reihenform.** — Setzt man in (6)  $xi$  für  $x$ , so folgt (Th. I, 118)

$$(1) \quad e^{xi} = 1 + xi - \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3 i}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5 i}{5!} - \dots,$$

oder, wenn man

$$(2) \quad \begin{cases} f_x = 1 - \frac{x}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots \\ \varphi_x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots \end{cases}$$

setzt: (3) 
$$e^{xi} = f_x + i \cdot \varphi_x.$$

Ebenso ist

$$(4) \quad e^{yi} = f_y + i \cdot \varphi_y$$

und (5) 
$$e^{(x+y)i} = f_{(x+y)} + i \cdot \varphi_{(x+y)}.$$

Wenn man nun die Potenz mit imaginären Exponenten durch die Festsetzung bestimmt, dass

$$(6) \quad e^{xi} \cdot e^{yi} = e^{(x+y)i}$$

ist (wodurch nur die Regel 41 in Th. I auf imaginäre Exponenten ausgedehnt wird), so folgt, wenn man für diese drei Potenzen ihre Werthe einsetzt:



$$f_x f_y - \varphi_x \varphi_y + i(f_x \varphi_y + \varphi_x f_y) = f_{(x+y)} + i\varphi_{(x+y)}.$$

Nun können aber zwei complexe Zahlen nur dann einander gleich sein, wenn sowohl ihre reellen, wie ihre imaginären Theile einander gleich sind.\*) Aus der letzten Formel folgt also:

$$f_{(x+y)} = f_x f_y - \varphi_x \varphi_y; \quad \varphi_{(x+y)} = f_x \varphi_y + \varphi_x f_y.$$

Vergleicht man diese beiden Formeln mit 32 und 34, so zeigt sich, dass die Funktionen  $f$  und  $\varphi$  genau den Bedingungen genügen, welche in jenen Formeln für  $\cos$  und  $\sin$  enthalten sind. Und da die Funktionen  $\cos$  und  $\sin$  durch die Formeln 32 und 34 vollständig definirt sind, so ist  $f$  mit  $\cos$  und  $\varphi$  mit  $\sin$  identisch. Man erhält also, wenn man für  $f_x$  und  $\varphi_x$  einerseits  $\cos x$  und  $\sin x$ , andererseits ihre oben aufgestellten Werthe (2) in Reihenform einsetzt:

$$\left. \begin{aligned} \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots \\ \sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots \end{aligned} \right\} \quad 53.$$

Die Formel (3) geht nun über in:

$$e^{xi} = \cos x + i \sin x. \quad 54.$$

Setzt man hierin  $(-x)$  für  $x$ , so folgt mit Rücksicht auf 30:

$$e^{-xi} = \cos x - i \sin x.$$

Und aus den beiden letzten Formeln folgt weiter:

$$\cos x = \frac{e^{xi} + e^{-xi}}{2}; \quad \sin x = \frac{e^{xi} - e^{-xi}}{2i}. \quad 55.$$

Ferner folgt aus (6), wenn man nach 54 die Potenzen von  $e$  durch die Winkelfunktionen ersetzt:

$$(\cos x + i \sin x)(\cos y + i \sin y) = \cos(x+y) + i \sin(x+y). \quad 56.$$

Setzt man hierin  $x=y$ , so folgt:

$$(\cos x + i \sin x)^2 = \cos 2x + i \sin 2x,$$

und allgemein:

$$(\cos x + i \sin x)^n = \cos nx + i \sin nx. \quad 57.$$

Entwickelt man in dieser Formel die linke Seite nach Th. I, 192, und setzt die reellen und die imaginären Theile einander gleich, so folgt:

---

\*) Denn aus  $a + bi = a_1 + b_1 i$  folgt  $(a - a_1) = (b_1 - b)i$ . Da aber eine reelle Zahl einer imaginären nicht gleich sein kann, so muss (wenn  $a, b, a_1, b_1$  reell sind)  $b_1 - b = 0$  sein, woraus  $a - a_1 = 0$  folgt. Es muss also  $a = a_1$  und  $b = b_1$  sein.



$$58. \begin{cases} \cos nx = \cos^n x - n \cdot^2 \cos^{n-2} x \cdot \sin^2 x + n \cdot^4 \cos^{n-4} x \cdot \sin^4 x - \dots \\ \sin nx = n \cdot \cos^{n-1} x \cdot \sin x - n \cdot^3 \cos^{n-3} x \cdot \sin^3 x + n \cdot^5 \cos^{n-5} x \cdot \sin^5 x - \dots \end{cases}$$

Anm. In den Formeln 56 und 57 sind 32, 34, 39, 40 enthalten

Für  $x = \frac{\pi}{2}$  ist  $\cos x = 0$ ,  $\sin x = 1$ ; also geht 54 über in:

$$e^{\frac{\pi}{2}i} = i,$$

$$59. \text{ oder, mit } i \text{ potenziert: } e^{-\frac{\pi}{2}} = i^i.$$

Anm. Die Darstellung der übrigen trigonometrischen Funktionen in Reihenform wird ihrer geringeren Wichtigkeit wegen hier übergangen.

**38. Die Funktionen des Logarithmus und der Wurzel.** — Potenzirt man die Formel

$$(1) e^{\frac{\pi}{2}i} = i$$

$$\text{mit 2, so folgt: } (2) e^{\pi i} = -1.$$

Dies, mit 2 potenziert, giebt:

$$(3) e^{2\pi i} = +1.$$

Bedeutet ferner  $n$  eine ganze Zahl, so giebt (3), mit  $n$  potenziert:

$$(4) e^{2n\pi i} = +1;$$

$$\text{ferner giebt (4) } \times (1) \quad (5) e^{\left(2n + \frac{1}{2}\right)\pi i} = +i;$$

$$\text{ferner (4) } \times (2) \quad (6) e^{(2n+1)\pi i} = -1;$$

$$\text{endlich (6) } \times (1) \quad (7) e^{\left(2n + \frac{3}{2}\right)\pi i} = -i.$$

Die Formeln (4) bis (7) kann man auch schreiben:

$$60. e^{4n \cdot \frac{\pi}{2}i} = +1; e^{(4n+1) \cdot \frac{\pi}{2}i} = +i; e^{(4n+2) \cdot \frac{\pi}{2}i} = -1; e^{(4n+3) \cdot \frac{\pi}{2}i} = -i.$$

Setzt man in 54 der Reihe nach  $x = 4n \cdot \frac{\pi}{2}$ ,  $(4n+1) \cdot \frac{\pi}{2}$ ,  $(4n+2) \cdot \frac{\pi}{2}$ ,  $(4n+3) \cdot \frac{\pi}{2}$ , so folgt mit Rücksicht auf 60:

$$\cos 4n \frac{\pi}{2} + i \sin 4n \frac{\pi}{2} = e^{4n \cdot \frac{\pi}{2}i} = +1;$$

$$\cos (4n+1) \frac{\pi}{2} + i \sin (4n+1) \frac{\pi}{2} = e^{(4n+1) \cdot \frac{\pi}{2}i} = +i;$$

$$\cos (4n+2) \frac{\pi}{2} + i \sin (4n+2) \frac{\pi}{2} = e^{(4n+2) \cdot \frac{\pi}{2}i} = -1;$$

$$\cos (4n+3) \frac{\pi}{2} + i \sin (4n+3) \frac{\pi}{2} = e^{(4n+3) \cdot \frac{\pi}{2}i} = -i.$$



Daher durch Trennung der reellen Theile von den imaginären:

$$\left. \begin{aligned} \cos 4n \frac{\pi}{2} = +1; \cos(4n+1) \frac{\pi}{2} = 0; \cos(4n+2) \frac{\pi}{2} = -1; \cos(4n+3) \frac{\pi}{2} = 0; \\ \sin 4n \frac{\pi}{2} = 0; \sin(4n+1) \frac{\pi}{2} = +1; \sin(4n+2) \frac{\pi}{2} = 0; \sin(4n+3) \frac{\pi}{2} = -1. \end{aligned} \right\} 61.$$

Anm. In diesen Formeln sind die in 31 gegebenen Werthe von  $\sin$  und  $\cos$  als specielle Fälle enthalten.

Setzt man

$$e^x = c, \text{ also } {}^e\!l c = x,$$

so gehört zu jedem reellen positiven Werthe von  $x$  ein Werth von  $c$ , aber auch umgekehrt zu jedem reellen positiven Werthe von  $c$  ein Werth von  $x$ . Multiplicirt man nun  $e^x = c$  mit (4), so folgt:

$$e^{x+2n\pi i} = c;$$

also: 
$${}^e\!l c = x + 2n\pi i;$$

d. h.: Eine reelle positive Zahl hat unendlich viele 62. Logarithmen, von denen aber nur einer reell ist (für  $n=0$ ).

Multiplicirt man  $e^x = c$  mit (6), so folgt:

$$e^{x+(2n+1)\pi i} = -c;$$

also: 
$${}^e\!l(-c) = x + (2n+1)\pi i;$$

d. h.: Eine reelle negative Zahl hat unendlich viele 62a. Logarithmen, die sämmtlich imaginär sind.

Anm. Aus (5) folgt:

$$\left(2n + \frac{1}{2}\right)\pi i = {}^e\!l i;$$

also für  $n=0$ :

$$\frac{\pi}{2} = \frac{{}^e\!l i}{i}. \quad 63.$$

Potenzirt man die Formel (4) mit  $\frac{1}{k}$  (wobei  $k$  eine ganze positive Zahl ist), so folgt:

$$\sqrt[k]{1} = e^{\frac{2n\pi i}{k}}. \quad 64.$$

Setzt man  $n$  der Reihe nach den Zahlen  $0, 1, 2, \dots (k-1)$

gleich, so erhält man lauter verschiedene Werthe für  $\sqrt[k]{1}$ .

Dem aus  $e^{\frac{2r\pi i}{k}} = e^{\frac{2s\pi i}{k}}$  (wobei  $r$  und  $s < k$  sind) würde folgen:



$e^{\frac{2(r-s)\pi i}{k}} = +1$ ; d. h.: es müsste  $\frac{r-s}{k}$  eine ganze Zahl sein, was nicht möglich ist.

Setzt man  $n$  gleich einer Zahl, die  $\geq k$  ist, also gleich  $(rk + s)$  (wobei  $s < k$  ist), so ist

$$e^{\frac{2(rk+s)\pi i}{k}} = e^{2r\pi i} \cdot e^{\frac{2s\pi i}{k}} = e^{\frac{2s\pi i}{k}},$$

also gleich einem der früheren Werthe.

Demnach hat der Ausdruck  $\sqrt[k]{1}$   $k$  von einander verschiedene Werthe, die man erhält, wenn man in 64 für  $n$  der Reihe nach die Zahlen  $0, 1, 2, \dots, (k-1)$  setzt. Einer dieser Werthe (für  $n=0$ ) ist stets reell, nämlich  $+1$ . — Ist  $s < k$ , so sind je zwei der übrigen Werthe durch die Beziehung verbunden:

$$e^{\frac{2s\pi i}{k}} \cdot e^{\frac{2(k-s)\pi i}{k}} = e^{2k\pi i} = +1.$$

Ist nun  $k$  ungerade, so ist die Anzahl dieser übrigen Werthe gerade, und sie lassen sich alle paarweise so ordnen, dass das Product jedes Paares gleich 1 ist. Alle diese Werthe sind dann imaginär. — Ist aber  $k$  gerade, so bleibt in der Mitte der Reihe der Werth übrig, welcher der Annahme  $n = \frac{k}{2}$  entspricht. Aber für  $n = \frac{k}{2}$  ist  $\sqrt[k]{1} = e^{\pi i} = -1$ . In diesem Falle existirt also noch der zweite reelle Werth  $-1$ .

Anm. Vgl. Th. I, Nr. 98, 108, 113.

Da  $\sqrt[k]{a} = \sqrt[k]{1} \cdot \sqrt[k]{a}$  ist, so hat auch die  $\sqrt[k]{a}$   $k$  verschiedene Werthe, und die Gleichung  $x^n = a$  hat  $n$  verschiedene Wurzeln.

Anm. Der Beweis des allgemeinen Satzes, dass jede Gleichung  $n^{\text{ten}}$  Grades  $n$  Wurzeln besitzt, erfordert Betrachtungen, die nicht hierher gehören.

**39. Die inversen trigonometrischen Funktionen.** — Setzt man in 55  $x + 2n\pi$  für  $x$ , so bleibt (nach 60) die rechte Seite in beiden Formeln unverändert; mithin ist

$\cos(x + 2n\pi) = \cos x$ ;  $\sin(x + 2n\pi) = \sin x$ ;  $\operatorname{tg}(x + 2n\pi) = \operatorname{tg} x$  (vgl. 18). — Während also zu jedem Werthe von  $x$  ein bestimmter Werth von  $\cos x$ ,  $\sin x$ ,  $\operatorname{tg} x$  gehört, giebt es unendlich viele (in dem Ausdruck  $x + 2n\pi$  enthaltene) Zahlen, welche zu demselben Funktionswerthe von  $\sin$ ,  $\cos$  oder  $\operatorname{tg}$  gehören. — Stellt man sich also die Aufgabe,  $x$  als Funktion von  $\sin x$ ,



$\cos x$ ,  $\operatorname{tg} x$  darzustellen, so muss der Werth von  $x$  in solche Grenzen eingeschlossen werden, dass z. B. einem Werthe von  $\sin x$  nur ein Werth von  $x$  entspricht. Man setzt zu diesem Zwecke voraus, dass  $x$  zwischen 0 und  $\frac{\pi}{2}$  liege, da in diesem Intervall  $x$  und die zugehörige Funktion einander gegenseitig vollkommen bestimmen (s. Nr. 17).

Ist nun

$$\sin x = y; \cos x = z; \operatorname{tg} x = u,$$

so nennt man  $x$  den *arcussinus* von  $y$ , oder den *arcuscosinus* von  $z$ , oder den *arcustangens* von  $u$ , und schreibt

$$x = \arcsin y; x = \arccos z; x = \operatorname{arctg} u.$$

**40. Die Funktion arcustangens in Reihenform.** — Setzt man in der Formel 37

$$(1) \quad \operatorname{tg}(\alpha - \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta}{1 + \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta}$$

$$(2) \quad \operatorname{tg} \alpha = x + y; \operatorname{tg} \beta = x; \text{ also } \operatorname{tg}(\alpha - \beta) = \frac{y}{1 + x^2 + xy},$$

so folgt hieraus:

$$(3) \quad \alpha = \operatorname{arctg}(x + y); \beta = \operatorname{arctg} x; (\alpha - \beta) = \operatorname{arctg} \frac{y}{1 + x^2 + xy};$$

folglich:

$$(4) \quad \operatorname{arctg}(x + y) - \operatorname{arctg} x = \operatorname{arctg} \frac{y}{1 + x^2 + xy}.$$

Um nun  $\operatorname{arctg} x$  in Form einer Reihe darzustellen, setzen wir

$$(5) \quad \operatorname{arctg} x = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots,$$

und suchen die Coefficienten  $a_0, a_1, a_2 \dots$  so zu bestimmen, dass die hiernach für  $\operatorname{arctg}(x + y)$  und  $\operatorname{arctg} \frac{y}{1 + x^2 + xy}$  gebildeten Reihen der Bedingung (4) genügen.

Nun ist zunächst, für  $x=0$ ,  $\operatorname{tg} 0=0$  (31), also  $\operatorname{arctg} 0=0$ ; d. h.:  $a_0=0$ . — Dann folgt aus (5)

$$x = \operatorname{tg}(a_1 x + a_2 x^2 + \dots)$$

Nun ist aus 53 ersichtlich, dass, wenn man die Reihe für  $\sin x$  durch diejenige für  $\cos x$  dividirt, das erste Glied des Quotienten  $x$  ist, während alle folgenden höhere Potenzen von  $x$  enthalten (vgl. Th. I, 88). Mithin ist in der Reihe für  $\operatorname{tg}(a_1 x + a_2 x^2 + \dots)$  das erste Glied  $a_1 x + a_2 x^2 + \dots$ , d. h.:  $x = a_1 x + a_2 x^2 + \dots$ , folglich  $a_1=1$ . Demnach geht (5) über in

$$(6) \quad \operatorname{arctg} x = x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots$$



Setzt man nun in (4) die Reihen ein, welche aus (6) für  $\operatorname{arctg}(x+y)$  und  $\operatorname{arctg} \frac{y}{1+x^2+xy}$  folgen, so erhält man:

$$(x+y) + a_2(x+y)^2 + a_3(x+y)^3 + \dots - \operatorname{arctg} x = \frac{y}{(1+x^2)+xy} + \dots$$

oder, nach Potenzen von  $y$  entwickelt:

$$(x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots) + y(1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \dots) = \operatorname{arctg} x + \frac{y}{1+x^2} + \dots$$

Da nun diese Formel für jeden Werth von  $y$  gelten soll, so müssen die Coefficienten gleichhoher Potenzen von  $y$  einander gleich sein, z. B. die Coefficienten von  $x$ :

$$1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \dots = \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \dots$$

(nach Th. I, 148, jedoch nur unter der Bedingung, dass  $x < 1$  ist; s. d. Fussnote a. a. O.).

Da diese Formel für jeden Werth von  $x (< 1)$  gelten soll, so müssen die Coefficienten gleichhoher Potenzen von  $x$  einander gleich sein; d. h.:

$$a_2 = a_4 = a_6 = \dots = 0;$$

$$3a_3 = -1; 5a_5 = +1; 7a_7 = -1; \dots$$

oder:  $a_3 = -\frac{1}{3}; a_5 = +\frac{1}{5}; a_7 = -\frac{1}{7}; \dots$

Durch Einsetzung dieser Werthe in (6) erhält man:

$$65. \quad \operatorname{arctg} x = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + \dots$$

Der Quotient dieser Reihe ist ( $n^{\text{tes}}$  Glied durch das  $(n-1)^{\text{te}}$  dividirt):

$$\pm \frac{1}{2n-1} x^{2n-1} : \mp \frac{1}{2n-3} x^{2n-3} = -\frac{2n-3}{2n-1} x^2.$$

Da  $x < 1$  ist, so ist der Quotient  $< 1$ , und bleibt auch, wenn  $n$  zunimmt, beständig kleiner als die Zahl  $x^2$ , welche selbst  $< 1$  ist. Daher convergirt die Reihe nach 51a.

Anm. Die Darstellung der übrigen inversen Funktionen in Reihenform wird ihrer geringeren Wichtigkeit wegen hier übergangen.

#### 41. Zusammenhang zwischen den Funktionen $\log$ und $\operatorname{arctg}$ .—

Sei  $a = c \cdot \cos x, b = c \cdot \sin x,$   
also (nach 38)

$$(1) \quad a^2 + b^2 = c^2; \quad \frac{b}{a} = \operatorname{tg} x.$$



Dann ist

$$(2) \quad \begin{cases} a + bi = c(\cos x + i \sin x) = ce^{xi} \\ a - bi = c(\cos x - i \sin x) = ce^{-xi}, \end{cases} \quad (54)$$

d. h.: Jede complexe Zahl  $a \pm bi$  kann in der Form 66.  $ce^{\pm xi}$  dargestellt werden, wobei  $c = \sqrt{a^2 + b^2}$  und  $x = \arctg \frac{b}{a}$  ist.

Logarithmirt man (2) nach  $e$ , so folgt mit Rücksicht auf (1)

$${}^e\mathcal{L}(a \pm bi) = \frac{1}{2} {}^e\mathcal{L}(a^2 + b^2) \pm i \cdot \arctg \frac{b}{a}. \quad 67.$$

Durch diese Formel ist der Logarithmus einer complexen Zahl selbst als complexe Zahl dargestellt, und auf den Logarithmus einer reellen Zahl und eine *arcustangens*-Funktion zurückgeführt.

Dividirt man die beiden Formeln (2) durch einander, so folgt:

$$\frac{a + bi}{a - bi} = e^{2xi},$$

oder, nach  $e$  logarithmirt:

$${}^e\mathcal{L} \frac{a + bi}{a - bi} = 2i \cdot \arctg \frac{b}{a},$$

oder, wenn man  $\frac{b}{a} = z$  setzt:

$$\arctg z = \frac{1}{2i} \cdot {}^e\mathcal{L} \frac{1 + zi}{1 - zi}. \quad 68.$$

Mittelst dieser Formel ist die *arcustangens*-Funktion durch einen Logarithmus ausgedrückt.

**42. Die logarithmische Reihe.** — Setzt man in der complexen Zahl  $a \pm bi$  für  $a$  und  $b$  imaginäre Zahlen, nämlich

$$(1) \quad a = \pm vi, \quad b = \mp ui,$$

wobei  $u, v$  reell sind, so ist

$$a \pm bi = u \pm vi;$$

d. h.: Die Substitution (1) verwandelt die complexe Zahl  $a \pm bi$  wieder in eine andere complexe Zahl mit reellen Coefficienten. Es ist hiernach gleichgiltig, ob man in der complexen Zahl  $a \pm bi$  die Grössen  $a$  und  $b$  für reell oder imaginär ansieht.

Setzt man nun in 68

$$zi = y, \text{ also } z = -iy,$$

so ist zunächst nach 65



$$\begin{aligned}
 \operatorname{arctg}(-iy) &= -\left[ iy - \frac{1}{3} (iy)^3 + \frac{1}{5} (iy)^5 - \dots \right] \\
 &= -\left[ iy + \frac{1}{3} iy^3 + \frac{1}{5} iy^5 + \dots \right] \quad (\text{Th. I, 118}) \\
 &= -i \left[ y + \frac{1}{3} y^3 + \frac{1}{5} y^5 + \dots \right]
 \end{aligned}$$

Demnach aus 68

$$\frac{1}{2i} {}^e\!l \frac{1+y}{1-y} = -i \left[ y + \frac{1}{3} y^3 + \frac{1}{5} y^5 + \dots \right],$$

oder, mit  $2i$  multiplicirt (da  $-i^2 = +1$  ist):

$$69. \quad {}^e\!l \frac{1+y}{1-y} = 2 \left[ y + \frac{1}{3} y^3 + \frac{1}{5} y^5 + \frac{1}{7} y^7 + \dots \right],$$

eine Formel, welche zur Berechnung der natürlichen Logarithmen dient, für den Fall, dass  $y < 1$  ist.

**43. Berechnung von Logarithmen.** — Soll hiernach der natürliche Logarithmus einer beliebigen positiven reellen Zahl  $n$  berechnet werden, so muss  $n$  auf die Form  $\frac{1+y}{1-y}$  ge-

bracht werden, wobei  $y < 1$ , also etwa  $y = \frac{a_1}{a_2}$  und  $a_1 < a_2$  ist.

Man hat also

$$n = \frac{1 + \frac{a_1}{a_2}}{1 - \frac{a_1}{a_2}} = \frac{a_2 + a_1}{a_2 - a_1},$$

woraus folgt:

$$y = \frac{a_1}{a_2} = \frac{n-1}{n+1}.$$

Demnach ist

$$70. \quad {}^e\!l n = 2 \left[ \frac{n-1}{n+1} + \frac{1}{3} \left( \frac{n-1}{n+1} \right)^3 + \frac{1}{5} \left( \frac{n-1}{n+1} \right)^5 + \dots \right].$$

Soll der gemeine Logarithmus von  $n$  berechnet werden, so benutzt man die Formel (Th. I, Anm. zu 67)

$$\frac{{}^c\!l y}{{}^c\!l x} = {}^x\!l y; \quad \text{oder:} \quad {}^{10}\!l n = \frac{{}^e\!l n}{{}^e\!l 10}.$$

Hierdurch ist der gemeine Logarithmus auf den natürlichen zurückgeführt.



Sollen die natürlichen Logarithmen der ganzen Zahlen berechnet werden, so braucht man Formel 70 nur auf solche Zahlen  $n$  anzuwenden, die durch keine andere Zahl theilbar sind (Primzahlen). Denn ist  $n = pq$ , so ist  $l n = l p + l q$ , also am Einfachsten aus den schon bekannten Logarithmen von  $p$  und  $q$  zu finden. Die Rechnungen werden aber noch wesentlich abgekürzt durch weitere Formeln, die hier noch abgeleitet werden sollen. Es ist

$$l(p + q) = l \left[ p \left( 1 + \frac{q}{p} \right) \right] = l p + l \left( 1 + \frac{q}{p} \right).$$

Ferner, wenn man in 70  $n = 1 + \frac{q}{p}$  setzt, woraus  $\frac{n-1}{n+1} =$

$\frac{q}{2p+q}$  folgt:

$${}^e l \left( 1 + \frac{q}{p} \right) = 2 \left[ \frac{q}{2p+q} + \frac{1}{3} \left( \frac{q}{2p+q} \right)^3 + \frac{1}{5} \left( \frac{q}{2p+q} \right)^5 + \dots \right].$$

Demnach ist

$${}^e l(p + q) = {}^e l p + 2 \left[ \frac{q}{2p+q} + \frac{1}{3} \left( \frac{q}{2p+q} \right)^3 + \frac{1}{5} \left( \frac{q}{2p+q} \right)^5 + \dots \right]. \quad 71.$$

Anm. Anleitung zur Berechnung einiger Logarithmen. —

${}^e l 2$ . Man setze in 71  $p = q = 1$ , so ist  ${}^e l 2 = {}^e l 1 + 2 \left[ \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \left( \frac{1}{3} \right)^3 + \frac{1}{5} \left( \frac{1}{3} \right)^5 + \dots \right]$ . Nun ist  ${}^e l 1 = 0$  (Th. I, 81). Aus  $\frac{1}{3} = 0,333\dots$  erhält man  $\left( \frac{1}{3} \right)^3, \left( \frac{1}{3} \right)^5$  durch wiederholte Division mit 9. Setzt man auf diese

Weise die Berechnung der Reihe bis incl.  $\left( \frac{1}{3} \right)^{11}$  fort, wobei  $\frac{1}{3}$  auf 7 Decimalstellen berechnet ist, so erhält man  ${}^e l 2 = 0,6931470$ . —  ${}^e l 10 = {}^e l(2^3 + 2)$ .

Man setze in 71  $p = 2^3, q = 2$ , so ist  ${}^e l 10 = 3 {}^e l 2 + 2 \left[ \frac{1}{q} + \frac{1}{3} \left( \frac{1}{q} \right)^3 + \frac{1}{5} \left( \frac{1}{q} \right)^5 + \dots \right] = 2,3025850$ . Die Zahl  $\frac{1}{e l 10}$  heisst der Modul des ge-

meinen Logarithmensystems. Sie dient, wie schon oben bemerkt, dazu, den gemeinen Logarithmus einer Zahl aus dem natürlichen zu finden. —  ${}^e l 5 = {}^e l \frac{10}{2} = {}^e l 10 - {}^e l 2$ .

Weiter hat man

$$p = \sqrt{p^2 - 1 + 1}; \quad l p = \frac{1}{2} l [(p^2 - 1) + 1],$$



oder nach 71, wenn man dort  $p^2 - 1$  für  $p$ , und 1 für  $q$  setzt, wodurch  $\frac{q}{2p+q}$  in  $\frac{1}{2p^2-1}$  übergeht:

$${}^e l_p = \frac{1}{2} {}^e l_{(p^2-1)} + \left[ \frac{1}{2p^2-1} + \frac{1}{3} \left( \frac{1}{2p^2-1} \right)^3 + \frac{1}{5} \left( \frac{1}{2p^2-1} \right)^5 + \dots \right],$$

oder endlich, wenn man  $p^2 - 1$  durch  $(p+1)(p-1)$  ersetzt:

$$72. \quad {}^e l_p = \frac{{}^e l_{(p+1)} + {}^e l_{(p-1)}}{2} + \left[ \frac{1}{2p^2-1} + \frac{1}{3} \left( \frac{1}{2p^2-1} \right)^3 + \frac{1}{5} \left( \frac{1}{2p^2-1} \right)^5 + \dots \right].$$

Ist nun  $p$  eine Primzahl, so sind  $p+1$  und  $p-1$  gerade Zahlen; also können ihre Logarithmen durch denjenigen von 2 und durch die Logarithmen zweier Zahlen ausgedrückt werden, die kleiner sind als  $p$ .

Anm. Von den beiden in 70 und 72 enthaltenen Reihen ist die letztere diejenige, welche bei weitem rascher convergirt, die also, schon nach wenig Gliedern abgebrochen, ein Resultat von grosser Genauigkeit giebt.

Ist  $p$  eine Primzahl von der Beschaffenheit, dass  $p^2 + 1$  sich in Factoren zerlegen lässt, deren Logarithmen man bereits kennt, so kann man eine noch stärker convergirende Reihe anwenden. Es ist

$$p = \sqrt[4]{p^4 - 1 + 1}; \quad l_p = \frac{1}{4} l[(p^4 - 1) + 1],$$

oder nach 71, wenn man dort  $p^4 - 1$  für  $p$ , und 1 für  $q$  setzt, wodurch  $\frac{q}{2p+q}$  in  $\frac{1}{2p^4-1}$  übergeht:

$${}^e l_p = \frac{1}{4} {}^e l_{(p^4-1)} + \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{2p^4-1} + \frac{1}{3} \left( \frac{1}{2p^4-1} \right)^3 + \frac{1}{5} \left( \frac{1}{2p^4-1} \right)^5 + \dots \right],$$

oder endlich, wenn man  $p^4 - 1$  durch  $(p^2 + 1)(p + 1)(p - 1)$  ersetzt:

$$73. \quad {}^e l_p = \frac{{}^e l_{(p^2+1)} + {}^e l_{(p+1)} + {}^e l_{(p-1)}}{4} + \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{2p^4-1} + \frac{1}{3} \left( \frac{1}{2p^4-1} \right)^3 + \frac{1}{5} \left( \frac{1}{2p^4-1} \right)^5 + \dots \right].$$

Anm. — Anleitung zur Berechnung weiterer Logarithmen. —

${}^e l_3$ . Da  $l(3^2 + 1) = l_{10}$  schon bekannt ist, so hat man nach 73  ${}^e l_3 = \frac{1}{4} [{}^e l_{10} + 3 {}^e l_2] + \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{161} + \frac{1}{3} \left( \frac{1}{161} \right)^3 + \dots \right]$ . Schon die beiden ersten Glieder der Reihe liefern den Logarithmus auf 8 Stellen genau, nämlich  ${}^e l_3 = 0,47712125$ . —  ${}^e l_7$ . Da  $7^2 + 1 = 5 \cdot 10$ , so wendet man wieder 73



an Für alle grösseren Primzahlen braucht man in den in 72 und 73 enthaltenen Reihen nur noch das erste Glied zu berechnen, um den Logarithmus bis auf 8 (bei 11 bis auf 7) und mehr Decimalstellen genau zu erhalten.

44. *Berechnung von  $\pi$ .* — Aus der Formel 16,  $\operatorname{tg} \frac{\pi}{4} = 1$ , folgt  $\operatorname{arctg} 1 = \frac{\pi}{4}$ . Setzt man nun in 65  $x = 1$ , so folgt mit Rücksicht auf die eben gefundene Formel:

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots \quad 74.$$

Anm. Zur wirklichen Berechnung von  $\pi$  eignet sich diese Reihe ihrer schwachen Convergenz wegen nicht. Im Folgenden wird eine Methode zur Herstellung convergenterer Reihen entwickelt.

Setzt man in der Formel 37

$$\operatorname{tg}(\alpha - \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta}{1 + \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta}$$

der Reihe nach

$$\operatorname{tg} \alpha = a_0, \quad a_1, \quad a_2, \quad \dots \quad \operatorname{tg} \beta = a,$$

und

$$\operatorname{tg}(\alpha - \beta) = a_1, \quad a_2, \quad a_3, \quad \dots,$$

so erhält man für die vier ersten Werthe:

$$(1) \quad \left\{ \begin{array}{l} a_1 = \frac{a_0 - a}{1 + a_0 a}; \quad \operatorname{arctg} a_0 - \operatorname{arctg} a = \operatorname{arctg} a_1; \\ a_2 = \frac{a_1 - a}{1 + a_1 a}; \quad \operatorname{arctg} a_1 - \operatorname{arctg} a = \operatorname{arctg} a_2; \\ a_3 = \frac{a_2 - a}{1 + a_2 a}; \quad \operatorname{arctg} a_2 - \operatorname{arctg} a = \operatorname{arctg} a_3; \\ a_4 = \frac{a_3 - a}{1 + a_3 a}; \quad \operatorname{arctg} a_3 - \operatorname{arctg} a = \operatorname{arctg} a_4. \end{array} \right.$$

Durch Addition der rechts stehenden Formeln erhält man

$$(2) \quad \operatorname{arctg} a_0 - 4 \operatorname{arctg} a = \operatorname{arctg} a_4.$$

Setzt man in dieser Formel  $a_0 = 1$ ,  $a = \frac{1}{5}$ , so erhält man

aus (1)  $a_1 = \frac{2}{3}$ ,  $a_2 = \frac{7}{17}$ ,  $a_3 = \frac{9}{46}$ ,  $a_4 = -\frac{1}{239}$ . Also:

$$(3) \quad \operatorname{arctg} 1 - 4 \operatorname{arctg} \frac{1}{5} = -\operatorname{arctg} \frac{1}{239}.*)$$

\*) Denn ist  $\operatorname{tg} x = u$ , so ist  $\operatorname{tg}(-x) = -u$ ; also  $\operatorname{arctg} u = x$ ;  $\operatorname{arctg}(-u) = -x = -\operatorname{arctg} u$ .



Setzt man ferner in der ersten der Formeln (1)  $a_0 = \frac{1}{5}$ ,

$a = \frac{1}{10}$ , so ist  $a_1 = \frac{5}{51}$ ; also

$$(4) \quad \operatorname{arctg} \frac{1}{5} - \operatorname{arctg} \frac{1}{10} = \operatorname{arctg} \frac{5}{51}.$$

Setzt man endlich in der ersten der Formeln (1)  $a_0 = \frac{5}{51}$ ,

$a = \frac{1}{10}$ , so ist  $a_1 = -\frac{1}{515}$ ; also

$$(5) \quad \operatorname{arctg} \frac{5}{51} - \operatorname{arctg} \frac{1}{10} = -\operatorname{arctg} \frac{1}{515}.$$

Addirt man dann die Formeln (3), (4), (5), nachdem man (4) und (5) mit 4 multiplicirt hat, und setzt für  $\operatorname{arctg} 1$  seinen Werth  $\frac{\pi}{4}$ , so erhält man zur Berechnung von  $\pi$  die überaus rasch convergirende Formel

$$75. \quad \frac{\pi}{4} = 8 \cdot \operatorname{arctg} \frac{1}{10} - 4 \cdot \operatorname{arctg} \frac{1}{515} - \operatorname{arctg} \frac{1}{239}.$$

Anm. Nimmt man in der Entwicklung von  $\operatorname{arctg} \frac{1}{10}$  die ersten drei Glieder, und in der von  $\operatorname{arctg} \frac{1}{515}$  und  $\operatorname{arctg} \frac{1}{239}$  jedesmal nur das erste Glied, so erhält man  $\pi$  bereits auf 6 Decimalstellen genau. — Gegenwärtig ist  $\pi$  bis auf 707 Decimalstellen berechnet (W. Shanks in den Proceedings of the London Mathematical Society. XXI, 315 und XXII, 45).

---



# Angewandte Trigonometrie.

## A. Die Berechnung der Dreiecke.

(Trigonometrie im engeren Sinne.)

### I. Das rechtwinklige Dreieck.

**45.** Das rechtwinklige Dreieck ist durch zwei seiner Stücke (Seiten und Winkel), unter denen eine Seite sein muss, vollkommen bestimmt. Da ferner durch einen spitzen Winkel des Dreiecks der andere bestimmt ist, so braucht man, wenn zwei Stücke des Dreiecks gegeben sind, nur noch zwei Stücke zu suchen. Hierzu reichen die Formeln aus:

$$(1) \cos \alpha = \frac{b}{c}; \quad (2) a^2 + b^2 = c^2.$$

Im Ganzen kann man folgende vier Aufgaben stellen:

|          | 1.           | 2.           | 3.           | 4.           |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Gegeben: | $a, c.$      | $a, b.$      | $b, \alpha.$ | $c, \alpha.$ |
| Gesucht: | $b, \alpha.$ | $c, \alpha.$ | $c, a.$      | $b, a.$      |
| Formel:  | (2), (1).    | (2), (1).    | (1), (2).    | (1), (2).    |

$$\text{Lösung: } \begin{cases} b = \sqrt{c^2 - a^2}. & c = \sqrt{a^2 + b^2}. & c = \frac{b}{\cos \alpha}. & b = c \cdot \cos \alpha. \\ \cos \alpha = \frac{b}{c}. & \cos \alpha = \frac{b}{c}. & a = \sqrt{c^2 - b^2}. & a = \sqrt{c^2 - b^2}. \end{cases} \quad 76.$$

Zu den gesuchten Stücken kann auch die Fläche des Dreiecks gehören. Dieselbe wird gefunden durch die Formel (s. Th. II, 354)

$$(3) f^2 = \frac{ab}{2}.$$

Anm. Zur Lösung dieser vier Aufgaben mit Zahlenbeispielen kann die in Nr. 11 (S. 9) stehende Cosinustafel, zur Bildung solcher Zahlenbeispiele die im Anhang stehende Tafel der rationalen rechtwinkligen Dreiecke benutzt werden. — Auf das rechtwinklige Dreieck lässt sich das gleichschenklige zurückführen durch Construction der zur Basis gehörigen Höhe.



## II. Das schiefwinklige Dreieck.

**46. Vorbemerkung.** — Das schiefwinklige Dreieck ist durch drei seiner Stücke (Seiten und Winkel) (unter denen sich eine Seite befinden muss) vollständig bestimmt (Th. II, 88). Die Berechnung der übrigen drei Stücke wird dadurch ermöglicht, dass man das gegebene Dreieck durch rechtwinklige Dreiecke ersetzt. Dies geschieht am einfachsten durch Fällen einer Höhe. Indess sind die hierdurch gewonnenen Formeln nicht einfach genug, zum Theil auch wegen der darin enthaltenen Summen und Differenzen zur logarithmischen Berechnung nicht geeignet. Dieselben werden daher in einer zweiten Methode durch andere, für die Berechnung mehr geeignete, ersetzt werden. — Entsprechend der vierfachen Bestimmung eines Dreiecks durch drei seiner Stücke können die vier Hauptaufgaben aufgestellt werden: das Dreieck zu berechnen aus


- 1)  $a\beta\gamma(\alpha)$ ; 2)  $ab\alpha$ ; 3)  $ab\gamma$ ; 4)  $abc$ .

### 1. Erste Methode.

#### a. Geometrisches Verfahren.

**47. Der Sinussatz.** — Fällt man im Dreieck  $\overline{ABC}$  (Fig. 9) die Höhe  $\overline{AA_1}$  auf  $BC$ , so entstehen die beiden rechtwinkligen Dreiecke  $\overline{AA_1B}$  und  $\overline{AA_1C}$ . Darin ist

Fig. 9.



$$\sin \beta = \frac{h_1}{c}; \quad \sin \gamma = \frac{h_1}{b}.$$

Indem man die erste dieser Formeln durch die zweite dividirt, folgt:

$$(1) \quad \frac{\sin \beta}{\sin \gamma} = \frac{b}{c}.$$

Durch Fällen der Höhe  $\overline{BB_1}$  würde man ebenso erhalten:

$$(2) \quad \frac{\sin \gamma}{\sin \alpha} = \frac{c}{a}.$$

Und durch Multiplication von (1) und (2) folgt:

$$(3) \quad \frac{\sin \beta}{\sin \alpha} = \frac{b}{a}.$$

Diese drei Formeln enthalten zusammen den Satz (Sinussatz):

77. Die Seiten eines Dreiecks verhalten sich wie die Sinus ihrer Gegenwinkel.



Anm. Ist einer der an  $a$  liegenden Winkel, z. B.  $\gamma > R$ , so enthält das Dreieck  $\overline{AA_1C}$  nicht  $\gamma$ , sondern den Winkel  $(2R - \gamma)$ . Da aber (nach 29)  $\sin(2R - \gamma) = \sin \gamma$  ist, so bleibt der Satz auch für das stumpfwinklige Dreieck in Geltung. — Aus dem Sinussatz folgen die Sätze Th. II, 98, 107, 253.

*Anwendung des Sinussatzes.* — Da durch drei gegebene Stücke in einer Formel des Sinussatzes das vierte bestimmt ist, so können mittelst desselben die Aufgaben 1)  $a\beta\gamma(\alpha)$  und 2)  $ab\alpha$  gelöst werden. Es folgt nämlich aus (3) und (2)

$$1) \quad b = \frac{a \cdot \sin \beta}{\sin \alpha}; \quad c = \frac{a \cdot \sin \gamma}{\sin \alpha}.$$

$$2) \quad \sin \beta = \frac{b \cdot \sin \alpha}{a}; \quad [\gamma = 2R - (\alpha + \beta)]; \quad c = \frac{a \cdot \sin \gamma}{\sin \alpha},$$

wodurch in beiden Fällen alle unbekannten Stücke des Dreiecks bestimmt sind.

Anm. Ist im zweiten Falle  $a > b$ , so ist auch  $\alpha > \beta$ ; mithin kann  $\beta$  kein stumpfer Winkel sein. Von den beiden Supplementwinkeln, deren gemeinsamer Sinus (nach 29) die Zahl  $\frac{b \cdot \sin \alpha}{a}$  ist, kann also nur der spitze gleich  $\beta$  gesetzt werden. — Ist dagegen  $a < b$ , so ist auch  $\alpha < \beta$ , und es kann von den beiden Supplementwinkeln, deren gemeinsamer Sinus  $\frac{b \cdot \sin \alpha}{a}$  ist, nicht nur der spitze, sondern auch der stumpfe gleich  $\beta$  gesetzt werden. Die Aufgabe giebt also für  $\beta, \gamma, c$  je zwei verschiedene Werthe (Vgl. Th. II, 92 und 104 nebst den diese Sätze einleitenden Bemerkungen.)

**48. Der Cosinussatz.** — In Fig. 9 ist (nach Th. II, 364)

$$c^2 = a^2 + b^2 \mp 2a \cdot A_1C,$$

oder, wenn man  $A_1C$  durch seinen Werth  $\pm b \cdot \cos \gamma$  ersetzt (wobei die oberen oder unteren Vorzeichen gelten, je nachdem der Winkel  $\gamma$  spitz oder stumpf ist):

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos \gamma.$$

Zwei weitere Formeln von gleicher Gestalt erhält man hieraus durch Vertauschung der Buchstaben. Alle zusammen enthalten den Satz (Cosinussatz):

Das Quadrat einer Dreieckseite ist gleich der 78. Summe der Quadrate der anderen Seiten, vermindert um das doppelte Product aus diesen Seiten und dem Cosinus des von ihnen eingeschlossenen Winkels.

Anm. Man untersuche die Formel des Cosinussatzes für die Fälle  $\gamma = 0, R, 2R$ .

*Anwendung des Cosinussatzes.* — Da durch drei gegebene Stücke in einer Formel des Cosinussatzes das vierte bestimmt



ist, so können mittelst desselben die Aufgaben 3)  $aby$  und 4)  $abc$  gelöst werden. Es folgt nämlich aus der obigen Formel:

$$3) \quad c = \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos \gamma}; \quad \sin \beta = \frac{b \sin \gamma}{c}; \quad [\alpha = 2R - (\beta + \gamma)].$$

$$4) \quad \cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}; \quad \sin \beta = \frac{b \sin \gamma}{c}; \quad [\alpha = 2R - (\beta + \gamma)],$$

wodurch in beiden Fällen alle unbekannten Stücke des Dreiecks bestimmt sind.

Anm. In beiden Fällen ist die Aufgabe, nachdem das erste Stück ( $c$  oder  $\gamma$ ) bestimmt ist, auf die Aufgabe 2)  $bcy$  zurückgeführt. Diesmal aber kann die Bestimmung von  $\beta$  aus seinem Sinus keine Zweideutigkeit veranlassen, weil auch  $a$  bereits einen bestimmten Werth hat, und die Winkel des Dreiecks durch seine 3 Seiten eindeutig bestimmt sind. Ob also  $\beta$  stumpf oder spitz ist, wird stets ersichtlich sein aus der Bedingung, dass  $\beta \gtrless \gamma$  ist, je nachdem  $b \gtrless c$ .

#### b. Algebraisches Verfahren.

49. In Fig. 9 ist  $BA_1 = c \cdot \cos \beta$ ;  $CA_1 = b \cdot \cos \gamma$ . Durch Addition dieser Formeln erhält man

$$(1) \quad c \cdot \cos \beta + b \cdot \cos \gamma = a,$$

und hieraus durch Vertauschung der Buchstaben

$$(2) \quad a \cdot \cos \gamma + c \cdot \cos \alpha = b,$$

$$(3) \quad b \cdot \cos \alpha + a \cdot \cos \beta = c.$$

Von den in diesen drei Gleichungen enthaltenen 6 Grössen  $a$ ,  $b$ ,  $c$ ,  $\cos \alpha$ ,  $\cos \beta$ ,  $\cos \gamma$  kann man je drei als bekannt, die übrigen drei als unbekannt betrachten, und durch Auflösung der Gleichungen nach diesen Unbekannten alle Formeln ableiten, welche zur Berechnung des Dreiecks aus drei gegebenen Stücken dienen können, insbesondere die Formeln des Sinus- und Cosinussatzes.

Setzt man zur Abkürzung

$$\cos \alpha = x, \quad \cos \beta = y, \quad \cos \gamma = z,$$

so lauten die Formeln (1) — (3):

$$(1) \quad cy + bz = a; \quad (2) \quad az + cx = b; \quad (3) \quad bx + ay = c.$$

Um den Sinussatz zu finden, eliminirt man erstens  $x$  zwischen (2) und (3), und erhält (nach der Additionsmethode):

$$(4) \quad a(bz - cy) = b^2 - c^2;$$

zweitens durch Elimination von  $a$  zwischen (1) und (4):

$$(5) \quad b^2 z^2 - c^2 y^2 = b^2 - c^2,$$

oder:

$$b^2(1 - z^2) = c^2(1 - y^2),$$



oder, da  $1 - y^2 = 1 - \cos^2 \beta = \sin^2 \beta$ ,  $1 - z^2 = 1 - \cos^2 \gamma = \sin^2 \gamma$  ist:

$$b^2 \sin^2 \gamma = c^2 \sin^2 \beta; \quad b \sin \gamma = c \sin \beta; \quad \frac{b}{c} = \frac{\sin \beta}{\sin \gamma},$$

wodurch eine Formel des Sinussatzes hergestellt ist.

Anm. Um die beiden andern Formeln des Sinussatzes auf demselben Wege zu finden, müsste man zwischen den Gleichungen (1) bis (3)  $y$  und  $b$ , bzw.  $z$  und  $c$  eliminiren. Da jedoch das System der drei Gleichungen (1)—(3) durch Buchstabenvertauschung sich nicht ändert, so sieht man sogleich, dass diese Vertauschung auch auf die Lösung  $\frac{b}{c} = \frac{\sin \beta}{\sin \gamma}$  anwendbar ist, woraus dann die beiden andern Formeln des Sinussatzes sich ergeben.

Um den Cosinussatz zu finden, hat man zwischen den Gleichungen (1) bis (3)  $x$  und  $y$ , oder kürzer zwischen (1) und (4)  $y$  zu eliminiren. Das letztere Verfahren giebt (nach der Additionsmethode)

$$2abz = b^2 - c^2 + a^2,$$

oder, wenn man für  $z$  wieder  $\cos \gamma$  setzt:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma,$$

wodurch eine Formel des Cosinussatzes hergestellt ist.

Anm. Hinsichtlich der anderen beiden Formeln des Cosinussatzes vgl. die vorige Anm. — Aus den Formeln (1) bis (3) lassen sich durch andere Arten der Elimination noch weitere Formeln für die Berechnung einzelner Stücke des Dreiecks ableiten; dieselben werden jedoch ihrer geringeren Wichtigkeit wegen hier übergangen.


## 2. Zweite Methode.

### a. Der Satz vom umbeschriebenen Kreise.

50. *Vorbemerkung.* — Eine andere Methode, ein gegebenes schiefwinkliges Dreieck durch ein rechtwinkliges zu ersetzen, besteht darin, dass man durch den einen Endpunkt ( $B$ ) einer Seite ( $a$ ) den Durchmesser des Umkreises zieht (Fig. 10) und dessen Endpunkt ( $A_1$ ) mit dem anderen Endpunkte ( $C$ ) der ersten Seite verbindet. Dann ist in dem Hilfsdreieck  $\overline{A_1BC}$  der Winkel bei  $C$  ein Rechter (Th. II, 165), und der Winkel bei  $A_1$  gleich  $\alpha$  (Th. II, 166).

Anm. Ist  $\alpha$  ein stumpfer Winkel ( $BA_2C$ ), so ist  $BA_1C = 2R - \alpha$  (Th. II, 178). Da aber  $\sin(2R - \alpha) = \sin \alpha$  (29), so bleibt die Bedeutung des Hilfsdreiecks unverändert.

Fig. 10.





Aus der Betrachtung des Dreiecks  $\overline{A_1BC}$  ergibt sich nun die Formel

$$1a) \sin \alpha = \frac{a}{2r};$$

und hieraus durch Vertauschung der Buchstaben:

$$1b) \sin \beta = \frac{b}{2r}; \quad 1c) \sin \gamma = \frac{c}{2r}.$$

Diese drei Formeln enthalten zusammen den Satz:

79. Der Sinus eines Winkels im Dreieck ist gleich dem Quotienten aus der gegenüberliegenden Seite und dem Durchmesser des Umkreises.

Anm. Die Formeln 1) zeigen (was übrigens schon aus Th. II, 167 hervorgeht), dass jedes von den drei Stücken eines Dreiecks:  $a, \alpha, r$  durch die beiden anderen bestimmt ist.

Aus den Formeln 1) folgt weiter:

$$2a) a = 2r \cdot \sin \alpha; \quad 2b) b = 2r \cdot \sin \beta; \quad 2c) c = 2r \cdot \sin \gamma.$$

$$3) 2r = \frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}.$$

Anm. Wie lauten diese Formeln in Worten? — Durch Elimination von  $2r$  zwischen den Formeln 3) erhält man wieder die Formeln des Sinussatzes. Worin besteht der Vorzug der Formeln 1), 2), 3) vor denen des Sinussatzes?

**51. Anwendung des Satzes vom umbeschriebenen Kreise.** — Derselbe dient ebenso wie der Sinussatz zur Lösung der Aufgaben  $a\beta\gamma(\alpha)$  und  $ab\alpha$ .

Aufgabe 1. — Ein Dreieck zu berechnen aus einer Seite und zwei Winkeln.  $(a\beta\gamma)^*)$

$$\text{Lösung: } 1) \alpha = 2R - (\beta + \gamma); \quad 2) 2r = \frac{a}{\sin \alpha};$$

$$3) b = 2r \cdot \sin \beta; \quad 4) c = 2r \cdot \sin \gamma.$$

Aufgabe 2. — Ein Dreieck zu berechnen aus zwei Seiten und einem nicht eingeschlossenen Winkel.  $(ab\alpha)$

$$\text{Lösung: } 1) 2r = \frac{a}{\sin \alpha}; \quad 2) \sin \beta = \frac{b}{2r};$$

$$3) \gamma = 2R - (\alpha + \beta); \quad 4) c = 2r \cdot \sin \gamma.$$

Anm. Hinsichtlich der beiden Fälle  $a > b$  und  $a < b$  s. die Anm. am Schluss von Nr. 47.


\*) Beispiele zu dieser und den folgenden Aufgaben s. am Schluss des Buches in der „Uebersicht der Formeln und Regeln“.



## b. Der Tangentialsatz.

52. *Vorbemerkung.* — Eine dritte Methode, ein gegebenes schiefwinkliges Dreieck durch rechtwinklige zu ersetzen, besteht darin, dass man erstens aus einer Ecke ( $C$ ) mit der Seite  $b$  einen Kreis beschreibt, welcher die Seite  $a$  in  $D_1$  und ihre Verlängerung in  $D$  schneidet, sodass (Fig. 11)

Fig. 11.



1)  $BD = a + b$ ,  $BD_1 = a - b$   
 ist. Verbindet man dann  $D$  und  $D_1$  mit  $A$ , so ist Dreieck  $\overline{DAD_1}$  bei  $A$  rechtwinklig (Th. II, 165),  
 Winkel  $D_1DA = \frac{\gamma}{2}$  (Th. II, 101),

Winkel  $DD_1A = R - \frac{\gamma}{2} = \frac{\alpha + \beta}{2}$   
 $= \sigma$  (45). Und

$$2) \quad \operatorname{tg} \sigma = \frac{AD}{AD_1}.$$

Errichtet man zweitens  $D_1A_1 \perp D_1A$ , so ist Dreieck  $\overline{AD_1A_1}$  bei  $D_1$  rechtwinklig, und Winkel  $D_1AA_1 = \alpha - \sigma = \delta$  (45a).  
 Demnach

$$3) \quad \operatorname{tg} \delta = \frac{A_1D_1}{AD_1}.$$

Dividirt man nun 2) durch 3), so folgt:

$$4) \quad \frac{\operatorname{tg} \sigma}{\operatorname{tg} \delta} = \frac{AD}{A_1D_1}.$$

Nun ist aber  $AD \parallel A_1D_1$  (Th. II, 72), folglich Dreieck  $\overline{BA_1D_1} \sim \overline{BAD}$  (Th. II, 239), und folglich

$$5) \quad \frac{AD}{A_1D_1} = \frac{BD}{BD_1} = \frac{a+b}{a-b} \text{ [nach 1)].}$$

Durch Vergleichung von 4) und 5) folgt endlich:

$$6) \quad \frac{\operatorname{tg} \sigma}{\operatorname{tg} \delta} = \frac{a+b}{a-b}.$$

Zwei weitere Formeln von gleicher Gestalt erhält man durch Vertauschung zwischen den Buchstaben  $\alpha\beta\gamma$  und  $abc$ . Alle zusammen enthalten den Satz (Tangentialsatz):

Die Tangens der halben Summe zweier Winkel 80. im Dreieck verhält sich zur Tangens ihrer halben Differenz, wie die Summe ihrer Gegenseiten zur Differenz derselben.



**53. Ableitung des Tangentialsatzes aus dem Sinussatze.** — Aus der Formel des Sinussatzes

$$\frac{a}{b} = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$$

folgt (nach Th. I, 105):

$$\frac{a+b}{a-b} = \frac{\sin \alpha + \sin \beta}{\sin \alpha - \sin \beta},$$

oder (nach 46)

$$\frac{a+b}{a-b} = \frac{2 \cdot \sin \sigma \cdot \cos \delta}{2 \cdot \cos \sigma \cdot \sin \delta},$$

oder (nach 26)

$$\frac{a+b}{a-b} = \frac{\operatorname{tg} \sigma}{\operatorname{tg} \delta}.$$

**54. Anwendung des Tangentialsatzes.** — Derselbe dient ebenso wie der Cosinussatz zur Lösung der Aufgabe *aby*.

Aufgabe 3. — Ein Dreieck zu berechnen aus zwei Seiten und dem eingeschlossenen Winkel. (*aby*)


Lösung: 1)  $\sigma = R - \frac{\gamma}{2}$ ; 2)  $\operatorname{tg} \delta = \frac{(a-b) \operatorname{tg} \sigma}{a+b}$ ; 3)  $\begin{cases} \alpha = \sigma + \delta \\ \beta = \sigma - \delta \end{cases}$

$$4) 2r = \frac{a}{\sin \alpha}; \quad 5) c = 2r \cdot \sin \gamma.$$

#### c. Der Satz vom einbeschriebenen Kreise.

**55. Vorbemerkung.** — Eine vierte Methode, ein gegebenes schiefwinkliges Dreieck durch rechtwinklige zu ersetzen, besteht darin,

Fig. 12.



steht darin, dass man die Mittelpunkte der Berührungskreise mit den Ecken des Dreiecks und den zugehörigen Berührungspunkten auf den Seiten verbindet (wie es Fig. 12 für den aus *O* beschriebenen Inkreis



und den aus  $O_1$  beschriebenen Ankreis zeigt). Dann ist in dem Hilfsdreiecke  $OAC_0$  der Winkel  $OAC_0 = \frac{\alpha}{2}$  (Th. II, 196), und die Seite  $AC_0 = p_1 = \frac{b+c-a}{2}$  [Th. II, Nr. 99, Formeln 6)].

Aus der Betrachtung des Dreiecks  $\overline{OAC_0}$  ergibt sich nun die Formel:

$$1a) \quad \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{\varrho}{p_1},$$

und hieraus durch Vertauschung der Buchstaben:

$$1b) \quad \operatorname{tg} \frac{\beta}{2} = \frac{\varrho}{p_2}; \quad 1c) \quad \operatorname{tg} \frac{\gamma}{2} = \frac{\varrho}{p_3}.$$

Diese drei Formeln enthalten zusammen den Satz:

Die Tangens eines halben Winkels im Dreieck 81. ist gleich dem Quotienten aus dem Radius des Inkreises und der um die halbe Gegenseite verminderten halben Summe der einschliessenden Seiten.

**56. Bestimmung von  $\varrho$  durch die Seiten des Dreiecks.** — Um mittelst der in 81 enthaltenen Formeln die Winkel eines Dreiecks aus seinen Seiten berechnen zu können, ist es noch nöthig, die in jenen Formeln enthaltene Grösse  $\varrho$  durch die Seiten auszudrücken.

Nun ist erstens im Dreieck  $\overline{O_1AC_1}$  die Seite  $AC_1 = c + p_3$  (Th. II, 205)  $= p_1 + p_2 + p_3$  [Th. II, Nr. 99, Formeln 1)]  $= p$  [dasselbst Formel 3)]. Mithin ergibt sich aus der Betrachtung dieses Dreiecks:

$$2) \quad \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{\varrho_1}{p}.$$

Zweitens ist im Dreieck  $\overline{O_1BA_1}$  die Seite  $BA_1 = p_3$  (Th. II, 204), und der Winkel  $O_1BA_1 = R - \frac{\beta}{2}$  (Th. II, 196, Anm. z. 122).

Mithin ergibt sich aus der Betrachtung dieses Dreiecks:

$$3) \quad \cot \left( R - \frac{\beta}{2} \right) = \operatorname{tg} \frac{\beta}{2} = \frac{p_3}{\varrho_1}.$$

Durch Multiplication der Formeln 2) und 3) erhält man

$$\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} \cdot \operatorname{tg} \frac{\beta}{2} = \frac{p_3}{p},$$



und, wenn man  $\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}$  und  $\operatorname{tg} \frac{\beta}{2}$  durch ihre aus 1) folgenden Werthe ersetzt:

$$\frac{q^2}{p_1 p_2} = \frac{p_3}{p},$$

82. oder:

$$q = \sqrt{\frac{p_1 p_2 p_3}{p}}.$$

57. *Ableitung des Satzes vom einbeschriebenen Kreise aus dem Cosinussatze.* — Aus der Formel des Cosinussatzes

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \alpha$$

folgt

$$\cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}.$$

Addirt man diese Formel zu  $1 = 1$ , so folgt:

$$\begin{aligned} 1 + \cos \alpha &= \frac{b^2 + c^2 + 2bc - a^2}{2bc} = \frac{(b+c)^2 - a^2}{2bc} = \frac{(b+c+a)(b+c-a)}{2bc} \\ &= \frac{2p \cdot 2p_1}{2bc} = \frac{2pp_1}{bc}; \end{aligned}$$

$$\frac{1 + \cos \alpha}{2} = \frac{pp_1}{bc}; \quad \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}} = \sqrt{\frac{pp_1}{bc}},$$

oder nach (42)

$$83. \quad \cos \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{pp_1}{bc}}; \quad \cos \frac{\beta}{2} = \sqrt{\frac{pp_2}{ca}}; \quad \cos \frac{\gamma}{2} = \sqrt{\frac{pp_3}{ab}}.$$

Subtrahirt man  $1 = 1$  von der Formel für  $\cos \alpha$ , so folgt:

$$\cos \alpha - 1 = \frac{b^2 + c^2 - 2bc - a^2}{2bc} = \frac{(b-c)^2 - a^2}{2bc},$$

oder, wenn man auf beiden Seiten mit  $(-1)$  multiplicirt:

$$\begin{aligned} 1 - \cos \alpha &= \frac{a^2 - (b-c)^2}{2bc} = \frac{(a+b-c)(a-b+c)}{2bc} \\ &= \frac{2p_3 \cdot 2p_2}{2bc} = \frac{2p_2 p_3}{bc}; \end{aligned}$$

$$\frac{1 - \cos \alpha}{2} = \frac{p_2 p_3}{bc}; \quad \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}} = \sqrt{\frac{p_2 p_3}{bc}},$$

oder (nach 43)

$$84. \quad \sin \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{p_2 p_3}{bc}}; \quad \sin \frac{\beta}{2} = \sqrt{\frac{p_3 p_1}{ca}}; \quad \sin \frac{\gamma}{2} = \sqrt{\frac{p_1 p_2}{ab}}.$$

Anm. Wodurch unterscheiden sich die Formeln 83 und 84, und wie sind dieselben zu merken?



Dividirt man die ersten der Formeln 83 und 84 durch einander, so folgt:

$$\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{p_2 p_3}{p p_1}} = \sqrt{\frac{p_1 p_2 p_3}{p p_1^2}} = \frac{1}{p_1} \sqrt{\frac{p_1 p_2 p_3}{p}},$$

oder, wenn man die Wurzelgrösse zur Abkürzung gleich  $q$  setzt:

$$\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{q}{p_1}.$$

Anm. Man erkennt leicht, dass die Wurzelgrösse sich durch die Vertauschungen, welche  $\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}$  in  $\operatorname{tg} \frac{\beta}{2}$  und  $\operatorname{tg} \frac{\gamma}{2}$  überführen, nicht ändert. — Die geometrische Bedeutung von  $q$  geht wieder aus Fig. 12 hervor.

**58. Anwendung des Satzes vom einbeschriebenen Kreise.** — Derselbe dient ebenso wie der Cosinussatz zur Lösung der Aufgabe *abc*.

Aufgabe 4. — Ein Dreieck zu berechnen aus den drei Seiten. (*abc*)

Lösung: 1)  $p = \frac{a+b+c}{2}$ ;  $p_1 = p - a$ ;  $p_2 = p - b$ ;  $p_3 = p - c$

[Th. II, Nr. 99, Formeln 5)]; 2)  $q = \sqrt{\frac{p_1 p_2 p_3}{p}}$ ;

$$3) \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{q}{p_1}; \operatorname{tg} \frac{\beta}{2} = \frac{q}{p_2}; \operatorname{tg} \frac{\gamma}{2} = \frac{q}{p_3}.$$

**59. Formeln zur Berechnung der Fläche eines Dreiecks.** — Die Fläche eines Dreiecks kann entweder durch Seiten und Winkel allein, oder durch  $r$  und die Winkel, oder durch  $q$  und die Seiten ausgedrückt werden.

1) Wenn man in der Formel

$$f^2 = \frac{a h_1}{2} \quad (\text{Th. II, 354})$$

$h_1$  durch seinen Werth  $b \cdot \sin \gamma$  ersetzt (Fig. 9, S. 42), so folgt:

$$f^2 = \frac{ab \cdot \sin \gamma}{2}, \quad 85.$$

woraus zwei weitere Formeln durch Vertauschung sich ergeben. Alle drei zusammen enthalten den Satz:

Die Fläche eines Dreiecks ist gleich dem halben Product aus zwei Seiten und dem Sinus des von ihnen eingeschlossenen Winkels.

2) Wenn man in der Formel 85  $a$  und  $b$  durch ihre Werthe  $2r \cdot \sin \alpha$  und  $2r \cdot \sin \beta$  ersetzt [Nr. 50, Formeln 2)], so folgt:

$$f^2 = 2r^2 \sin \alpha \sin \beta \sin \gamma. \quad 86.$$



In Worten: Die Fläche eines Dreiecks ist gleich dem doppelten Product aus dem Quadrat des Radius des Umkreises, und den Sinus seiner drei Winkel.

3) Nach Th. II, 357 ist

$$87. \quad f^2 = p\varrho.$$

In Worten: Die Fläche eines Dreiecks ist gleich dem Product aus seinem halben Umfang und dem Radius des Inkreises.

Anm. Wenn man in 85  $\sin \gamma$  durch seinen Werth  $\frac{c}{2r}$  ersetzt [Nr. 50, Formeln 1)], so folgt:

$$88. \quad f^2 = \frac{abc}{4r}.$$

In Worten? — Wenn man in 87  $\varrho$  durch seinen aus 82 folgenden Werth ersetzt, so folgt

$$89. \quad f^2 = \sqrt{pp_1 p_2 p_3}.$$

Noch andere Formeln s. in der folgenden Nr. (Formeln 91.)

**60. Erweiterung. Der Satz vom anbeschriebenen Kreise.** — Aus der Betrachtung des Dreiecks  $\overline{O_1 A C_1}$  (Fig. 12) folgt [Nr. 56, Formel 2)]:

$$1a) \quad \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{\varrho_1}{p},$$

und hieraus durch Vertauschung der Buchstaben:

$$1b) \quad \operatorname{tg} \frac{\beta}{2} = \frac{\varrho_2}{p}; \quad 1c) \quad \operatorname{tg} \frac{\gamma}{2} = \frac{\varrho_3}{p}.$$

Diese drei Formeln enthalten zusammen den Satz:

90. Die Tangens eines halben Winkels im Dreieck ist gleich dem Quotienten aus dem Radius des der gegenüberliegenden Seite anbeschriebenen Kreises und dem halben Umfange des Dreiecks.

Setzt man die aus 81 und 90 folgenden Werthe für  $\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}$ ,  $\operatorname{tg} \frac{\beta}{2}$ ,  $\operatorname{tg} \frac{\gamma}{2}$  einander gleich, so folgt:

$$\frac{\varrho}{p_1} = \frac{\varrho_1}{p}; \quad \frac{\varrho}{p_2} = \frac{\varrho_2}{p}; \quad \frac{\varrho}{p_3} = \frac{\varrho_3}{p},$$

oder (mit Rücksicht auf 87)

$$91. \quad 2) \quad f^2 = p\varrho = p_1 \varrho_1 = p_2 \varrho_2 = p_3 \varrho_3.$$

Aus der Betrachtung des Dreiecks  $\overline{O_1 B A_1}$  (Fig. 12) folgt [Nr. 56, Formel 3)]:



$$3a) \quad \operatorname{tg} \frac{\beta}{2} = \frac{p_3}{e_1},$$

und hieraus durch Vertauschung der Buchstaben:

$$3b) \quad \operatorname{tg} \frac{\gamma}{2} = \frac{p_1}{e_2}; \quad \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{p_2}{e_3}. \quad 92.$$

Endlich folgt aus 2)

$$\frac{p_3}{e_1} = \frac{p_1}{e_3}; \quad \frac{p_1}{e_2} = \frac{p_2}{e_1}; \quad \frac{p_2}{e_3} = \frac{p_3}{e_2}.$$

Dies in den Formeln 3) eingesetzt, giebt:

$$4a) \operatorname{tg} \frac{\beta}{2} = \frac{p_1}{e_3}; \quad 4b) \operatorname{tg} \frac{\gamma}{2} = \frac{p_2}{e_1}; \quad 4c) \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{p_3}{e_2}. \quad 93.$$

Zusammenstellung der in 81, 90, 92, 93 enthaltenen Werthe für  $\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}$ ,  $\operatorname{tg} \frac{\beta}{2}$ ,  $\operatorname{tg} \frac{\gamma}{2}$ .

|                                      | 81.             | 90.             | 92.               | 93.               |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| $\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}$ | $\frac{e}{p_1}$ | $\frac{e_1}{p}$ | $\frac{p_2}{e_3}$ | $\frac{p_3}{e_2}$ |
| $\operatorname{tg} \frac{\beta}{2}$  | $\frac{e}{p_2}$ | $\frac{e_2}{p}$ | $\frac{p_3}{e_1}$ | $\frac{p_1}{e_3}$ |
| $\operatorname{tg} \frac{\gamma}{2}$ | $\frac{e}{p_3}$ | $\frac{e_3}{p}$ | $\frac{p_1}{e_2}$ | $\frac{p_2}{e_1}$ |

94.

Anm. Welche Formeln ergeben sich durch Gleichsetzung der Werthe 81 und 92, 90 und 92? — Wie lassen sich die Formeln 91 direct aus Fig. 12 ableiten?

**61. Berechnung des Dreiecks aus anderen Stücken als Seiten und Winkeln.** — Sind zur Berechnung des Dreiecks andere Stücke als Seiten und Winkel gegeben, so sucht man dieselben durch die Seiten auszudrücken. Dadurch erhält man drei Gleichungen, aus denen sich die drei Seiten bestimmen lassen. (Diese Gleichungen sind dann von höherem, als dem zweiten Grade, wenn 2 Seiten und eine der Grössen  $e$ , oder zwei Höhen und eine der Grössen  $p$  gegeben sind.) Die folgenden Formeln, welche bereits oben gefunden sind, oder aus oben gefundenen sich unmittelbar ergeben, zeigen, wie verschiedene Stücke des Dreiecks sich durch die Seiten ausdrücken lassen. (Formeln, welche sich durch blosser Vertauschung der Buchstaben finden lassen, sind weggelassen.)



$$f^2 = \sqrt{pp_1 p_2 p_3}; \quad \sin \alpha = \frac{2f^2}{bc}; \quad \cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc};$$

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{p_2 p_3}{bc}}; \quad \cos \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{pp_1}{bc}};$$

$$e = \frac{f^2}{p}; \quad e_1 = \frac{f^2}{p_1}; \quad r = \frac{abc}{4f^2};$$

$$95. \quad h_1 = \frac{2f^2}{a}; \quad t_1 = \sqrt{\frac{1}{2} \left( b^2 + c^2 - \frac{a^2}{2} \right)} \quad (\text{Th. II, 366}).$$

Ist  $m_1$  die Halbirungslinie des Winkels  $\alpha$ , welche die Seite  $a$  in die Abschnitte  $a_1$  (an  $b$ ) und  $a_2$  (an  $c$ ) theilt, so folgt aus Betrachtung der Theildreiecke:

$$\frac{m_1}{\sin \gamma} = \frac{b}{\sin \left( \gamma + \frac{\alpha}{2} \right)} = \frac{a_1}{\sin \frac{\alpha}{2}}; \quad \frac{m_1}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \left( \gamma + \frac{\alpha}{2} \right)} = \frac{a_2}{\sin \frac{\alpha}{2}};$$

Daher:

$$\frac{b + c}{\sin \left( \gamma + \frac{\alpha}{2} \right)} = \frac{a}{\sin \frac{\alpha}{2}}.$$

Durch Multiplication dieser Gleichung mit  $\frac{m_1}{\sin \gamma} = \frac{b}{\sin \left( \gamma + \frac{\alpha}{2} \right)}$  folgt:

$$\frac{m_1(b + c)}{\sin \gamma} = \frac{ab}{\sin \frac{\alpha}{2}}; \quad \text{oder: } m_1(b + c) \sin \frac{\alpha}{2} = ab \cdot \sin \gamma = 2f^2;$$

also

$$m_1 = \frac{2f^2}{(b + c) \sin \frac{\alpha}{2}},$$

oder, wenn man für  $f^2$  und  $\sin \frac{\alpha}{2}$  die Werthe 89 und 84 setzt:

$$96. \quad m_1 = \frac{2\sqrt{pp_1 bc}}{(b + c)}.$$

Anm. Statt auf die Bestimmung durch die drei Seiten lassen sich viele Aufgaben mittelst der früher abgeleiteten Formeln einfacher auf eine andere der vier Hauptaufgaben zurückführen. (Näheres s. in den „Übungsaufgaben“.)



## B. Die Auflösung von Gleichungen.

## I. Die Gleichung vom zweiten Grade.

62. *Vorbemerkung.* — Betrachtet man die Formel 41

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}$$

als Gleichung, in welcher  $\operatorname{tg} \alpha$  die Unbekannte ist, und bringt diese Gleichung (nach Th. I, Nr. 92) auf die Normalform, so erhält man die gemischt-quadratische Gleichung

$$(1) \quad \operatorname{tg}^2 \alpha + \frac{2}{\operatorname{tg} 2\alpha} \cdot \operatorname{tg} \alpha = 1.$$

Ersetzt man ferner in der Formel 40

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$\cos \alpha$  durch seinen Werth  $\sqrt{1 - \sin^2 \alpha}$  (aus 38), betrachtet diese Formel als Gleichung, in welcher  $\sin^2 \alpha$  die Unbekannte ist, und bringt diese Gleichung auf die Normalform, so erhält man die gemischt-quadratische Gleichung

$$(2) \quad \sin^4 \alpha - \sin^2 \alpha = - \frac{\sin^2 2\alpha}{4}.$$

Ist nun eine gemischt-quadratische Gleichung

$$(3) \quad x^2 + ax = \pm b$$

gegeben, so kann man, um dieselbe aufzulösen, zunächst (1) oder (2) Glied für Glied mit einem vorläufig noch unbestimmten Factor  $\lambda^2$  multipliciren, und erhält

$$(4) \quad \lambda^2 \operatorname{tg}^2 \alpha + \frac{2\lambda^2}{\operatorname{tg} 2\alpha} \cdot \operatorname{tg} \alpha = \lambda^2,$$

$$(5) \quad \lambda^2 \sin^4 \alpha - \lambda^2 \sin^2 \alpha = - \frac{\lambda^2 \sin^2 2\alpha}{4}.$$

Setzt man nun die drei Glieder der Gleichung (3) der Reihe nach gleich den drei Gliedern der Formel (4) oder der Formel (5), so erhält man drei Gleichungen, durch welche die Grössen  $\alpha$ ,  $\lambda$ ,  $x$  vollkommen bestimmt sind.

Anm. Die Grösse  $\alpha$  ist ebenso wie  $\lambda$  zuerst unbestimmt, weil (1) und (2) in Wahrheit Formeln sind, die für jeden Werth von  $\alpha$  gelten. Die Multiplication von (1) oder (2) mit  $\lambda^2$  ist nothwendig, weil sonst die Gleichsetzung von (3) mit (1) oder (2) drei Gleichungen mit nur zwei Unbekannten liefern würde (vgl. Th. I, Nr. 96). — Die Grössen  $\alpha$  und  $\lambda$  sind also in Bezug auf die Gleichung (3) als Hilfsgrössen zu betrachten, durch



deren Einführung, wie sogleich sich ergeben wird, die Lösung der vorgelegten Gleichung bewerkstelligt werden kann. — Da die rechte Seite von (1) positiv, die von (2) negativ ist, so muss man die Formel (1) oder (2) anwenden, je nachdem in der vorgelegten Gleichung (3) die Grösse  $b$  positiv oder negativ ist. Andernfalls würde man für  $\lambda$  und  $\sin \alpha$ , bezw.  $\operatorname{tg} \alpha$  imaginäre Werthe erhalten, die zur Bestimmung von  $x$  unbrauchbar sind.

Erster Fall:  $x^2 + ax = +b$ .

**63.** Durch Gleichsetzung der Glieder dieser Gleichung mit denen der Formel (4)

$$\lambda^2 \operatorname{tg}^2 \alpha + \frac{2\lambda^2}{\operatorname{tg} 2\alpha} \cdot \operatorname{tg} \alpha = \lambda^2$$

erhält man die drei Gleichungen:

$$(6a) \quad x^2 = \lambda^2 \operatorname{tg}^2 \alpha; \quad (6b) \quad ax = \frac{2\lambda^2 \operatorname{tg} \alpha}{\operatorname{tg} 2\alpha}; \quad (6c) \quad b = \lambda^2,$$

oder, durch Elimination von  $\lambda^2$ :

$$x^2 = b \cdot \operatorname{tg}^2 \alpha; \quad ax = \frac{2b \operatorname{tg} \alpha}{\operatorname{tg} 2\alpha},$$

oder, wenn man aus der ersten dieser Gleichungen  $x$  bestimmt, und den gefundenen Werth in der zweiten einsetzt, die  $\sqrt{b}$  aber mit dem Zeichen  $+$  nimmt:

$$(7a) \quad x = \sqrt{b} \cdot \operatorname{tg} \alpha; \quad a\sqrt{b} \cdot \operatorname{tg} \alpha = \frac{2b \cdot \operatorname{tg} \alpha}{\operatorname{tg} 2\alpha};$$

$$(7b) \quad \operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2b}{a\sqrt{b}} = \frac{2\sqrt{b}}{a}.$$

Nun ist nach 29  $\operatorname{tg} (2R - \alpha) = -\operatorname{tg} \alpha$ , oder  $\operatorname{tg} \alpha = -\operatorname{tg} (2R - \alpha)$ , oder, da nach 30  $\operatorname{tg} (-\varphi) = -\operatorname{tg} \varphi$  ist:  $\operatorname{tg} \alpha = \operatorname{tg} (\alpha - 2R)$ ;  $\operatorname{tg} 2\alpha = \operatorname{tg} (2\alpha - 2R)$ . Die Formel (7b) theilt sich also in die folgenden beiden:

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2\sqrt{b}}{a}; \quad \operatorname{tg} (2\alpha - 2R) = \frac{2\sqrt{b}}{a}.$$

Setzt man nun  $R - \alpha = \beta$ , so ist  $\operatorname{tg} (-2\beta) = \frac{2\sqrt{b}}{a}$ . Man kann also in (7a) für  $\alpha$  auch  $(-\beta)$  setzen, und erhält

$$x_1 = \sqrt{b} \cdot \operatorname{tg} \alpha; \quad x_2 = \sqrt{b} \cdot \operatorname{tg} (-\beta) = -\sqrt{b} \cdot \operatorname{tg} \beta.$$

Da endlich  $\operatorname{tg} \beta = \cot \alpha$  ist, so folgt

$$97. \quad (8) \quad \operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2\sqrt{b}}{a}; \quad x_1 = +\sqrt{b} \cdot \operatorname{tg} \alpha; \quad x_2 = -\sqrt{b} \cdot \cot \alpha.$$



In den Formeln (8) ist die Lösung der gegebenen Gleichung vollständig enthalten. Ist  $a$  negativ, so ist  $\sqrt{b}$  mit umgekehrtem Vorzeichen zu nehmen, damit  $2\alpha$  positiv bleibt.

Anm. Beispiele für diese und die folgenden Methoden s. am Schluss des Buches in der „Uebersicht der Formeln und Regeln“. Man verifizire an den Werthen (8) die Beziehungen:  $x_1 + x_2 = -a$ ;  $x_1 x_2 = -b$  (Th. I, 113).

Zweiter Fall:  $x^2 + ax = -b$ .

**64.** Durch Gleichsetzung der Glieder dieser Gleichung mit denen der Formel (5)

$$\lambda^2 \sin^4 \alpha - \lambda^2 \sin^2 \alpha = -\frac{\lambda^2 \sin^2 2\alpha}{4}$$

erhält man die drei Gleichungen:

$$(9a) \ x^2 = \lambda^2 \sin^4 \alpha; \quad (9b) \ ax = -\lambda^2 \sin^2 \alpha; \quad b = \frac{\lambda^2 \sin^2 2\alpha}{4},$$

oder, durch Elimination von  $\lambda^2$ :

$$x^2 = \frac{4b \sin^4 \alpha}{\sin^2 2\alpha}; \quad ax = -\frac{4b \sin^2 \alpha}{\sin^2 2\alpha},$$

oder, wenn man aus der ersten dieser Gleichungen  $x$  bestimmt, und den gefundenen Werth in der zweiten einsetzt, die  $\sqrt{b}$  aber mit dem Zeichen  $-$  nimmt:

$$x = -\frac{2\sqrt{b} \cdot \sin^2 \alpha}{\sin 2\alpha}; \quad -\frac{2a\sqrt{b} \sin^2 \alpha}{\sin 2\alpha} = -\frac{4b \sin^2 \alpha}{\sin^2 2\alpha},$$

oder

$$(10a) \ x = -\sqrt{b} \cdot \operatorname{tg} \alpha \quad (40, 26); \quad (10b) \ \sin 2\alpha = \frac{2b}{a\sqrt{b}} = \frac{2\sqrt{b}}{a}.$$

Nun ist nach 29  $\sin(2R - \alpha) = \sin \alpha$ . Die Formel (10b) theilt sich also in die folgenden beiden:

$$\sin 2\alpha = \frac{2\sqrt{b}}{a}; \quad \sin(2R - 2\alpha) = \frac{2\sqrt{b}}{a}.$$

Setzt man nun  $R - \alpha = \beta$ , so ist  $\sin 2\beta = \frac{2\sqrt{b}}{a}$ . Man kann also in (10a) für  $\alpha$  auch  $\beta$  setzen, und erhält

$$x_1 = -\sqrt{b} \cdot \operatorname{tg} \alpha; \quad x_2 = -\sqrt{b} \cdot \operatorname{tg} \beta.$$

Da endlich  $\operatorname{tg} \beta = \cot \alpha$  ist, so folgt

$$(11) \ \sin 2\alpha = \frac{2\sqrt{b}}{a}; \quad x_1 = -\sqrt{b} \cdot \operatorname{tg} \alpha; \quad x_2 = -\sqrt{b} \cdot \cot \alpha. \quad 98.$$



In den Formeln (11) ist die Lösung der gegebenen Gleichung vollständig enthalten. — Ist  $a$  negativ, so ist  $\sqrt{b}$  mit umgekehrtem Vorzeichen zu nehmen.

Anm. Man verificire an den Werthen (11) die Beziehungen  $x_1 + x_2 = -a$ ;  $x_1 x_2 = b$ . — Da die Funktion  $tg$  alle Werthe von 0 bis  $\infty$  annehmen kann, so lässt sich mittelst der Formeln (8) der Winkel  $\alpha$  stets bestimmen. Da aber die Funktion  $\sin$  stets zwischen 0 und 1 liegt, so findet man durch die Formeln (11) nur dann einen Werth für  $\alpha$ , wenn  $2\sqrt{b} < a$ , d. h.  $a^2 > 4b$  ist. Ist diese Bedingung nicht erfüllt, so sind (nach Th. I, Nr. 101) die Wurzeln der Gleichung imaginär. Demnach werden auch Winkel, deren Sinus und Cosinus nicht zwischen 0 und 1 liegen, als imaginär zu betrachten sein.

**65. Reduction der algebraischen Lösung der gemischt-quadratischen Gleichung auf die trigonometrische Form.**

Erster Fall:  $x^2 + ax = +b$ .

Nach Th. I, Nr. 99, Anm. ist

$$x = \frac{\pm \sqrt{a^2 + 4b} - a}{2},$$

oder (1) 
$$x = \frac{a}{2} \left[ \pm \sqrt{1 + \frac{4b}{a^2}} - 1 \right].$$

Setzt man nun

$$(2) \quad \frac{4b}{a^2} = tg^2 2\alpha,$$

(was zulässig ist, da  $b$ , also auch  $\frac{4b}{a^2}$  positiv, also  $tg \alpha$  reell ist), woraus

$$(3) \quad \frac{a}{2} = \frac{\sqrt{b}}{tg 2\alpha}$$

folgt, und setzt (2) und (3) in (1) ein, so folgt:

$$x = \frac{\sqrt{b}}{tg 2\alpha} \left[ \pm \sqrt{1 + tg^2 2\alpha} - 1 \right],$$

oder, da

$$\begin{aligned} \pm \sqrt{1 + tg^2 2\alpha} - 1 &= \pm \sqrt{\frac{\cos^2 2\alpha + \sin^2 2\alpha}{\cos^2 2\alpha}} - 1 = \pm \frac{1}{\cos 2\alpha} - 1 \\ &= \frac{\pm 1 - \cos 2\alpha}{\cos 2\alpha} \end{aligned}$$

ist,

$$x = \frac{\sqrt{b}}{tg 2\alpha} \cdot \frac{(\pm 1 - \cos 2\alpha)}{\cos 2\alpha} = \frac{\sqrt{b} (\pm 1 - \cos 2\alpha)}{\sin 2\alpha},$$



also (4) 
$$\begin{cases} x_1 = +\sqrt{b} \left( \frac{1 - \cos 2\alpha}{\sin 2\alpha} \right) = +\sqrt{b} \cdot \operatorname{tg} \alpha & (44a) \\ x_2 = -\sqrt{b} \left( \frac{1 + \cos 2\alpha}{\sin 2\alpha} \right) = -\sqrt{b} \cdot \operatorname{cot} \alpha & (44a). \end{cases}$$

Zweiter Fall:  $x^2 + ax = -b$ ; ( $a^2 > 4b$ ).

Nach Th. I, Nr. 99, Anm. ist

$$x = \frac{\pm \sqrt{a^2 - 4b} - a}{2},$$

oder (5) 
$$x = \frac{a}{2} \left[ \pm \sqrt{1 - \frac{4b}{a^2}} - 1 \right].$$

Setzt man nun

$$(6) \quad \frac{4b}{a^2} = \sin^2 2\alpha,$$

(was zulässig ist, da  $b$ , also auch  $\frac{4b}{a^2}$  positiv, überdies  $\frac{4b}{a^2} < 1$ , also  $\sin \alpha$  reell ist), woraus

$$(7) \quad \frac{a}{2} = \frac{\sqrt{b}}{\sin 2\alpha}$$

folgt, und setzt (6) und (7) in (5) ein, so folgt:

$$x = \frac{\sqrt{b}}{\sin 2\alpha} [\pm \sqrt{1 - \sin^2 2\alpha} - 1],$$

oder, da  $\pm \sqrt{1 - \sin^2 2\alpha} - 1 = \pm \cos 2\alpha - 1$  ist,

$$x = \frac{\sqrt{b}}{\sin 2\alpha} (\pm \cos 2\alpha - 1) = \frac{\sqrt{b} (\pm \cos 2\alpha - 1)}{\sin 2\alpha};$$

also: (8) 
$$\begin{cases} x_1 = -\sqrt{b} \left( \frac{1 - \cos 2\alpha}{\sin 2\alpha} \right) = -\sqrt{b} \cdot \operatorname{tg} \alpha & (44a) \\ x_2 = -\sqrt{b} \left( \frac{1 + \cos 2\alpha}{\sin 2\alpha} \right) = -\sqrt{b} \cdot \operatorname{cot} \alpha & (44a). \end{cases}$$

## II. Die Gleichung vom dritten Grade.

Erster Fall:  $y^3 - 3py = 2q$  ( $p^3 > q^2$ ).

**66. Vorbemerkung.** — Setzt man in der Formel 34

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$\beta = 2\alpha$ , so folgt:



$$\begin{aligned}
 \sin 3\alpha &= \sin \alpha \cdot \cos 2\alpha + \cos \alpha \cdot \sin 2\alpha \\
 &= \sin \alpha (\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) + 2 \sin \alpha \cos^2 \alpha \quad (39, 40) \\
 &= 3 \sin \alpha \cos^2 \alpha - \sin^3 \alpha = 3 \sin \alpha (1 - \sin^2 \alpha) - \sin^3 \alpha,
 \end{aligned}$$

oder:  $\sin 3\alpha = 3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha.$

Betrachtet man diese Formel als Gleichung, in welcher  $\sin \alpha$  die Unbekannte ist, und bringt diese Gleichung auf die Normalform, so erhält man die cubische Gleichung

$$(1) \quad \sin^3 \alpha - \frac{3}{4} \sin \alpha = -\frac{\sin 3\alpha}{4}.$$

Ist nun eine reducirte cubische Gleichung (vgl. Th. I, Nr. 109)

$$(2) \quad y^3 - 3py = 2q$$

gegeben, so kann man, um dieselbe aufzulösen, zunächst (1) mit einem vorläufig noch unbestimmten Factor  $\lambda^3$  multipliciren, und erhält

$$(3) \quad \lambda^3 \sin^3 \alpha - \frac{3\lambda^3 \sin \alpha}{4} = -\frac{\lambda^3 \sin 3\alpha}{4}.$$

Setzt man nun die drei Glieder der Gleichung (2) der Reihe nach gleich den drei Gliedern der Formel (3), so erhält man drei Gleichungen, durch welche die Grössen  $\alpha$ ,  $\lambda$ ,  $x$  vollkommen bestimmt sind, nämlich

$$(4a) \quad y^3 = \lambda^3 \sin^3 \alpha; \quad (4b) \quad py = \frac{\lambda^3 \sin \alpha}{4}; \quad (4c) \quad 2q = -\frac{\lambda^3 \sin 3\alpha}{4},$$

oder, durch Elimination von  $\lambda^3$ :

$$y^3 = -\frac{8q \cdot \sin^3 \alpha}{\sin 3\alpha}; \quad py = -\frac{2q \cdot \sin \alpha}{\sin 3\alpha},$$

oder, wenn man aus der zweiten dieser Gleichungen  $y$  bestimmt, und den gefundenen Werth in der ersten einsetzt,

$$\begin{aligned}
 -\frac{8q^3 \sin^3 \alpha}{p^3 \sin^3 3\alpha} &= -\frac{8q \sin^3 \alpha}{\sin 3\alpha}; \quad \frac{q^2}{p^3 \sin^2 3\alpha} = 1 \\
 (5a) \quad \sin 3\alpha &= \sqrt{\frac{q^2}{p^3}} = \frac{q}{\sqrt{p^3}}.
 \end{aligned}$$

Setzt man diesen Werth in der ersten Gleichung ein, so folgt:

$$y^3 = -\frac{8q \cdot \sin^3 \alpha \sqrt{p^3}}{q};$$

oder (5b)  $y = -2\sqrt{p} \cdot \sin \alpha.$

Nun ist nach 29  $\sin(2R - \alpha) = \sin \alpha$ . Ferner nach 30 [ $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$ ]  $\sin(4R - \alpha) = -\sin \alpha$ , oder, wenn man hierin



$(2R + \alpha)$  für  $\alpha$  setzt:  $\sin(2R - \alpha) = -\sin(2R + \alpha) = \sin(-2R - \alpha)$ .  
Es ist daher

$$\sin 3\alpha = \sin(2R - 3\alpha) = \sin(-2R - 3\alpha).$$

Setzt man nun  $\left(\frac{2}{3}R - \alpha\right) = \beta$ ,  $\frac{2}{3}R + \alpha = \gamma$ , so ist

$$\sin 3\alpha = \sin 3\beta = \sin(-3\gamma).$$

Man kann also in (5b) für  $\alpha$  auch  $\beta$  oder  $-\gamma$  setzen, und erhält

$$y_1 = -2\sqrt{p} \sin \alpha; y_2 = -2\sqrt{p} \sin \beta; y_3 = -2\sqrt{p} \sin(-\gamma) = +2\sqrt{p} \sin \gamma,$$

oder, indem man  $\beta$  und  $\gamma$  durch ihre Werthe ersetzt:

$$(6) \quad \sin 3\alpha = \frac{q}{\sqrt{p^3}}; \quad 99.$$

$$y_1 = -2\sqrt{p} \sin \alpha; y_2 = -2\sqrt{p} \sin\left(\frac{2}{3}R - \alpha\right); y_3 = +2\sqrt{p} \sin\left(\frac{2}{3}R + \alpha\right).$$

In den Formeln (6) ist die Lösung der gegebenen Gleichung vollständig enthalten. — Hier, wie in den folgenden Fällen ist, wenn  $q$  negativ,  $\sqrt{p}$  mit entgegengesetztem Vorzeichen zu nehmen.

Anm. Der im Vorstehenden behandelte Fall der cubischen Gleichung ist derjenige, in welchem alle drei Wurzeln reell sind, aber durch die cardanische Formel in imaginärer Form gegeben werden (vgl. Th. I, Nr. 111). Umgekehrt giebt die obige Methode keine der Wurzeln in reeller Form, wenn  $p^3 < q^2$  ist, da alsdann  $\sin 3\alpha > 1$  sein würde. Die algebraische und die oben ausgeführte trigonometrische Methode zur Auflösung der cubischen Gleichung ergänzen sich also in der Weise, dass die Bestimmung einer reellen Wurzel der Gleichung in reeller Form durch die eine Methode gelingt, wenn die andere versagt. Und zwar führt die algebraische Methode zum Ziel, wenn in der Normalform  $y^3 + 3py = 2q$  entweder  $p$  positiv, oder  $p$  negativ und  $p^3 < q^2$  ist, dagegen die trigonometrische Methode, wenn  $p$  negativ und  $p^3 > q^2$  ist. — (Was ist über den Fall  $p^3 = q^2$  zu bemerken?)

**67. Reduction der algebraischen Lösung der cubischen Gleichung auf die trigonometrische Form.**

Zweiter Fall:  $y^3 - 3py = 2q$  ( $p^3 < q^2$ ).

Nach Th. I, Nr. 110 ist

$$(1) \quad y = \sqrt[3]{q + \sqrt{q^2 - p^3}} + \sqrt[3]{q - \sqrt{q^2 - p^3}}.$$

Setzt man nun

$$(2) \quad \frac{p^3}{q^2} = \sin^2 2\beta; \quad \text{also} \quad q = \frac{\sqrt{p^3}}{\sin 2\beta}$$



(was zulässig ist, da  $p$ , also auch  $\frac{p^3}{q^2}$  positiv, überdies  $\frac{p^3}{q^2} < 1$ , also  $\sin 2\beta$  reell ist), und setzt in (1) für  $q$  seinen Werth, so ist zunächst

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{q \pm \sqrt{q^2 - p^3}} &= \sqrt[3]{\frac{\sqrt{p^3}}{\sin 2\beta} \pm \sqrt{\frac{p^3}{\sin^2 2\beta} - p^3}} = \sqrt[3]{\frac{\sqrt{p^3} \pm \sqrt{p^3(1 - \sin^2 2\beta)}}{\sin 2\beta}} \\ &= \sqrt[3]{\frac{\sqrt{p^3} \pm \cos 2\beta \sqrt{p^3}}{\sin 2\beta}} = \sqrt{p} \cdot \sqrt[3]{\frac{1 \pm \cos 2\beta}{\sin 2\beta}}; \end{aligned}$$

also nach 44a

$$\sqrt[3]{q + \sqrt{q^2 - p^3}} = \sqrt{p} \cdot \sqrt[3]{\cot \beta}; \quad \sqrt[3]{q - \sqrt{q^2 - p^3}} = \sqrt{p} \cdot \sqrt[3]{\tan \beta}.$$

Setzt man weiter

$$(3) \quad \sqrt[3]{\tan \beta} = \tan \alpha, \text{ also } \sqrt[3]{\cot \beta} = \cot \alpha,$$

so folgt:

$$\sqrt[3]{q + \sqrt{q^2 - p^3}} = \sqrt{p} \cdot \cot \alpha; \quad \sqrt[3]{q - \sqrt{q^2 - p^3}} = \sqrt{p} \cdot \tan \alpha,$$

und durch Einsetzung dieser Werthe in (1):

$$y = \sqrt{p} (\tan \alpha + \cot \alpha) = \sqrt{p} \left( \frac{\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha}{\sin \alpha \cos \alpha} \right) = \frac{2\sqrt{p}}{\sin 2\alpha}.$$

Die Lösung der gegebenen Gleichung ist also in folgenden Formeln enthalten:

$$100. \quad (4) \quad \sin 2\beta = \frac{\sqrt{p^3}}{q}; \quad \tan \alpha = \sqrt[3]{\tan \beta}; \quad y = \frac{2\sqrt{p}}{\sin 2\alpha}.$$

Anm. Dieses Verfahren liefert nur die reelle Wurzel der Gleichung, nicht aber die beiden imaginären. Man kann zwar in (4) für  $2\beta$  auch  $(2R - 2\beta)$ , d. h.  $R - \beta$  für  $\beta$  setzen. Dadurch verwandelt sich aber in der zweiten Formel nur  $\tan \beta$  in  $\cot \beta$ ,  $\tan \alpha$  in  $\cot \alpha$ , also  $\alpha$  in  $R - \alpha$ ,  $2\alpha$  in  $(2R - \alpha)$ , welche Verwandlung  $\sin 2\alpha$ , also auch  $y$  ungeändert lässt. — Ueber die Bestimmung der imaginären Wurzeln s. die Anm. am Schluss von Nr. 112 in Th. I.

Dritter Fall:  $y^3 + 3py = 2q$ .

68. Nach Th. I, Nr. 110 ist

$$(5) \quad y = \sqrt[3]{q + \sqrt{q^2 + p^3}} + \sqrt[3]{q - \sqrt{q^2 + p^3}}.$$



Setzt man nun

$$(6) \quad \frac{p^3}{q^2} = \operatorname{tg}^2 2\beta, \text{ also } q = \sqrt{p^3} \cdot \cot 2\beta,$$

und setzt in (5) für  $q$  seinen Werth, so ist zunächst

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{q \pm \sqrt{q^2 + p^3}} &= \sqrt[3]{\sqrt{p^3} \cdot \cot 2\beta \pm \sqrt{p^3} (\cot^2 2\beta + 1)} \\ &= \sqrt[3]{\sqrt{p^3} \cdot \cot 2\beta \pm \frac{\sqrt{p^3}}{\sin 2\beta}} = \sqrt{p} \cdot \sqrt[3]{\frac{\cos 2\beta \pm 1}{\sin 2\beta}}; \end{aligned}$$

also nach 44a

$$\sqrt[3]{q + \sqrt{q^2 + p^3}} = \sqrt{p} \cdot \sqrt[3]{\cot \beta}; \quad \sqrt[3]{q - \sqrt{q^2 + p^3}} = -\sqrt{p} \cdot \sqrt[3]{\operatorname{tg} \beta}.$$

Setzt man weiter

$$(7) \quad \sqrt[3]{\operatorname{tg} \beta} = \operatorname{tg} \alpha, \text{ also } \sqrt[3]{\cot \beta} = \cot \alpha,$$

so folgt:

$$\sqrt[3]{q + \sqrt{q^2 + p^3}} = \sqrt{p} \cdot \cot \alpha; \quad \sqrt[3]{q - \sqrt{q^2 + p^3}} = \sqrt{p} \cdot \operatorname{tg} \alpha,$$

und durch Einsetzung dieser Werthe in (5)

$$y = \sqrt{p} (\cot \alpha - \operatorname{tg} \alpha) = \sqrt{p} \left( \frac{\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha}{\sin \alpha \cos \alpha} \right) = \frac{2\sqrt{p} \cdot \cos 2\alpha}{\sin 2\alpha} = 2\sqrt{p} \cdot \cot 2\alpha.$$

Die Lösung der gegebenen Gleichung ist also in folgenden Formeln enthalten:

$$(8) \quad \operatorname{tg} 2\beta = \frac{\sqrt{p^3}}{q}; \quad \operatorname{tg} \alpha = \sqrt[3]{\operatorname{tg} \beta}; \quad y = 2\sqrt{p} \cdot \cot 2\alpha. \quad 101.$$

Anm. Auch dieses Verfahren liefert nur die reelle Wurzel der Gleichung. Vgl. die vorige Anm. — Warum lässt sich die trigonometrische Methode nicht zur Auflösung von Gleichungen höheren Grades anwenden? (S. Formel 58.)



# Uebersicht der Formeln und Regeln.

(Zur Wiederholung.)

## Reine Trigonometrie.

### A. Die Winkelfunktionen als geschlossene Ausdrücke.

#### I. Funktionen spitzer Winkel.

##### 1. Der Cosinus.

1. Der grössere von zwei spitzen Winkeln hat den kleineren Cosinus.
2.  $\cos 0 = 1$ .
3.  $\cos R = 0$ .
4.  $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta = 1$ , ( $\alpha + \beta = R$ ).
5.  $\cos(\alpha + \alpha_1) = \cos \alpha \cos \alpha_1 - \cos \beta \cos \beta_1$ , ( $\alpha + \beta = \alpha_1 + \beta_1 = R$ ).
6.  $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$ , ( $\alpha + \beta = R$ ).
7.  $\cos \frac{\gamma}{2} = + \sqrt{\frac{1 + \cos \gamma}{2}}$ .
8.  $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ .

##### 2. Die übrigen Funktionen.

9. Sind  $a$  und  $b$  Katheten,  $c$  Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks, so ist

$$\sin \alpha = \frac{a}{c}, \quad \cos \alpha = \frac{b}{c},$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}, \quad \operatorname{cot} \alpha = \frac{b}{a},$$

$$\sec \alpha = \frac{c}{b}, \quad \operatorname{cosec} \alpha = \frac{c}{a}.$$

10. Jede Funktion eines spitzen Winkels ist gleich der coordinirten Funktion seines Complementwinkels.

11. Nimmt ein spitzer Winkel zu, so nehmen seine directen Funktionen zu, seine indirecten ab.

12.  $\sin 0 = 0$ ,  $\operatorname{tg} 0 = 0$ ,  $\sec 0 = 1$ ,  
 $\cos 0 = 1$ ,  $\operatorname{cot} 0 = \infty$ ,  $\operatorname{cosec} 0 = \infty$ .

13.  $\sin R = 0$ ,  $\operatorname{tg} R = \infty$ ,  $\sec R = \infty$ ,  
 $\cos R = 0$ ,  $\operatorname{cot} R = 0$ ,  $\operatorname{cosec} R = 1$ .

14.  $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$ .

15.  $\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \operatorname{tg} \alpha$ .

16.  $\operatorname{tg} 45^\circ = 1$ .

17.  $\cos 72^\circ = \frac{\sqrt{5} - 1}{4}$ .

#### II. Funktionen beliebiger Winkel.

##### 1. Der Cosinus.

18. Congruente Winkel haben gleiche Cosinus. —  $\cos(4nR \pm \alpha) = \cos \alpha$ .

19.  $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$ .

20.  $\cos(2R - \alpha) = -\cos \alpha$ .

21.  $\cos 0, R, 2R, 3R, 4R, \dots$   
 $= +1, 0, -1, 0, +1, \dots$

22. Der Cosinus eines Winkels ist im ersten und vierten Qua-



dranten positiv, im zweiten und dritten negativ. — Der Cosinus eines Winkels nimmt zwischen  $+1$  und  $-1$  im ersten und zweiten Quadranten ab, im dritten und vierten zu.

23. Projicirt man von drei aus einem Punkte gehenden Strecken die erste auf die zweite, und diese Projection auf die dritte, so ist die letzte Projection, dividirt durch die dritte Strecke, gleich dem Producte der Cosinus der beiden Zwischenwinkel.

$$23^a. \cos(R + \alpha) = -\cos(R - \alpha).$$

$$24. \cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \cos(R - \alpha) \cos(R - \beta).$$

## 2. Die übrigen Funktionen.

$$25. \sin \alpha = \cos(R - \alpha).$$

$$26. \operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}.$$

$$27. \sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha}; \operatorname{cosec} \alpha = \frac{1}{\sin \alpha};$$

$$\cot \alpha = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha}.$$

$$28. \sin(R - \alpha) = \cos \alpha; \operatorname{tg}(R - \alpha) = \cot \alpha.$$

$$29. \cos(2R - \alpha) = -\cos \alpha;$$

$$\sin(2R - \alpha) = \sin \alpha;$$

$$\operatorname{tg}(2R - \alpha) = -\operatorname{tg} \alpha.$$

Supplementwinkel haben entgegengesetzte Sinus, aber gleiche Cosinus.

$$30. \cos(-\alpha) = \cos \alpha; \sin(-\alpha) = -\sin \alpha;$$

$$\operatorname{tg}(-\alpha) = -\operatorname{tg} \alpha.$$

Entgegengesetzte Winkel haben entgegengesetzte Sinus, aber gleiche Cosinus.

| 31.      | <i>sin</i> | <i>cos</i> | <i>tg</i> | <i>cot</i> | <i>sec</i>  | <i>cosec</i> |
|----------|------------|------------|-----------|------------|-------------|--------------|
| 0        | 0          | $+1$       | 0         | $+\infty$  | $+1$        | $\mp\infty$  |
| <i>R</i> | $+1$       | 0          | $+\infty$ | 0          | $\pm\infty$ | $+1$         |
| $2R$     | 0          | $-1$       | 0         | $-\infty$  | $-1$        | $\pm\infty$  |
| $3R$     | $-1$       | 0          | $-\infty$ | 0          | $\mp\infty$ | $-1$         |
| $4R$     | 0          | $+1$       | 0         | $+\infty$  | $+1$        | $\mp\infty$  |

$$32. \cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta.$$

$$33. \cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta.$$

$$34. \sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta.$$

$$35. \sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta.$$

$$36. \operatorname{tg}(\alpha + \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta}{1 - \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta}.$$

$$37. \operatorname{tg}(\alpha - \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta}{1 + \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta}.$$

$$38. \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1.$$

$$39. \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha.$$

$$39^a. \cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha = 2\cos^2 \alpha - 1.$$

$$40. \sin 2\alpha = 2\sin \alpha \cos \alpha.$$

$$41. \operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2\operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}.$$

$$42. \cos \frac{\beta}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos \beta}{2}}.$$

$$43. \sin \frac{\beta}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \beta}{2}}.$$

$$44. \operatorname{tg} \frac{\beta}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \beta}{1 + \cos \beta}}.$$

$$44^a. \operatorname{tg} \frac{\beta}{2} = \frac{\sin \beta}{1 + \cos \beta} = \frac{1 - \cos \beta}{\sin \beta}.$$

$$45. \sigma = \frac{\alpha + \beta}{2}; \delta = \frac{\alpha - \beta}{2}.$$

$$45^a. \sigma + \delta = \alpha; \sigma - \delta = \beta.$$

$$46. \sin \alpha + \sin \beta = 2\sin \sigma \cos \delta.$$

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2\cos \sigma \sin \delta.$$

$$\cos \beta + \cos \alpha = 2\cos \sigma \cos \delta.$$

$$\cos \beta - \cos \alpha = 2\sin \sigma \sin \delta.$$



### B. Die Winkelfunktionen in transcendenter und Reihenform.

$$47. \alpha = \frac{2R}{\pi} \cdot x; \quad x = \frac{\pi\alpha}{2R}.$$

$$48. e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots$$

$$49. e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

$$50. a_1 = {}^e l a.$$

$$51. a^x = 1 + a_1 x + \frac{a_1^2}{2!} x^2 + \frac{a_1^3}{3!} x^3 + \dots$$

51<sup>a</sup>. Eine unendliche Reihe convergirt, wenn ihr Quotient von irgend einem Gliede an beständig kleiner bleibt, als eine gegebene Zahl, die kleiner als Eins ist.

$$52. e = 2,718281828 \dots$$

$$53. \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

$$54. e^{xi} = \cos x + i \sin x.$$

$$55. \cos x = \frac{e^{xi} + e^{-xi}}{2};$$

$$\sin x = \frac{e^{xi} - e^{-xi}}{2i}.$$

$$56. (\cos x + i \sin x)(\cos y + i \sin y) = \cos(x + y) + i \sin(x + y).$$

$$57. (\cos x + i \sin x)^n = \cos nx + i \sin nx.$$

$$58. \cos nx = \cos^n x - n^2 \cos^{n-2} x \cdot \sin^2 x + n^4 \cos^{n-4} x \cdot \sin^4 x - \dots$$

$$\sin nx = n \cdot \cos^{n-1} x \cdot \sin x - n^3 \cos^{n-3} x \cdot \sin^3 x + n^5 \cos^{n-5} x \cdot \sin^5 x - \dots$$

$$59. e^{-\frac{\pi}{2}} = i^i.$$

$$60. e^{\frac{4n}{2} \cdot \frac{\pi}{2} i} = +1; \quad e^{\frac{(4n+1)}{2} \cdot \frac{\pi}{2} i} = +i;$$

$$e^{\frac{(4n+2)}{2} \cdot \frac{\pi}{2} i} = -1; \quad e^{\frac{(4n+3)}{2} \cdot \frac{\pi}{2} i} = -i.$$

$$61. \cos 4n \cdot \frac{\pi}{2} = +1; \quad \cos(4n+1) \frac{\pi}{2} = 0;$$

$$\cos(4n+2) \frac{\pi}{2} = -1; \quad \cos(4n+3) \frac{\pi}{2} = 0.$$

$$\sin 4n \cdot \frac{\pi}{2} = 0; \quad \sin(4n+1) \frac{\pi}{2} = +1;$$

$$\sin(4n+2) \frac{\pi}{2} = 0; \quad \sin(4n+3) \frac{\pi}{2} = -1.$$

62. Eine reelle positive Zahl hat unendlich viele Logarithmen, von denen aber nur einer reell ist ( $n = 0$ ).

$${}^e l c = x + 2n\pi i.$$

62<sup>a</sup>. Eine reelle negative Zahl hat unendlich viele Logarithmen, die sämtlich imaginär sind.

$${}^e l(-c) = x + (2n + 1)\pi i.$$

$$63. \frac{\pi}{2} = \frac{{}^e l i}{i}.$$

$$64. \sqrt[k]{1} = e^{\frac{2n\pi i}{k}}.$$

$$65. \operatorname{arctg} x = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + \dots$$

66. Jede complexe Zahl  $a \pm bi$  kann in der Form  $ce^{\pm xi}$  dargestellt werden, wobei  $c = \sqrt{a^2 + b^2}$  und  $x = \operatorname{arctg} \frac{b}{a}$  ist.

$$67. {}^e l(a \pm bi) = \frac{1}{2} {}^e l(a^2 + b^2) \pm i \operatorname{arctg} \frac{b}{a}.$$

$$68. \operatorname{arctg} z = \frac{1}{2i} {}^e l \frac{1 + zi}{1 - zi}.$$



$$\begin{aligned}
 69. \quad {}^e l \frac{1+y}{1-y} &= 2 \left[ y + \frac{1}{3} y^3 + \frac{1}{5} y^5 + \frac{1}{7} y^7 + \dots \right]. \\
 70. \quad {}^e l n &= 2 \left[ \frac{n-1}{n+1} + \frac{1}{3} \left( \frac{n-1}{n+1} \right)^3 + \frac{1}{5} \left( \frac{n-1}{n+1} \right)^5 + \dots \right]. \\
 71. \quad {}^e l (p+q) &= {}^e l p + 2 \left[ \frac{q}{2p+q} + \frac{1}{3} \left( \frac{q}{2p+q} \right)^3 + \frac{1}{5} \left( \frac{q}{2p+q} \right)^5 + \dots \right]. \\
 72. \quad {}^e l p &= \frac{1}{2} \left[ {}^e l (p+1) + {}^e l (p-1) \right] \\
 &\quad + \frac{1}{2p^2-1} + \frac{1}{3} \left( \frac{1}{2p^2-1} \right)^3 + \frac{1}{5} \left( \frac{1}{2p^2-1} \right)^5 + \dots \\
 73. \quad {}^e l p &= \frac{1}{4} \left[ {}^e l (p^2+1) + {}^e l (p+1) + {}^e l (p-1) \right] + \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{2p^4-1} + \frac{1}{3} \left( \frac{1}{2p^4-1} \right)^3 + \frac{1}{5} \left( \frac{1}{2p^4-1} \right)^5 + \dots \right]. \\
 74. \quad \frac{\pi}{4} &= 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots \\
 75. \quad \frac{\pi}{4} &= 8 \operatorname{arctg} \frac{1}{10} - 4 \operatorname{arctg} \frac{1}{515} - \operatorname{arctg} \frac{1}{239}.
 \end{aligned}$$

## Angewandte Trigonometrie.

### A. Die Berechnung der Dreiecke.

#### I. Das rechtwinklige Dreieck.

76.

| Gegeben:        | Lösung:                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| 1) $a, c.$      | $b = \sqrt{c^2 - a^2}; \cos \alpha = \frac{b}{c}.$ |
| 2) $a, b.$      | $c = \sqrt{a^2 + b^2}; \cos \alpha = \frac{b}{c}.$ |
| 3) $b, \alpha.$ | $c = \frac{b}{\cos \alpha}; a = \sqrt{c^2 - b^2}.$ |
| 4) $c, \alpha.$ | $b = c \cdot \cos \alpha; a = \sqrt{c^2 - b^2}.$   |

#### II. Das schiefwinklige Dreieck.

##### 1. Erste Methode.

77. Die Seiten eines Dreiecks verhalten sich wie die Sinus ihrer Gegenwinkel (Sinussatz).

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}.$$

78. Das Quadrat einer Dreiecksseite ist gleich der Summe der Quadrate der andern Seiten, vermindert um das doppelte Product aus diesen Seiten und dem Cosinus des von ihnen eingeschlossenen Winkels (Cosinussatz).

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma.$$

##### 2. Zweite Methode.

79. Der Sinus eines Winkels im Dreieck ist gleich dem Quotienten aus der gegenüberliegenden Seite und dem Durch-



messer des Umkreises. (Satz vom umbeschriebenen Kreise.)

$$\sin \alpha = \frac{a}{2r}; \sin \beta = \frac{b}{2r}; \sin \gamma = \frac{c}{2r}.$$

#### Aufgabe 1.

Ein Dreieck zu berechnen aus einer Seite und zwei Winkeln ( $\alpha\beta\gamma$ ).

Lösung:  $\alpha = 2R - (\beta + \gamma); 2r = \frac{a}{\sin \alpha};$

$$b = 2r \cdot \sin \beta; c = 2r \cdot \sin \gamma.$$

Beispiel:  $a = 510; \beta = 76^\circ 19'; \gamma = 35^\circ 18'.$

| Numeri   |         | Logarithmi    |        | Nebenrechnung |
|----------|---------|---------------|--------|---------------|
| $a$      | 510     | $a$           | 2,7076 |               |
| $\beta$  | 76. 19  | $\sin \alpha$ | 9,9683 |               |
| $\gamma$ | 35. 18  | $2r$          | 2,7393 |               |
|          | 111. 37 | $\sin \beta$  | 9,9875 |               |
| $\alpha$ | 68. 23  | $\sin \gamma$ | 9,7618 |               |
| $b$      | 533     | $b$           | 2,7268 |               |
| $c$      | 317     | $c$           | 2,5011 |               |

#### Aufgabe 2.

Ein Dreieck zu berechnen aus zwei Seiten und einem nicht eingeschlossenen Winkel ( $ab\alpha$ ).

Lösung:  $2r = \frac{a}{\sin \alpha}; \sin \beta = \frac{b}{2r};$

$$\gamma = 2R - (\alpha + \beta); c = 2r \cdot \sin \gamma.$$

Beispiel:  $a = 450; b = 85; \alpha = 87^\circ 55'.$

| Numeri   |        | Logarithmi    |        | Nebenrechnung |
|----------|--------|---------------|--------|---------------|
| $a$      | 450    | $a$           | 2,6532 |               |
| $b$      | 85     | $\sin \alpha$ | 9,9997 |               |
| $\alpha$ | 87. 55 | $2r$          | 2,6535 |               |

|          |        |               |        |
|----------|--------|---------------|--------|
| $\beta$  | 10. 53 | $b$           | 1,9294 |
|          | 98. 48 | $\sin \beta$  | 9,2759 |
| $\gamma$ | 81. 12 | $\sin \gamma$ | 9,9949 |
| $c$      | 445    | $c$           | 2,6484 |

80. Die Tangens der halben Summe zweier Winkel im Dreieck verhält sich zur Tangens ihrer halben Differenz, wie die Summe ihrer Gegenseiten zur Differenz derselben (Tangentialsatz).

$$\frac{s}{d} = \frac{\operatorname{tg} \sigma}{\operatorname{tg} \delta}; s = a + b; \sigma = \frac{1}{2}(\alpha + \beta); d = a - b; \delta = \frac{1}{2}(\alpha - \beta).$$

#### Aufgabe 3.

Ein Dreieck zu berechnen aus zwei Seiten und dem eingeschlossenen Winkel ( $ab\gamma$ ).

Lösung:  $s = a + b; d = a - b;$

$$\sigma = R - \frac{\gamma}{2}; \operatorname{tg} \delta = \frac{d \cdot \operatorname{tg} \sigma}{s};$$

$$\alpha = \sigma + \delta; \beta = \sigma - \delta; 2r = \frac{a}{\sin \alpha};$$

$$c = 2r \cdot \sin \gamma.$$

Beispiel:  $a = 1196; b = 353; \gamma = 39^\circ 36'.$

| Numeri   |         | Logarithmi                 |        | Nebenrechnung |
|----------|---------|----------------------------|--------|---------------|
| $a$      | 1196    | $\operatorname{tg} \sigma$ | 0,4437 |               |
| $b$      | 353     | $d$                        | 2,9258 |               |
| $\gamma$ | 39. 36  |                            | 3,3695 |               |
| $s$      | 1549    | $s$                        | 3,1901 |               |
| $d$      | 843     | $\operatorname{tg} \delta$ | 0,1794 |               |
| $\sigma$ | 70. 12  | $a$                        | 3,0777 |               |
| $\delta$ | 56. 31  | $\sin \alpha$              | 9,9040 |               |
| $\alpha$ | 126. 43 | $2r$                       | 3,1737 |               |
| $\beta$  | 13. 41  | $\sin \gamma$              | 9,8044 |               |
| $c$      | 951     | $c$                        | 2,9781 |               |

81. Die Tangens eines halben Winkels im Dreieck ist gleich dem



Quotienten aus dem Radius des Inkreises und der um die halbe Gegenseite verminderten halben Summe der einschliessenden Seiten. (Satz vom einbeschriebenen Kreise.)

$$\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{\varrho}{p_1}; \operatorname{tg} \frac{\beta}{2} = \frac{\varrho}{p_2}; \operatorname{tg} \frac{\gamma}{2} = \frac{\varrho}{p_3}.$$

$$p_1 = \frac{b+c-a}{2}; p_2 = \frac{c+a-b}{2};$$

$$p_3 = \frac{a+b-c}{2}.$$

$$82. \varrho = \sqrt{\frac{p_1 p_2 p_3}{p}}.$$

$$83. \cos \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{p p_1}{bc}}; \cos \frac{\beta}{2} = \sqrt{\frac{p p_2}{ca}}; \cos \frac{\gamma}{2} = \sqrt{\frac{p p_3}{ab}}.$$

$$84. \sin \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{p_2 p_3}{bc}}; \sin \frac{\beta}{2} = \sqrt{\frac{p_3 p_1}{ca}}; \sin \frac{\gamma}{2} = \sqrt{\frac{p_1 p_2}{ab}}.$$

#### Aufgabe 4.

Ein Dreieck zu berechnen aus den drei Seiten ( $abc$ ).

Lösung:  $p = \frac{1}{2}(a+b+c)$ ;  $p_1 = p-a$ ;  $p_2 = p-b$ ;  $p_3 = p-c$ ;

$$\varrho = \sqrt{\frac{p_1 p_2 p_3}{p}}; \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{\varrho}{p_1};$$

$$\operatorname{tg} \frac{\beta}{2} = \frac{\varrho}{p_2}; \operatorname{tg} \frac{\gamma}{2} = \frac{\varrho}{p_3}.$$

Beispiel:  $a = 1532$ ;  $b = 533$ ;  $c = 1299$ .

| Numeri |      | Logarithmi |        | Nebenrechnung |
|--------|------|------------|--------|---------------|
| $a$    | 1532 | $p_1$      | 2,1761 |               |
| $b$    | 533  | $p_2$      | 3,0603 |               |

|          |         |                                      |        |
|----------|---------|--------------------------------------|--------|
| $c$      | 1299    | $p_3$                                | 2,5832 |
| $p$      | 1682    |                                      | 7,8196 |
| $p_1$    | 150     | $p$                                  | 3,2258 |
| $p_2$    | 1149    | $\varrho^2$                          | 4,5938 |
| $p_3$    | 383     | $\varrho$                            | 2,2969 |
| $\alpha$ | 105. 44 | $\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}$ | 0,1208 |
| $\beta$  | 19. 34  | $\operatorname{tg} \frac{\beta}{2}$  | 9,2366 |
| $\gamma$ | 54. 42  | $\operatorname{tg} \frac{\gamma}{2}$ | 9,7137 |

$$85. f^2 = \frac{1}{2}(ab \cdot \sin \gamma).$$

$$86. f^2 = 2r^2 \cdot \sin \alpha \sin \beta \sin \gamma.$$

$$87. f^2 = p\varrho.$$

$$88. f^2 = \frac{abc}{4r}.$$

$$89. f^2 = \sqrt{pp_1 p_2 p_3}.$$

90. Die Tangens eines halben Winkels im Dreieck ist gleich dem Quotienten aus dem Radius des der gegenüberliegenden Seite anbeschriebenen Kreises und dem halben Umfange des Dreiecks.

$$\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{\varrho_1}{p}; \operatorname{tg} \frac{\beta}{2} = \frac{\varrho_2}{p}; \operatorname{tg} \frac{\gamma}{2} = \frac{\varrho_3}{p}.$$

$$91. f^2 = p\varrho = p_1 \varrho_1 = p_2 \varrho_2 = p_3 \varrho_3.$$

$$92. \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{p_2}{\varrho_3}; \operatorname{tg} \frac{\beta}{2} = \frac{p_3}{\varrho_1}; \operatorname{tg} \frac{\gamma}{2} = \frac{p_1}{\varrho_2}.$$

$$93. \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{p_3}{\varrho_2}; \operatorname{tg} \frac{\beta}{2} = \frac{p_1}{\varrho_3}; \operatorname{tg} \frac{\gamma}{2} = \frac{p_2}{\varrho_1}.$$

|                                      |                       |                       |                         |                         |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      | 81                    | 90                    | 92                      | 93                      |
| $\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}$ | $\frac{\varrho}{p_1}$ | $\frac{\varrho_1}{p}$ | $\frac{p_2}{\varrho_3}$ | $\frac{p_3}{\varrho_2}$ |
| $\operatorname{tg} \frac{\beta}{2}$  | $\frac{\varrho}{p_2}$ | $\frac{\varrho_2}{p}$ | $\frac{p_3}{\varrho_1}$ | $\frac{p_1}{\varrho_3}$ |
| $\operatorname{tg} \frac{\gamma}{2}$ | $\frac{\varrho}{p_3}$ | $\frac{\varrho_3}{p}$ | $\frac{p_1}{\varrho_2}$ | $\frac{p_2}{\varrho_1}$ |



$$95. h_1 = \frac{2f^2}{a}; t_1 = \sqrt{\frac{1}{2}(b^2 + c^2 - \frac{a^2}{2})}.$$

$$96. m_1 = \frac{2\sqrt{pp_1 bc}}{(b+c)}.$$

## B. Die Auflösung von Gleichungen.

### I. Die Gleichung vom zweiten Grade.

Erster Fall:  $x^2 + ax = +b$ .

$$97. \operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2\sqrt{b}}{a}; x_1 = +\sqrt{b} \cdot \operatorname{tg} \alpha; x_2 = -\sqrt{b} \cdot \cot \alpha.$$

Beispiel:  $x^2 + 13x = 140$ .

| Numeri    |                                         | Logarithmi                  |        | Nebenrechnung |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------|---------------|
| $b$       | 140                                     | $b$                         | 2,1461 |               |
| $a$       | 13                                      | $\sqrt{b}$                  | 1,0730 |               |
| $2\alpha$ | 61. 13                                  | 2                           | 0,3010 |               |
| $\alpha$  | 30. 36,5                                | $2\sqrt{b}$                 | 1,3740 |               |
|           | $\cot \alpha = \operatorname{tg} \beta$ | $a$                         | 1,1139 |               |
| $\beta$   | 59. 23,5                                | $\operatorname{tg} 2\alpha$ | 0,2601 |               |
|           |                                         | $\operatorname{tg} \alpha$  | 9,7721 |               |
|           |                                         | $\operatorname{tg} \beta$   | 0,2280 |               |
| $x_1$     | + 7                                     | $x_1$                       | 0,8451 |               |
| $x_2$     | - 20                                    | $x_2$                       | 1,3010 |               |

Zweiter Fall:  $x^2 + ax = -b$ .

$$98. \sin 2\alpha = \frac{2\sqrt{b}}{a}; x_1 = -\sqrt{b} \cdot \operatorname{tg} \alpha; x_2 = -\sqrt{b} \cdot \cot \alpha.$$

Beispiel:  $x^2 - 13x = -22$ .

| Numeri    |                                         | Logarithmi                 |        | Nebenrechnung |
|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|--------|---------------|
| $b$       | 22                                      | $b$                        | 1,3424 |               |
| $a$       | - 13                                    | $-\sqrt{b}$                | 0,6712 |               |
| $2\alpha$ | 46. 11                                  | 2                          | 0,3010 |               |
| $\alpha$  | 23. 5,5                                 | $-2\sqrt{b}$               | 0,9722 |               |
|           | $\cot \alpha = \operatorname{tg} \beta$ | $-a$                       | 1,1139 |               |
| $\beta$   | 66. 54,5                                | $\sin 2\alpha$             | 9,8583 |               |
|           |                                         | $\operatorname{tg} \alpha$ | 9,6298 |               |

|       |      |                           |        |
|-------|------|---------------------------|--------|
|       |      | $\operatorname{tg} \beta$ | 0,3702 |
| $x_1$ | + 2  | $x_1$                     | 0,3010 |
| $x_2$ | + 11 | $x_2$                     | 1,0414 |

### II. Die Gleichung vom dritten Grade.

Erster Fall:  $y^3 - 3py = 2q$  ( $p^3 > q^2$ ).

$$99. \sin 3\alpha = \frac{q}{\sqrt{p^3}}; y_1 = -2\sqrt{p} \cdot \sin \alpha;$$

$$y_2 = -2\sqrt{p} \cdot \sin \left( \frac{2}{3}R - \alpha \right);$$

$$y_3 = +2\sqrt{p} \cdot \sin \left( \frac{2}{3}R + \alpha \right).$$

Beispiel:  $y^3 - 15y = 4$  ( $5^3 > 2^2$ ).

| Numeri              |          | Logarithmi                |        | Nebenrechnung |
|---------------------|----------|---------------------------|--------|---------------|
| $q$                 | 2        | $q$                       | 0,3010 |               |
| $p$                 | 5        | $p^3$                     | 2,0969 |               |
| $3\alpha$           | 10. 18,3 | $\sqrt{p^3}$              | 1,0484 |               |
| $\alpha$            | 3. 26,1  | $\sin 3\alpha$            | 9,2526 |               |
| $60^\circ - \alpha$ | 56. 33,9 | $p$                       | 0,6990 |               |
| $60^\circ + \alpha$ | 63. 26,1 | $\sqrt{p}$                | 0,3495 |               |
|                     |          | 2                         | 0,3010 |               |
|                     |          | $2\sqrt{p}$               | 0,6505 |               |
|                     |          | $\sin \alpha$             | 8,7775 |               |
|                     |          | $\sin(60^\circ - \alpha)$ | 9,9214 |               |
|                     |          | $\sin(60^\circ + \alpha)$ | 9,9515 |               |
| $y_1$               | -0,268   | $y_1$                     | 9,4280 |               |
| $y_2$               | -3,732   | $y_2$                     | 0,5719 |               |
| $y_3$               | +4       | $y_3$                     | 0,6020 |               |

Zweiter Fall:  $y^3 - 3py = 2q$  ( $p^3 < q^2$ ).

$$100. \sin 2\beta = \frac{\sqrt{p^3}}{q}; \operatorname{tg} \alpha = \sqrt[3]{\operatorname{tg} \beta};$$

$$y = \frac{2\sqrt{p}}{\sin 2\alpha}.$$

Beispiel:  $y^3 - 9y = 80$  ( $3^3 < 40^2$ ).

| Numeri |    | Logarithmi   |        | Nebenrechnung |
|--------|----|--------------|--------|---------------|
| $p$    | 3  | $p^3$        | 1,4314 |               |
| $q$    | 40 | $\sqrt{p^3}$ | 0,7157 |               |



|           |          |                |         |
|-----------|----------|----------------|---------|
| $2\beta$  | 7. 27,8  | $q$            | 1,6021  |
| $\beta$   | 3. 43,9  | $\sin 2\beta$  | 9,1136  |
| $\alpha$  | 21. 55,5 | $tg \beta$     | 28,8144 |
| $2\alpha$ | 43. 51   | $tg \alpha$    | 9,6048  |
|           |          | $p$            | 0,4771  |
|           |          | $\sqrt{p}$     | 0,2385  |
|           |          | $2$            | 0,3010  |
|           |          | $2\sqrt{p}$    | 0,5395  |
|           |          | $\sin 2\alpha$ | 9,8406  |
| $y$       | $+ 5$    | $y$            | 0,6989  |

Dritter Fall:  $y^3 + 3py = 2q$ .

$$101. \quad tg \, 2\beta = \frac{\sqrt{p^3}}{q}; \quad tg \, \alpha = \sqrt[3]{tg \, \beta};$$

$$y = \frac{2\sqrt{p}}{tg \, 2\alpha}.$$

Beispiel:  $y^3 + 15y = 448$ .

| Numeri    |          | Logarithmi      |         | Neben-<br>rechnung |
|-----------|----------|-----------------|---------|--------------------|
| $p$       | 5        | $p^3$           | 2,0969  |                    |
| $q$       | 224      | $\sqrt{p^3}$    | 1,0484  |                    |
| $2\beta$  | 2. 51,4  | $q$             | 2,3502  |                    |
| $\beta$   | 1. 25,7  | $tg \, 2\beta$  | 8,6982  |                    |
| $\alpha$  | 16. 17,2 | $tg \, \beta$   | 28,3968 |                    |
| $2\alpha$ | 32. 34,4 | $tg \, \alpha$  | 9,4656  |                    |
|           |          | $p$             | 0,6990  |                    |
|           |          | $\sqrt{p}$      | 0,3495  |                    |
|           |          | $2$             | 0,3010  |                    |
|           |          | $2\sqrt{p}$     | 0,6505  |                    |
|           |          | $tg \, 2\alpha$ | 9,8054  |                    |
| $y$       | $+ 7$    | $y$             | 0,8451  |                    |



# Anhang.

## Uebungssätze und Aufgaben.

### 1. Beliebige Winkel.

#### a) Formeln.

$\sin \alpha = 1)$   $\sqrt{1 + \cos \alpha} \cdot \sqrt{1 - \cos \alpha}$ ,  $2)$   $\cos \alpha \cdot \operatorname{tg} \alpha$ ,  $3)$   $\operatorname{tg} \alpha : \sec \alpha$ ,  $4)$   $\operatorname{tg} \alpha : \sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha}$ ,  $5)$   $\sqrt{\sec^2 \alpha - 1} : \sec \alpha$ ,  $6)$   $1 : \sqrt{1 + \cot^2 \alpha}$ ,  $7)$   $1 : (\cot \alpha/2 - \cot \alpha)$ ,  $8)$   $1 : (\operatorname{tg} \alpha/2 + \cot \alpha)$ ,  $9)$   $2 \operatorname{tg} \alpha/2 : (1 + \operatorname{tg}^2 \alpha/2)$ ,  $10)$   $2 \sin \alpha/2 \cos \alpha/2$ ,  $11)$   $2 : (\operatorname{tg} \alpha/2 + \cot \alpha/2)$ ,  $12)$   $[\sin (R/3 + \alpha) - \sin (R/3 - \alpha)] : \sqrt{3}$ ,  $13)$   $2 \sin^2 (R/2 + \alpha/2) - 1$ ,  $14)$   $1 - 2 \sin^2 (R/2 - \alpha/2)$ ,  $15)$   $[1 - \operatorname{tg}^2 (R/2 - \alpha/2)] : [1 + \operatorname{tg}^2 (R/2 - \alpha/2)]$ ,  $16)$   $\sin (2/3 R + \alpha) - \sin (2/3 R - \alpha)$ .

$\cos \alpha = 17)$   $\sqrt{1 + \sin \alpha} \cdot \sqrt{1 - \sin \alpha}$ ,  $18)$   $\sin \alpha \cdot \cot \alpha$ ,  $19)$   $\cot \alpha : \operatorname{cosec} \alpha$ ,  $20)$   $\cot \alpha : \sqrt{1 + \cot^2 \alpha}$ ,  $21)$   $1 : \sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha}$ ,  $22)$   $\sqrt{\operatorname{cosec}^2 \alpha - 1} : \operatorname{cosec} \alpha$ ,  $23)$   $\cos^2 \alpha/2 - \sin^2 \alpha/2$ ,  $24)$   $(\cot^2 \alpha/2 - 1) : (\cot^2 \alpha/2 + 1)$ ,  $25)$   $1 : (\operatorname{tg} \alpha \cot \alpha/2 - 1)$ ,  $26)$   $\sin 2\alpha : 2 \sin \alpha$ ,  $27)$   $(1 - \operatorname{tg}^2 \alpha/2) : (1 + \operatorname{tg}^2 \alpha/2)$ ,  $28)$   $(\cot \alpha/2 - \operatorname{tg} \alpha/2) : (\cot \alpha/2 + \operatorname{tg} \alpha/2)$ ,  $29)$   $1 : (1 + \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \alpha/2)$ ,  $30)$   $2 : [\operatorname{tg} (R/2 + \alpha/2) + \cot (R/2 + \alpha/2)]$ ,  $31)$   $2 \cos (R/2 + \alpha/2) \cos (R/2 - \alpha/2)$ ,  $32)$   $\cos (2/3 R + \alpha) + \cos (2/3 R - \alpha)$ ,  $33)$   $[\sin (2/3 R + \alpha) + \sin (2/3 R - \alpha)] : \sqrt{3}$ ,  $34)$   $\sin (R/3 + \alpha) + \sin (R/3 - \alpha)$ ,  $35)$   $[\cos (R/3 - \alpha) + \cos (R/3 + \alpha)] : \sqrt{3}$ .

$\operatorname{tg} \alpha = 36)$   $\sqrt{(1 : \cos^2 \alpha) - 1}$ ,  $37)$   $2 \operatorname{tg} \alpha/2 : (1 - \operatorname{tg}^2 \alpha/2)$ ,  $38)$   $2 \cot \alpha/2 : (\cot^2 \alpha/2 - 1)$ ,  $39)$   $2 : (\cot \alpha/2 - \operatorname{tg} \alpha/2)$ ,  $40)$   $\cot \alpha - 2 \cot 2\alpha$ ,  $41)$   $(1 - \cos 2\alpha) : \sin 2\alpha$ ,  $42)$   $\sin 2\alpha : (1 + \cos 2\alpha)$ ,  $43)$   $[\operatorname{tg} (R/2 + \alpha/2) - \operatorname{tg} (R/2 - \alpha/2)] : 2$ ,  $44)$   $1 : \sqrt{\operatorname{cosec}^2 \alpha - 1}$ ,  $45)$   $\sqrt{\sec^2 \alpha - 1}$ ,  $46)$   $[\operatorname{tg} (R/2 + \alpha) - 1] : [\operatorname{tg} (R/2 + \alpha) + 1]$ ,  $47)$   $[1 - \operatorname{tg} (R/2 - \alpha)] : [1 + \operatorname{tg} (R/2 - \alpha)]$ .

$\sec \alpha = 48)$   $\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha}$ ,  $49)$   $\sqrt{1 + \cot^2 \alpha} : \cot \alpha$ ,  $50)$   $\operatorname{cosec} \alpha : \sqrt{\operatorname{cosec}^2 \alpha - 1}$ .

$\operatorname{cosec} \alpha = 51)$   $\sqrt{1 + \cot^2 \alpha}$ ,  $52)$   $\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha} : \operatorname{tg} \alpha$ ,  $53)$   $\sec \alpha : \sqrt{\sec^2 \alpha - 1}$ .



54)  $\sin(R/2 \pm \alpha) = \cos(R/2 \mp \alpha) = 55) \frac{1}{2} \sqrt{2} (\cos \alpha \pm \sin \alpha)$ . —  
 56)  $\operatorname{tg}(R/2 \pm \alpha) = (1 \pm \operatorname{tg} \alpha) : (1 \mp \operatorname{tg} \alpha) = 57) (\cos \alpha \pm \sin \alpha) :$   
 $(\cos \alpha \mp \sin \alpha) = 58) \sqrt{1 \pm \sin 2\alpha} : \sqrt{1 \mp \sin 2\alpha}$ . — 59)  $\operatorname{tg}(R/2 \pm \alpha/2)$   
 $= \cos \alpha : (1 \mp \sin \alpha) = 60) \sqrt{1 \pm \sin \alpha} : \sqrt{1 \mp \sin \alpha}$ . — 61)  $\cos \alpha$   
 $\pm \sin \alpha = \sqrt{2 \sin(R/2 \pm \alpha)} = 62) \sqrt{2 \cos(R/2 \mp \alpha)}$ . — 63)  $\operatorname{tg}(R/2 + \alpha)$   
 $+ \operatorname{tg}(R/2 - \alpha) = \cot(R/2 + \alpha) + \cot(R/2 - \alpha) = 64) 2 \sec 2\alpha$ . —  
 65)  $\operatorname{tg}(R/2 + \alpha) - \operatorname{tg}(R/2 - \alpha) = \cot(R/2 - \alpha) - \cot(R/2 + \alpha) =$   
 66)  $2 \operatorname{tg} 2\alpha$ . — 67)  $\operatorname{tg}(R/2 + \alpha) \operatorname{tg}(R/2 - \alpha) = \cot(R/2 + \alpha) \cot(R/2 - \alpha)$   
 $= 1$ . — 68)  $\sin(R/2 - \alpha/2) = \cot(R/2 + \alpha/2)$ .

69)  $\operatorname{tg}^{1/2}(\beta \pm \gamma) = (\sin \beta \pm \sin \gamma) : (\cos \beta \pm \cos \gamma)$ . — 70)  
 $\operatorname{tg}^{1/2}(\gamma \mp \beta) = (\cos \beta - \cos \gamma) : (\sin \gamma \pm \sin \beta)$ . — 71)  $\operatorname{tg} \beta \pm \operatorname{tg} \gamma$   
 $= \sin(\beta \pm \gamma) : (\cos \beta \cos \gamma)$ . — 72)  $\cot \gamma \pm \cot \beta = \sin(\beta \pm \gamma) :$   
 $(\sin \beta \sin \gamma)$ . — 73)  $\operatorname{tg} \beta \pm \cot \gamma = \pm \cos(\beta \mp \gamma) : (\cos \beta \sin \gamma)$ ;  
 74)  $\sin(\beta + \gamma) + \sin(\beta - \gamma) = 2 \sin \beta \cos \gamma$ . — 75)  $\sin(\beta + \gamma) -$   
 $\sin(\beta - \gamma) = 2 \cos \beta \sin \gamma$ . — 76)  $\cos(\beta + \gamma) + \cos(\beta - \gamma) =$   
 $2 \cos \beta \cos \gamma$ . — 77)  $\cos(\beta - \gamma) - \cos(\beta + \gamma) = 2 \sin \beta \sin \gamma$ . —  
 78)  $\operatorname{tg}^{1/2}(\beta + \gamma) + \operatorname{tg}^{1/2}(\beta - \gamma) = 2 \sin \beta : (\cos \beta + \cos \gamma)$ . —  
 79)  $\cot^{1/2}(\beta + \gamma) + \cot^{1/2}(\beta - \gamma) = \pm 2 \sin \beta : (\cos \gamma - \cos \beta)$ . —  
 80)  $\sin(\beta + \gamma) \cos(\beta - \gamma) = \sin \beta \cos \beta + \sin \gamma \cos \gamma$ . — 81)  $\sin$   
 $(\beta - \gamma) \cos(\beta + \gamma) = \sin \beta \cos \beta - \sin \gamma \cos \gamma$ . — 82)  $\sin(\beta + \gamma)$   
 $\sin(\beta - \gamma) = \sin^2 \beta - \sin^2 \gamma$ . — 83)  $\cos(\beta + \gamma) \cos(\beta - \gamma) = \cos^2 \gamma$   
 $- \cos^2 \beta$ . — 84)  $(\sin \beta + \sin \gamma) \pm (\cos \beta + \cos \gamma) = 2 \cos^{1/2}(\beta - \gamma)$   
 $\sqrt{1 \pm \sin(\beta + \gamma)}$ . — 85)  $(\sin \beta - \sin \gamma) \pm (\cos \beta + \cos \gamma) = 2 \cos$   
 $^{1/2}(\beta + \gamma) \sqrt{1 \pm \sin(\beta - \gamma)}$ .

86)  $\sin 3\varphi = 3 \sin \varphi - 4 \sin^3 \varphi$ . — 87)  $\cos 3\varphi = \cos \varphi (1 -$   
 $4 \sin^2 \varphi)$ . — 88)  $\sin 4\varphi = \cos \varphi (4 \sin \varphi - 8 \sin^3 \varphi)$ . — 89)  $\cos 4\varphi$   
 $= 1 - 8 \sin^2 \varphi + 8 \sin^4 \varphi$ . — 90)  $\sin 5\varphi = 5 \sin \varphi - 20 \sin^3 \varphi$   
 $+ 16 \sin^5 \varphi$ . — 91)  $\cos 5\varphi = \cos \varphi (1 - 12 \sin^2 \varphi + 16 \sin^4 \varphi)$ . —  
 92)  $\operatorname{tg} 3\varphi = (3 \operatorname{tg} \varphi - \operatorname{tg}^3 \varphi) : (1 - 3 \operatorname{tg}^2 \varphi)$ . — 93)  $\cot 3\varphi =$   
 $(\cot \varphi - 3 \operatorname{tg} \varphi) : (3 - \operatorname{tg}^2 \varphi)$ .

94)  $\sin(x + y + z) = \sin x \cos y \cos z + \sin y \cos z \cos x +$   
 $\sin z \cos x \cos y - \sin x \sin y \sin z$ . — 95)  $\cos(x + y + z) =$   
 $\cos x \cos y \cos z - \cos x \sin y \sin z - \cos y \sin z \sin x - \cos z \sin x$   
 $\sin y$ . — 96)  $\sin x \cos(y - z) - \sin y \cos(x - z) = \cos z \sin$   
 $(x - y)$ . — 97)  $\sin^{1/2}(x + z) \cos^{1/2}(x - z) + \sin^{1/2}(y - z) \cos$   
 $^{1/2}(y + z) = \frac{1}{2} (\sin x + \sin y)$ . — 98)  $\sin^2(x - y) + \sin^2(y - z)$   
 $+ \sin^2(z - x) = 2 [1 - \cos(x - y) \cos(y - z) \cos(z - x)]$ . —  
 99)  $\cos^2(x - y) + \cos^2(y - z) + \cos^2(z - x) = 1 + 2 \cos(x - y)$   
 $\cos(y - z) \cos(z - x)$ . — 100)  $\sin(x - y) + \sin(x - z) + \sin$



$(y - z) = 4 \cos \frac{1}{2}(x - y) \sin \frac{1}{2}(x - z) \cos \frac{1}{2}(y - z)$ . — 101)  
 $\cos(x - y) + \cos(x - z) + \cos(y - z) = 4 \cos \frac{1}{2}(x - y) \cos \frac{1}{2}(x - z)$   
 $\cos \frac{1}{2}(y - z) - 1$ . — Setzt man

$x + y + z = 2u$ ;  $u - x = u_1$ ;  $u - y = u_2$ ;  $u - z = u_3$ ,  
 so ist 102)  $4 \sin x \sin y \sin z = -\sin 2u + \sin 2u_1 + \sin 2u_2 + \sin 2u_3$ . — 103)  $4 \cos x \cos y \cos z = \cos 2u + \cos 2u_1 + \cos 2u_2 + \cos 2u_3$ . — 104)  $\cos^2 u + \cos^2 u_1 + \cos^2 u_2 + \cos^2 u_3 = 2(1 + \cos x \cos y \cos z)$ . — 105)  $\sin^2 u + \sin^2 u_1 + \sin^2 u_2 + \sin^2 u_3 = 2(1 - \cos x \cos y \cos z)$ .

### b) Gleichungen.

106)  $\sin x : \operatorname{tg} x = a$ . — 107)  $\sin x : \cot x = a$ . — 108)  $\sin x + \cos x = a$ . — 109)  $\sin x - \cos x = a$ . — 110)  $\operatorname{tg} x + \cot x = a$ . — 111)  $\operatorname{tg} x - \cot x = a$ . — 112)  $\cos x : \cos \frac{x}{2} = a$ . — 113)  $\cos x : \sin \frac{x}{2} = a$ . — 114)  $\sin x : \sin 2x = a$ . — 115)  $\sin x : \operatorname{tg} 2x = a$ . — 116)  $\sin x : \operatorname{tg} \frac{x}{2} = a$ . — 117)  $\cos x + \cos 2x = \frac{7}{8}$ . — 118)  $\sin x + \sin 2x = \operatorname{tg} x$ . — 119)  $\sin x + \sin 2x + \sin 3x = 0$ . — 120)  $\sin(x + \alpha) + \cos(x - \alpha) = \cos(x + \alpha)$ . — 121)  $\sin(\alpha - x) = \cos(\alpha + x)$ . — 122)  $\operatorname{tg}(\frac{R}{2} + x) - a \operatorname{tg} x = a - 1$ . — 123)  $\cos nx + \cos(n - 2)x = \cos x$ . — 124)  $\operatorname{cosec}^2 \frac{x}{2} - \sec^2 \frac{x}{2} = 2\sqrt{3} \operatorname{cosec}^2 x$ . — 125)  $\cot x \operatorname{tg} 2x - \operatorname{tg} x \cot 2x = 2$ . — 126)  $\operatorname{tg} 3x = \sin 6x$ . — 127)  $\sin x = \operatorname{tg} x$ . — 128)  $\cos x = \operatorname{tg} x$ . — 129)  $\cos x = \sin^2 x - \cos^2 x$ . — 130)  $\frac{1}{2} \cos x = \sin^2 x - \cos^2 x$ . — 131)  $\cos^2 x - \sin^2 x + \operatorname{tg}^2 x = \frac{5}{6}$ . — 132)  $\sin \alpha + \sin(x - \alpha) + \sin(2x + \alpha) = \sin(x + \alpha) + \sin(2x - \alpha)$ . — 133)  $\operatorname{tg} x(1 + \cos 2\alpha) = \cos 2\alpha \cdot \operatorname{tg} 2x$ . — 134)  $\sin x - \cos x = 4 \cos^2 x \sin x + 4 \sin^3 x$ . — 135)  $\sin x + \sin 3x = a$ . — 136)  $\cos x + \cos 3x = a$ . — 137)  $\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} 3x = a$ .

138)  $\sin x : \sin y = a$ ;  $\cos x : \cos y = b$ . — 139)  $\sin x : \sin y = a$ ;  $\operatorname{tg} x : \operatorname{tg} y = b$ . — 140)  $\sin x + \sin y = a$ ;  $\cos x + \cos y = b$ . — 141)  $\sin(x - y) = \cos(x + y) = \frac{1}{2}$ . — 142)  $\operatorname{tg}(x + y) = a$ ;  $\operatorname{tg}(x - y) = b$ . — 143)  $\sin x = a \cdot \sin y$ ;  $2 \operatorname{tg} x = \operatorname{tg} \frac{y}{2}$ . — 144)  $\operatorname{tg} \frac{x}{2} \operatorname{tg} \frac{y}{2} + \operatorname{tg} \frac{y}{2} \operatorname{tg} \frac{z}{2} + \operatorname{tg} \frac{z}{2} \operatorname{tg} \frac{x}{2} = \operatorname{tg}^2 x$ ;  $\operatorname{tg}(x + y) = -\operatorname{tg} z$ ;  $\sin^2 x + \sin^2 y = \cos^2 y$ ;  $(x, y, z < R)$ .

## 2. Winkel im Dreieck. \*)

### a) Rechtwinkliges Dreieck ( $\alpha + \beta = R$ ).

145)  $\operatorname{tg} \alpha = (\sin \alpha + \cos \beta) : (\cos \alpha + \sin \beta)$ . — 146)  $\sin \alpha + \cos \alpha = \sin \beta + \cos \beta$ . — 147)  $\cos(\alpha - \beta) = \sin 2\alpha$ . — Ein

\*) Bezeichnungen im Dreieck:  $abc$  Seiten,  $\alpha\beta\gamma$  Winkel,  $h_1 h_2 h_3$  Höhen,  $t_1 t_2 t_3$  Mittellinien,  $m_1 m_2 m_3$  Winkelhalbierende,  $r$  Radius des Um-



Dreieck mit den Winkeln  $\alpha, \beta, \gamma$  ist rechtwinklig, wenn 148)  $\sin \gamma = (\sin \alpha + \sin \beta) : (\cos \alpha + \cos \beta)$ , 149)  $\cot \gamma/2 - \cot \beta/2 = \cot \beta/2 - \cot \alpha/2 = 1$  (wie verhalten sich die Seiten dieses Dreiecks zu einander?), 150)  $\sin \alpha - \cos \beta = \cos \gamma$ , 151)  $\sin \alpha : \cos \beta = \sin \gamma + \cos \gamma \cot \alpha$ , 152)  $2 \sin \alpha \sin \beta = \sin 2\alpha \sin \gamma - \cos \gamma$ .

**b) Schiefwinkliges Dreieck ( $\alpha + \beta + \gamma = 2R$ ).**

153)  $\sin \alpha + \sin \beta + \sin \gamma = 4 \cos \alpha/2 \cos \beta/2 \cos \gamma/2$ . — 154)  $\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma = 1 + 4 \sin \alpha/2 \sin \beta/2 \sin \gamma/2$ . — 155)  $\sin 2\alpha + \sin 2\beta + \sin 2\gamma = 4 \sin \alpha \sin \beta \sin \gamma$ . — 156)  $\cos 2\alpha + \cos 2\beta + \cos 2\gamma = -1 - 4 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma$ . — 157)  $\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta + \operatorname{tg} \gamma = \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta \cdot \operatorname{tg} \gamma$  (Beispiel:  $\operatorname{tg} \alpha = 1, \operatorname{tg} \beta = 2, \operatorname{tg} \gamma = 3$ ). — 158)  $\cot \alpha/2 + \cot \beta/2 + \cot \gamma/2 = \cot \alpha/2 \cot \beta/2 \cot \gamma/2$ . — 159)  $\cos^2 \alpha/2 + \cos^2 \beta/2 + \cos^2 \gamma/2 = 2 + 2 \sin \alpha/2 \sin \beta/2 \sin \gamma/2$ . — 160)  $\sin^2 \alpha/2 + \sin^2 \beta/2 + \sin^2 \gamma/2 = 1 - 2 \sin \alpha/2 \sin \beta/2 \sin \gamma/2$ . — 161)  $\operatorname{tg} \alpha/2 \operatorname{tg} \beta/2 + \operatorname{tg} \beta/2 \operatorname{tg} \gamma/2 + \operatorname{tg} \gamma/2 \operatorname{tg} \alpha/2 = 1$ . — 162)  $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1 - 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma$ . — 163)  $\sin \alpha : \sin \beta = (\cot \beta/2 + \cot \gamma/2) : (\cot \alpha/2 + \cot \gamma/2)$ . — 164)  $\cot \alpha + \cot \beta + \cot \gamma = \cot \alpha \cot \beta \cot \gamma - \operatorname{cosec} \alpha \operatorname{cosec} \beta \operatorname{cosec} \gamma$ . — 165)  $\sin \alpha + \sin \beta - \sin \gamma = 4 \sin \alpha/2 \sin \beta/2 \cos \gamma/2$ . — 166)  $\sin 2\alpha + \sin 2\beta - \sin 2\gamma = 4 \cos \alpha \cos \beta \sin \gamma$ . — 167)  $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta - \sin^2 \gamma = 2 \sin \alpha \sin \beta \cos \gamma$ .

**3. Formeln zwischen den Stücken des Dreiecks.**

**a) Rechtwinkliges Dreieck.**

168)  $2 \cot \beta : \sin 2\alpha = c^2 : b^2$ . — 169)  $\operatorname{tg} 2\alpha - \sec 2\beta = (b + a) : (b - a)$ . — 170)  $a : (c - b) = (1 + \cos \alpha) : \sin \alpha$ . — 171)  $(a + b) : c = \cos 2\alpha : (\cos \alpha - \sin \alpha)$ . — 172)  $(a + b + c)^2 : c^2 = \sin 2\alpha + 2 \sin \alpha + 4 \cos^2 \alpha/2$ . — 173)  $\sin 2\alpha = 2ab : c^2$ . — 174)  $a^2 : bc = (1 - \cos^2 \alpha) : \cos \alpha$ .

**b) Schiefwinkliges Dreieck.**

175)  $(a + b) : c = \cos \frac{1}{2}(\alpha - \beta) : \sin \gamma/2$ . — 176)  $(a - b) : c = \sin \frac{1}{2}(\alpha - \beta) : \cos \gamma/2$ . — 177)  $(b + c)^2 = a^2 + 4f^2 \cot \alpha/2$ . — 178)  $(b - c)^2 = a^2 - 4f^2 \operatorname{tg} \alpha/2$ . — 179)  $prq = abc$ . — 180)  $q = a \cdot \sin \beta/2 \sin \gamma/2 : \cos \alpha/2$ . — 181)  $h_1 = a \sin \beta \sin \gamma : \sin \alpha$ . — 182)  $q = a : (\cot \beta/2 + \cot \gamma/2)$ . — 183)  $q = 4r \cdot \sin \alpha/2 \sin \beta/2 \sin \gamma/2$ .

kreises,  $\rho$  Radius des Inkreises,  $\rho_1 \rho_2 \rho_3$  Radien der Ankreise,  $2p = a + b + c$ ,  $2p_1 = -a + b + c$ ,  $2p_2 = a - b + c$ ,  $2p_3 = a + b - c$ ,  $f^2$  Fläche. Im rechtwinkligen D. ist  $\gamma = R$ , im gleichschenkligen  $b = c$ .



- 184)  $\varrho_1 = a : (\operatorname{tg} \beta/2 + \operatorname{tg} \gamma/2)$ . — 185)  $\varrho_2 + \varrho_3 = a \cot \alpha/2$ . —  
 186)  $\varrho_1 + \varrho_2 + \varrho_3 = 4r + \varrho$ . — 187)  $h_1 = 2r \sin \beta \sin \gamma$ . — 188)  
 $\varrho_1 = 4r \sin \alpha/2 \cos \beta/2 \cos \gamma/2$ . — 189)  $\varrho + \varrho_1 = 4r \sin \alpha/2 \cos$   
 $1/2 (\beta - \gamma)$ . — 190)  $\varrho_1 + \varrho_2 = 4r \cos^2 \gamma/2$ . — 191)  $\varrho_1 - \varrho =$   
 $4r \sin^2 \alpha/2$ . — 192)  $\varrho_1 - \varrho_2 = 4r \cos \gamma/2 \sin 1/2 (\alpha - \beta)$ . — 193)  
 $(\varrho_1 - \varrho) : (\varrho_2 + \varrho_3) = \operatorname{tg}^2 \alpha/2$ . — 194)  $(\varrho + \varrho_1) : (\varrho_2 - \varrho_3) = \operatorname{tg} \alpha/2$   
 $\cot 1/2 (\beta - \gamma)$ . — 195)  $\varrho_1 + \varrho_2 + \varrho_3 - 3\varrho = 4r (\sin^2 \alpha/2 + \sin^2 \beta/2$   
 $+ \sin^2 \gamma/2)$ . — 196)  $\varrho_1 + \varrho_2 + \varrho_3 = 2r (\cos^2 \alpha/2 + \cos^2 \beta/2 + \cos^2 \gamma/2)$ . —  
 197)  $\varrho_1 + \varrho_2 + \varrho_3 + 3\varrho = 4r (\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma)$ . — 198)  $r + \varrho$   
 $= r (\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma)$ . — 199)  $\varrho_1 + \varrho_2 + \varrho_3 - 3r = r (\cos \alpha$   
 $+ \cos \beta + \cos \gamma)$ . — 200)  $f^2 = 4r\varrho \cos \alpha/2 \cos \beta/2 \cos \gamma/2$ . — 201)  
 $4pp_3 = \cot \alpha/2 \cot \beta/2$ . — 202)  $h_1 h_2 h_3 c = a^2 b^2 \sin^3 \gamma$ . — 203)  
 $bc : a^2 = (\cos \beta \cdot \cos \gamma + \cos \alpha) : \sin^2 \alpha$ . — 204)  $(a^2 - b^2) : c =$   
 $a \cos \beta - b \cos \alpha$ . — 205)  $a^2 + b^2 + c^2 = 2(bc \cos \alpha + ca \cos \beta$   
 $+ ab \cos \gamma)$ . — 206)  $p_1 = p \operatorname{tg} \beta/2 \operatorname{tg} \gamma/2$ . — 207)  $\varrho = p \operatorname{tg} \alpha/2$   
 $\operatorname{tg} \beta/2 \operatorname{tg} \gamma/2$ .

#### 4. Berechnung von Dreiecken.

##### a) Rechtwinklige Dreiecke.

- Gegeben: 208)  $\alpha, b + c$ . — 209)  $\alpha, c - b$ . — 210)  $\alpha, a + b$ . —  
 211)  $\alpha, a - b$ . — 212)  $\alpha, p_3$ . — 213)  $\alpha, p_1$ . — 214)  $c, a + b$ . —  
 215)  $c, a - b$ . — 216)  $a : b, h_3$ . — 217)  $a : b, h_1$ . — 218)  $a : b, f^2$ . —  
 219)  $a, \alpha - \beta$ . — 220)  $\alpha, p$ . — 221)  $t_1, t_2$ . — 222)  $r, \alpha$ . —  
 223)  $\varrho, a$ . — 224)  $t_1, r$ . — 225)  $\varrho_1, a$ . — 226)  $\varrho_1, \varrho_2$ . — 227)  
 $t_1, c$ . — 228)  $\varrho, \varrho_1$ .

##### b) Gleichschenklige Dreiecke.

- Gegeben: 229)  $h_1, h_2$ . — 230)  $\alpha, h_1 + h_2$ . — 231)  $\alpha, h_1 - h_2$ . —  
 232)  $b + h_1, \alpha$ . — 233)  $\alpha, h_2$ . — 234)  $p, h_1$ . — 235)  $a : b, h_1$ .

##### c) Schiefwinklige Dreiecke. \*)

- Gegeben: 236)  $b + c, b - c, \alpha$ . — 237)  $b + c, b - c, a$ . —  
 238)  $p, a - b, b - c$ . — 239)  $a + b, b + c, a - b$ . — 240)  $a,$   
 $\alpha - \beta, \gamma$ . — 241)  $b, \alpha - \beta, \gamma$ . — 242)  $a + b, a : b, \gamma$ . — 243)  $\alpha, b + c,$   
 $b^2 + c^2$ .

\*) Andeutungen zur Lösung: 236—243: Durch algebraische Operationen auf eine der vier Hauptaufgaben zurückzuführen — 244—272: Mittelnst rechtwinkliger Dreiecke zu lösen. — 273—285: Satz 79. — 286—289: Satz 80. — 290—311: Satz 81—84. — 312—321: Zum Theil durch Satz 78. — 322—346: 95, erste Formel. — 347—362: Formeln 90—93. — 363—379: 95, zweite Formel; 78. — 380—390: Formel 96.



244)  $h_1, b, c$ . — 245)  $h_1, b, \beta$ . — 246)  $h_1, \alpha, \beta$ . — 247)  $h_1, a, b$ . — 248)  $h_1, a, \beta$ . — 249)  $h_1, b, \alpha$ . — 250)  $f^2, a, b$ . — 251)  $h_1, h_2, a$ . — 252)  $h_1, h_2, \gamma$ . — 253)  $b+c, h_1, \beta$ . — 254)  $b+c, h_2, \alpha$ . — 255)  $b-c, h_1, \beta$ . — 256)  $b-c, h_1, \gamma$ . — 257)  $b-c, h_2, \alpha$ . — 258)  $b+c, h_2, f^2$ . — 259)  $b-c, h_2, f^2$ . — 260)  $h_1, t_1, a$ . — 261)  $h_1, t_1, b$ . — 262)  $h_1, t_1, \beta$ . — 263)  $h_1, m_1, \alpha$ . — 264)  $h_1, m_1, c$ . — 265)  $a, \beta, \varrho$ . — 266)  $a, h_1, b:c$ . — 267)  $h, b:c, \alpha$ . — 268)  $f^2, \alpha, h_2:h_3$ . — 269)  $a, \alpha, h_2+h_3$ . — 270)  $h_1, h_2, c$ . — 271)  $h_1, h_2, \alpha$ . — 272)  $a+b, h_1+h_2, c$ .

273)  $a, b+c, \alpha$ . — 274)  $a, b-c, \alpha$ . — 275)  $r, b+c, \beta-\gamma$ . — 276)  $r, a, b$ . — 277)  $r, a, \beta$ . — 278)  $r, \alpha, \beta$ . — 279)  $h_1, r, b$ . — 280)  $b+c, r, \beta$ . — 281)  $b-c, r, \beta$ . — 282)  $b-c, r, \gamma$ . — 283)  $b+c, r, \alpha$ . — 284)  $b+c, r, a$ . — 285)  $b-c, r, a$ .

286)  $b+c, \beta, \gamma$ . — 287)  $a, b:c, \alpha$ . — 288)  $b+c, \alpha, h_3-h_2$ . — 289)  $b-c, \alpha, h_3+h_2$ .

290)  $a, b+c, \beta$ . — 291)  $a, b-c, \gamma$ . — 292)  $a, \alpha, f^2$ . — 293)  $a, b+c, f^2$ . — 294)  $p, \alpha, f^2$ . — 295)  $p, \alpha, \beta$ . — 296)  $a, \alpha, \varrho$ . — 297)  $a, b-c, \varrho$ . — 298)  $a, b+c, h_1$ . — 299)  $a, b-c, h_1$ . — 300)  $\varrho, \alpha, \beta$ . — 301)  $\varrho, b+c, a$ . — 302)  $\varrho, b+c, \alpha$ . — 303)  $\varrho, h_1, \alpha$ . — 304)  $a, \varrho, f^2$ . — 305)  $\varrho, b-c, \beta$ . — 306)  $p, \varrho, \alpha$ . — 307)  $r, \varrho, a$ . — 308)  $r, \varrho, \alpha$ . — 309)  $h_1, \varrho, f^2$ . — 310)  $h_1, p, f^2$ . — 311)  $p, r, \alpha$ .

312)  $p_3, \alpha, \beta$ . — 313)  $a, b, \alpha-\beta$ . — 314)  $a:b, c, \alpha$ . — 315)  $a:b, c, \gamma$ . — 316)  $a:b, c, r$ . — 317)  $b+c, a+c, \alpha$ . — 318)  $b+c, a+c, \gamma$ . — 319)  $p, a-b, \alpha$ . — 320)  $p, a-b, \gamma$ . — 321)  $p, a-b, \beta$ .

322)  $f^2, r, a$ . — 323)  $f^2, r, \alpha$ . — 324)  $f^2, b+c, \alpha$ . — 325)  $f^2, b-c, \alpha$ .

326)  $h_1, p, \alpha$ . — 327)  $h_1, b+c, \alpha$ . — 328)  $h_1, a+b, c$ . — 329)  $h_1, a+b, \beta$ . — 330)  $h_1, b-c, \alpha$ . — 331)  $h_1, a-b, c$ . — 332)  $h_1, p, \beta$ . — 333)  $h_1, p, \alpha$ . — 334)  $h_1, r, \alpha$ . — 335)  $h_1, \varrho, \alpha$ . — 336)  $h_1, \varrho, b$ . — 337)  $h_1, \varrho, \beta$ . — 338)  $a+b, h_1, h_2$ . — 339)  $a-b, h_1, h_2$ . — 340)  $h_1, h_2, h_3$ . — 341)  $h_1, b+c, r$ . — 342)  $h_1, b-c, r$ . — 343)  $h_1, a, \alpha$ . — 344)  $h_2, b+c, \alpha$ . — 345)  $h_1, b-c, \beta-\gamma$ . — 346)  $h_1, b+c, \beta-\gamma$ .

347)  $\varrho, a, b$  (Gl. 3. Grades). — 348)  $\varrho_1, a, \beta$ . — 349)  $\varrho_1, b, \alpha$ . — 350)  $\varrho_1, b, \gamma$ . — 351)  $\varrho_1, \alpha, \beta$ . — 352)  $\varrho_1, a, \alpha$ . — 353)  $\varrho_1, b, \beta$ . — 354)  $\varrho, \varrho_1, a$ . — 355)  $\varrho, \varrho_1, b$ . — 356)  $\varrho_1, \varrho_2, a$ . — 357)  $\varrho_1, \varrho_2, c$ . — 358)  $\varrho_1, a, b$ . — 359)  $\varrho_1, b, c$ . — 360)  $\varrho, \varrho_1, \varrho_2$ . — 361)  $\varrho_1, \varrho_2, \varrho_3$ . — 362)  $p, p_1, \varrho_2$ .

363)  $t_1, \alpha, r$ . — 364)  $t_1, a, \alpha$ . — 365)  $t_1, \alpha, \beta$ . — 366)  $b, c, \angle(t_1 a)$ . — 367)  $t_1, \alpha, \angle(t_1 a)$ . — 368)  $t_1, a, b$ . — 369)  $t_1, a, \beta$ . —



370)  $t_1, b, c$ . — 371)  $t_1, a:b, c$ . — 372)  $t_1, t_2, a$ . — 373)  $t_1, t_2, c$ . —  
 374)  $t_1, a, b+c$ . — 375)  $t_1, a, b-c$ . — 376)  $t_1, t_2, \alpha$ . — 377)  $t_1,$   
 $t_2, \gamma$ . — 378)  $t_1, t_2, t_3$ . — 379)  $t_1, h_1, \alpha$ .

380)  $m_1, b, c$ . — 381)  $m_1, b, \alpha$ . —  $m_1, b, \gamma$ . — 382)  $m_1, \alpha, \beta$ . —  
 383)  $m_1, a, b$ . — 384)  $m_1, a, \alpha$ . — 385)  $a:m_1, \varrho, \varrho_1$ . — 386)  $a:m_1,$   
 $\varrho, h_1$ . — 387)  $m_1, r, a:(b+c)$ . — 388)  $m_1, a, h_1$ . — 389)  $m_1,$   
 $b+c, \alpha$ . — 390)  $m_1, b+c, a$ .

391)  $\alpha, a_1, a_2$  (Projectionen von  $b$  und  $c$  auf  $a$ ). — 392)  
 $\alpha, n_2, n_3$  (Halbirungslinien von  $\beta$  und  $\gamma$  bis zu ihrem Schnittpunkte). — 393)  $a, r_2, r_3$  (Mittelsenkrechten auf  $b$  und  $c$  bis zu ihrem Schnittpunkte). — 394)  $r_1, r_2, r_3$  (Gl. 3. Grades). —  
 395)  $b-c, \beta, r_3$ .

### 5. Vermischte Sätze und Aufgaben.

396) Sind  $d_1$  und  $d_2$  die Diagonalen,  $f^2$  die Fläche eines Vierecks, so ist  $f^2 = \frac{1}{2}d_1d_2 \sin(d_1d_2)$ . — 397) Ist im rechtwinkligen Dreieck  $ABC$  die Strecke  $BB_1$  so gezogen, dass  $ABB_1 = R/3$  ist, so ist  $BA \cdot BB_1 = 2BC \cdot AB_1$ . — 399) Ist die Basis eines gleichschenkligen Dreiecks in drei gleiche Theile getheilt, jeder Theilpunkt mit der Spitze verbunden, und  $x$  der Winkel zwischen einem Schenkel und der benachbarten Verbindungslinie, so ist  $\cot x = (2 + \cos \alpha) : \sin \alpha$ . —  
 399) Sind  $abcd$  der Reihe nach die Seiten eines Sehnenvierecks, so ist  $\cos(ad) = (a^2 + d^2 - b^2 - c^2) : (2ad + 2bc)$  (Cosinussatz für das Sehnenviereck). — Ist ferner  $a + b + c + d = 2p$ ,  $p - a = p_1$ ,  $p - b = p_2$ ,  $p - c = p_3$ ,  $p - d = p_4$ , so ist 400)  $\cos^2 \frac{1}{2}(ad) = p_2p_3 : (ad + bc)$ , 401)  $\sin^2 \frac{1}{2}(ad) = \frac{p_1p_4}{ad + bc}$ ,

402)  $\sin(ad) = 2\sqrt{p_1p_2p_3p_4} : (ad + bc)$ , 403)  $f^2 = \sqrt{p_1p_2p_3p_4}$ . —  
 404) Ist  $e$  diejenige Diagonale, welche mit  $a$  und  $b$  ein Dreieck bildet, so ist  $e^2 = (ad + bc) \cdot (ac + bd) : (ab + cd)$ . — 405) Ist endlich  $r$  der Radius des Umkreises, so ist  $16r^2 = (ab + cd)(ac + bd)(ad + bc) : p_1p_2p_3p_4$ .

406) In welchem Verhältniss stehen die Umfänge des regelmässigen Achtecks und Fünfecks bei gleicher Fläche? —  
 407) Dgl. die Flächen derselben Polygone bei gleichem Umfang? — 408) In welchem Verhältniss stehen die Umfänge des regelmässigen Sechsecks und Fünfecks, wenn der Umkreis des ersteren die doppelte Fläche hat vom Inkreise des letzteren? — 409) In ein regelmässiges Zehneck und um ein regelmässiges Siebzehneck sind Kreise beschrieben. Wie verhalten



sich deren Umfänge, wenn beide Polygone flächengleich sind? — 410) Wie gross ist die Seite eines regelmässigen Zwanzigecks, dessen Fläche diejenige eines regelmässigen Zwölfecks von gleichem Umfang um eine gegebene Grösse übertrifft? — 411) Die Seite des regelmässigen Fünfecks aus der Breite des Ringes zu berechnen, der von seinem Umkreise und Inkreise gebildet wird. — 412) Den wievielten Theil des Radius des Umkreises beträgt die Differenz zwischen der Seite des regelmässigen Siebenecks und der halben Seite des regelmässigen Dreiecks? — 413) Aus der Fläche eines Segments und dem zugehörigen Centriwinkel Sehne und Bogen des Segmentes zu berechnen. — 414) Seiten und Fläche eines Sehnenvierecks zu berechnen, wenn der Radius des Kreises und die Verhältnisse der zu den Seiten gehörigen Bogen gegeben sind. — 415) Aus den Centriwinkeln der gemeinsamen Sehne zweier sich schneidender Kreislinien und dem Radius der einen den Radius der andern zu berechnen. — 416) Seite und Fläche eines einem gegebenen Kreise eingeschriebenen, 417) umschriebenen  $n$ -Ecks zu berechnen. — 418) Den zwischen zwei parallelen Sehnen liegenden Theil der Kreisfläche zu berechnen, wenn der Radius des Kreises, und die Abstände der Sehnen vom Mittelpunkte gegeben sind. — 419) Drei Kreise mit gegebenen Radien berühren sich von aussen. Man berechne die Winkel des Dreiecks ihrer Centrallinien.

Ein gleichschenkliges Trapez\*) zu berechnen aus 420)  $a, b, \beta$ . — 421)  $a, f^2, \beta$ .

Ein Trapez zu berechnen aus 422)  $f^2, b, c, \gamma$ . — 423)  $a_1, b, c, \beta + \gamma$ . — 424)  $f^2, b, c, \beta + \gamma$ .

Vermessungsaufgaben. 425) Die Höhe eines senkrechten Gegenstandes aus der Länge seines Schattens und der Sonnenhöhe zu berechnen. — 426) Den Radius eines Kreises aus dem Gesichtswinkel, unter welchem derselbe von einem in derselben Ebene ausserhalb liegenden Punkte erscheint, und aus dem Abstände dieses Punktes vom Mittelpunkte zu berechnen. — 427) Wie weit kann man von einem Punkte aus sehen, dessen Höhe über der Oberfläche der Erdkugel gegeben ist? — 428) Die Höhe  $XY$  eines senkrechten Gegenstandes aus der Entfernung zweier, mit seinem Fusspunkte  $Y$  in gerader Linie liegenden Punkte  $A, B$  der Ebene, und den Winkeln

---

\*) Bezeichnungen im Trapez:  $aa_1$  parallele,  $bc$  nicht parallele Seiten,  $\angle(ab) = \gamma$ ,  $\angle(ac) = \beta$ ,  $f^2$  Fläche.



$XAY$  und  $XY$  zu berechnen. \*) — 429) Die Entfernung eines Punktes  $X$  von einer gegebenen Strecke  $AB$  und von ihren Endpunkten aus der Länge dieser Strecke, und den Winkeln  $XAB$  und  $XBA$  zu berechnen. — 430) Dgl. die Entfernung zweier Punkte  $X$  und  $Y$  aus der Länge einer geg. Strecke  $AB$ , und den Winkeln  $XAB$ ,  $XBA$ ,  $YAB$ ,  $YBA$ . — 431) Dgl. die Entfernung eines Punktes  $A$  von den Ecken eines geg. Dreiecks  $\overline{XYZ}$  aus den Winkeln  $XAY$  und  $YAZ$  (Pothénot'sche Aufgabe).

## Rationale Dreiecke.

*Vorbemerkung.* — Ein Dreieck heisst rational, wenn die Masszahlen seiner Seiten und die Funktionen seiner Winkel rational sind. Dann folgt aus 85, dass auch seine Fläche, aus 91, dass die Radien seiner Berührungskreise, aus 95, dass seine Höhen, aus 79, dass der Radius seines Umkreises rationale Masszahlen haben. — Da die Seiten eines Dreiecks sich durch die Grössen  $p, p_1, p_2, p_3$  und alle Funktionen seiner Winkel durch  $\operatorname{tg} \alpha/2, \operatorname{tg} \beta/2, \operatorname{tg} \gamma/2$  rational ausdrücken lassen, letztere aber wieder (nach 81) durch  $q$  und  $p_1, p_2, p_3$ , so kommt es schliesslich, um rationale Dreiecke zu erhalten, nur darauf an,  $q$  und die drei Grössen  $p$ , oder vielmehr, da zwischen diesen noch die Gleichung 82 besteht,  $q$  und zwei der Grössen  $p$  rational zu wählen.

*Methoden zur Aufstellung rationaler Dreiecke.* — a) Das rechtwinklige Dreieck. — Da die Winkelfunktionen des rechtwinkligen Dreiecks seinen Seitenverhältnissen gleich sind, so genügt es zur Rationalität des Dreiecks, wenn seine Seiten rational sind. Eine Methode zur Aufstellung solcher Dreiecke ist bereits in Th. II, S. 148, Fussnote, mitgetheilt. Danach hat man in den Ausdrücken

$$a = p^2 - q^2; \quad b = 2pq; \quad c = p^2 + q^2$$

für  $p$  und  $q$  zwei beliebige (aber keinen gemeinsamen Factor enthaltende) Zahlen zu setzen, von denen eine gerade, die andere ungerade sein muss. (Andernfalls würde man für  $a, b, c$  Werthe erhalten, die einen gemeinsamen Factor hätten, die

---

\*) Die durch  $X, Y, Z$  bezeichneten Punkte in dieser und den folgenden Aufgaben kann man sich als unzugänglich, die durch  $A, B, C \dots$  bezeichneten als zugänglich vorstellen.



man also einfacher durch Multiplication andrer Werthe von  $a, b, c$  mit diesem Factor erhalten würde.)

b) Das schiefwinklige Dreieck. — Ersetzt man in der Formel 82

$$q^2 = \frac{p_1 p_2 p_3}{p}$$

$p$  durch seinen Werth  $p_1 + p_2 + p_3$  [Th. II, Nr. 99, Formel 3)] und bestimmt  $p_1$ , so folgt:

$$1) \quad p_1 = \frac{q^2(p_2 + p_3)}{p_2 p_3 - q^2}.$$

Setzt man hierin für  $q, p_2, p_3$  beliebige ganze Zahlen, so erhält man  $p_1$  als Bruch, und wenn man  $q, p_1, p_2, p_3$  mit dem Nenner dieses Bruches multiplicirt, als ganze Zahl. Dann ist weiter [Th. II, Nr. 99, Formel 1)]:

$$2) \quad a = p_2 + p_3, \quad b = p_3 + p_1; \quad c = p_1 + p_2.$$

Ferner (81), (87)

$$3) \quad \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{q}{p_1}; \quad \operatorname{tg} \frac{\beta}{2} = \frac{q}{p_2}; \quad \operatorname{tg} \frac{\gamma}{2} = \frac{q}{p_3}.$$

$$4) \quad p = p_1 + p_2 + p_3; \quad f^2 = p q.$$

Um durch  $a, b, c, f^2$  (diese Stücke enthalten die folgenden Tafeln) alle andern oben genannten Stücke des Dreiecks zu bestimmen, dienen die Formeln:

$$5) \quad q = \frac{f^2}{p}; \quad q_1 = \frac{f^2}{p_1}; \quad q_2 = \frac{f^2}{p_2}; \quad q_3 = \frac{f^2}{p_3}. \quad (91)$$

$$6) \quad h_1 = \frac{2f^2}{a}; \quad h_2 = \frac{2f^2}{b}; \quad h_3 = \frac{2f^2}{c}. \quad (95)$$

$$7) \quad r = \frac{abc}{4f^2} \quad (88)$$

Die im Allgemeinen irrationalen Stücke  $t$  und  $m$  werden durch 95 und 96 bestimmt, nämlich:

$$8) \quad t_1 = \sqrt{\frac{1}{2}(b^2 + c^2 - \frac{1}{2}a^2)}.$$

$$9) \quad m_1 = \frac{2\sqrt{pp_1bc}}{b + c}.$$

Hieraus erhält man  $t_2, t_3, m_2, m_3$  durch die bekannten Vertauschungen.

Anm. Mittelst der Formeln 5) bis 9) lassen sich aus den folgenden Tafeln leicht Zahlenwerthe bestimmen, welche für die Aufgaben des vorigen Abschnittes Beispiele zu liefern geeignet sind. — Das unter b) beschriebene Verfahren ist von H. Grassmann in Grunert's Archiv Bd. 49 (1868) mitgetheilt.



## I. Tafel rechtwinkliger Dreiecke.

| No. | $a$ | $b$ | $c$ | $\alpha$     | $\beta$       | $F$   |
|-----|-----|-----|-----|--------------|---------------|-------|
| 1   | 4   | 3   | 5   | 53° 7' 48,4" | 36° 52' 11,6" | 6     |
| 2   | 12  | 5   | 13  | 67. 22. 48,5 | 22. 37. 11,5  | 30    |
| 3   | 8   | 15  | 17  | 28. 4. 20,9  | 61. 55. 39,1  | 60    |
| 4   | 24  | 7   | 25  | 73. 44. 23,3 | 16. 15. 36,7  | 84    |
| 5   | 20  | 21  | 29  | 43. 36. 10,1 | 46. 23. 49,9  | 210   |
| 6   | 40  | 9   | 41  | 77. 19. 10,6 | 12. 40. 49,4  | 180   |
| 7   | 12  | 35  | 37  | 18. 55. 28,7 | 71. 4. 31,3   | 210   |
| 8   | 60  | 11  | 61  | 79. 36. 40,0 | 10. 23. 20,0  | 330   |
| 9   | 28  | 45  | 53  | 31. 53. 26,8 | 58. 6. 33,2   | 630   |
| 10  | 56  | 33  | 65  | 59. 29. 23,2 | 30. 30. 36,8  | 924   |
| 11  | 84  | 13  | 85  | 81. 12. 9,3  | 8. 47. 50,7   | 546   |
| 12  | 16  | 63  | 65  | 14. 15. 0,1  | 75. 44. 59,9  | 504   |
| 13  | 48  | 55  | 73  | 41. 6. 43,5  | 48. 53. 16,5  | 1320  |
| 14  | 80  | 39  | 89  | 64. 0. 38,8  | 25. 59. 21,2  | 1560  |
| 15  | 112 | 15  | 113 | 82. 22. 18,7 | 7. 37. 41,3   | 840   |
| 16  | 36  | 77  | 85  | 25. 3. 27,4  | 64. 56. 32,6  | 1386  |
| 17  | 72  | 65  | 97  | 47. 55. 29,9 | 42. 4. 30,1   | 2340  |
| 18  | 144 | 17  | 145 | 83. 16. 1,5  | 6. 43. 58,5   | 1224  |
| 19  | 20  | 99  | 101 | 11. 25. 16,3 | 78. 34. 43,7  | 990   |
| 20  | 60  | 91  | 109 | 33. 23. 54,6 | 56. 36. 5,4   | 2730  |
| 21  | 140 | 51  | 149 | 69. 59. 2,5  | 20. 0. 57,5   | 3570  |
| 22  | 180 | 19  | 181 | 83. 58. 27,9 | 6. 1. 32,1    | 1710  |
| 23  | 44  | 117 | 125 | 20. 36. 34,9 | 69. 23. 25,1  | 2574  |
| 24  | 88  | 105 | 137 | 39. 57. 58,4 | 50. 2. 1,6    | 4620  |
| 25  | 132 | 85  | 157 | 57. 13. 15,3 | 32. 46. 44,7  | 5610  |
| 26  | 176 | 57  | 185 | 72. 3. 17,1  | 17. 56. 42,9  | 5016  |
| 27  | 220 | 21  | 221 | 84. 32. 50,5 | 5. 27. 9,5    | 2310  |
| 28  | 24  | 143 | 145 | 9. 31. 38,2  | 80. 28. 21,8  | 1716  |
| 29  | 120 | 119 | 169 | 45. 14. 23,0 | 44. 45. 37,0  | 7140  |
| 30  | 168 | 95  | 193 | 60. 30. 46,4 | 29. 29. 13,6  | 7980  |
| 31  | 264 | 23  | 265 | 85. 1. 15,3  | 4. 58. 44,7   | 3036  |
| 32  | 52  | 165 | 173 | 17. 29. 32,4 | 72. 30. 27,6  | 4290  |
| 33  | 104 | 153 | 185 | 34. 12. 19,6 | 55. 47. 40,4  | 7956  |
| 34  | 156 | 133 | 205 | 49. 33. 1,0  | 40. 26. 59,0  | 10374 |
| 35  | 208 | 105 | 233 | 63. 12. 54,0 | 26. 47. 6,0   | 10920 |
| 36  | 260 | 69  | 269 | 75. 8. 13,8  | 14. 51. 46,2  | 8970  |
| 37  | 312 | 25  | 313 | 85. 25. 7,6  | 4. 34. 52,4   | 3900  |
| 38  | 28  | 195 | 197 | 8. 10. 16,4  | 81. 49. 43,6  | 2730  |
| 39  | 84  | 187 | 205 | 24. 11. 22,3 | 65. 48. 37,7  | 7854  |
| 40  | 140 | 171 | 221 | 39. 18. 27,5 | 50. 41. 32,5  | 11970 |
| 41  | 252 | 115 | 227 | 65. 28. 13,6 | 24. 31. 46,4  | 14490 |
| 42  | 308 | 75  | 317 | 76. 18. 52,0 | 13. 41. 8,0   | 11550 |
| 43  | 364 | 27  | 365 | 85. 45. 28,1 | 4. 14. 31,9   | 4914  |
| 44  | 60  | 221 | 229 | 15. 11. 21,4 | 74. 48. 38,6  | 6630  |
| 45  | 120 | 209 | 241 | 29. 51. 46,0 | 60. 8. 14,0   | 12540 |
| 46  | 240 | 161 | 289 | 56. 8. 41,9  | 33. 51. 18,1  | 19320 |



| No. | $a$ | $b$ | $c$ | $\alpha$                   | $\beta$       | $F$   |
|-----|-----|-----|-----|----------------------------|---------------|-------|
| 47  | 420 | 29  | 421 | 86 <sup>0</sup> . 3'. 0,4" | 30.56'. 59,6" | 6090  |
| 48  | 32  | 255 | 257 | 7. 9. 9,6                  | 82. 50. 50,4  | 4080  |
| 49  | 96  | 247 | 265 | 21. 14. 21,5               | 68. 45. 38,5  | 11856 |
| 50  | 160 | 231 | 281 | 34. 42. 29,0               | 55. 17. 31,0  | 18480 |
| 51  | 224 | 207 | 305 | 47. 15. 31,5               | 42. 44. 28,5  | 23184 |
| 52  | 288 | 175 | 337 | 58. 42. 55,8               | 31. 17. 4,2   | 25200 |
| 53  | 352 | 135 | 377 | 69. 1. 1,4                 | 20. 58. 58,6  | 23760 |
| 54  | 416 | 87  | 425 | 78. 11. 15,8               | 11. 48. 44,2  | 18096 |
| 55  | 480 | 31  | 481 | 86. 18. 17,2               | 3. 41. 42,8   | 7440  |
| 56  | 68  | 285 | 293 | 13. 25. 10,8               | 76. 34. 49,2  | 9690  |
| 57  | 136 | 273 | 305 | 26. 28. 51,7               | 63. 31. 8,3   | 18564 |
| 58  | 204 | 253 | 325 | 38. 52. 48,3               | 51. 7. 11,7   | 25806 |
| 59  | 272 | 225 | 353 | 50. 24. 8,1                | 39. 35. 51,9  | 30600 |
| 60  | 340 | 189 | 389 | 60. 55. 51,9               | 29. 4. 8,1    | 32130 |
| 61  | 408 | 145 | 433 | 70. 26. 6,7                | 19. 33. 53,3  | 29580 |
| 62  | 476 | 93  | 485 | 78. 56. 41,7               | 11. 3. 18,3   | 22134 |
| 63  | 544 | 33  | 545 | 86. 31. 42,9               | 3. 28. 17,1   | 8976  |
| 64  | 36  | 323 | 325 | 6. 21. 34,8                | 83. 38. 25,2  | 5814  |
| 65  | 180 | 299 | 349 | 31. 2. 53,6                | 58. 57. 6,4   | 26910 |
| 66  | 252 | 275 | 373 | 42. 30. 3,6                | 47. 29. 56,4  | 34650 |
| 67  | 396 | 203 | 445 | 62. 51. 32,9               | 27. 8. 27,1   | 40194 |
| 68  | 468 | 155 | 493 | 71. 40. 31,1               | 18. 19. 28,9  | 36270 |
| 69  | 612 | 35  | 613 | 86. 43. 36,6               | 3. 16. 23,4   | 10710 |
| 70  | 76  | 357 | 365 | 12. 1. 4,9                 | 77. 58. 55,1  | 13566 |
| 71  | 152 | 345 | 377 | 23. 46. 38,3               | 66. 13. 21,7  | 26220 |
| 72  | 228 | 325 | 397 | 35. 3. 4,1                 | 54. 56. 55,9  | 37050 |
| 73  | 304 | 297 | 425 | 45. 40. 2,3                | 44. 19. 57,7  | 45144 |
| 74  | 380 | 261 | 461 | 55. 31. 1,5                | 34. 28. 58,5  | 49590 |
| 75  | 456 | 217 | 505 | 64. 33. 4,6                | 25. 26. 55,4  | 49476 |
| 76  | 532 | 165 | 557 | 72. 46. 7,3                | 17. 13. 52,7  | 43890 |
| 77  | 608 | 105 | 617 | 80. 12. 6,5                | 9. 57. 53,5   | 31920 |
| 78  | 684 | 37  | 685 | 86. 54. 13,3               | 3. 5. 46,7    | 12654 |
| 79  | 40  | 399 | 401 | 5. 43. 29,3                | 84. 16. 30,7  | 7980  |
| 80  | 120 | 391 | 409 | 17. 3. 41,5                | 72. 56. 18,5  | 23460 |
| 81  | 280 | 351 | 449 | 38. 34. 48,3               | 51. 25. 11,7  | 49140 |
| 82  | 360 | 319 | 481 | 48. 27. 19,7               | 41. 32. 40,3  | 57420 |
| 83  | 440 | 279 | 521 | 57. 37. 17,7               | 32. 22. 42,3  | 61380 |
| 84  | 520 | 231 | 569 | 66. 2. 51,9                | 23. 57. 8,1   | 60060 |
| 85  | 680 | 111 | 689 | 80. 43. 44,6               | 9. 16. 15,4   | 37740 |
| 86  | 760 | 39  | 761 | 87. 3. 44,6                | 2. 56. 15,4   | 14820 |
| 87  | 84  | 437 | 445 | 10. 52. 50,4               | 79. 7. 9,6    | 18354 |
| 88  | 168 | 425 | 457 | 21. 34. 6,9                | 68. 25. 53,1  | 35700 |
| 89  | 336 | 377 | 505 | 41. 42. 32,1               | 48. 17. 27,9  | 63336 |
| 90  | 420 | 341 | 541 | 50. 55. 36,1               | 39. 4. 23,9   | 71610 |
| 91  | 672 | 185 | 697 | 74. 36. 28,4               | 15. 23. 31,6  | 62160 |
| 92  | 840 | 41  | 841 | 87. 12. 20,3               | 2. 47. 39,7   | 17220 |
| 93  | 44  | 483 | 485 | 5. 12. 18,4                | 84. 47. 41,6  | 10626 |
| 94  | 132 | 475 | 493 | 15. 31. 49,2               | 74. 28. 10,8  | 31350 |
| 95  | 220 | 459 | 509 | 25. 36. 30,7               | 64. 23. 29,3  | 50490 |



| No. | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> | $\alpha$       | $\beta$         | <i>F</i> |
|-----|----------|----------|----------|----------------|-----------------|----------|
| 96  | 308      | 435      | 533      | 350. 18'. 0,9" | 540. 41'. 59,1" | 66990    |
| 97  | 396      | 403      | 565      | 44. 29. 53,0   | 45. 30. 7,0     | 79794    |
| 98  | 572      | 315      | 653      | 61. 9. 30,4    | 28. 50. 29,6    | 90090    |
| 99  | 660      | 259      | 709      | 68. 34. 25,5   | 21. 25. 34,5    | 85470    |
| 100 | 748      | 195      | 773      | 75. 23. 18,5   | 14. 36. 41,5    | 72930    |

## II. Tafel schiefwinkliger Dreiecke.

| No. | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> | $\alpha$        | $\beta$         | $\gamma$       | <i>F</i> |
|-----|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|----------------|----------|
| 1   | 14       | 15       | 13       | 590. 29'. 23,1" | 670. 22'. 48,5" | 530. 7'. 48,4" | 84       |
| 2   | 150      | 25       | 145      | 96. 43. 58,5    | 9. 31. 38,2     | 73. 44. 23,3   | 1800     |
| 3   | 120      | 29       | 101      | 124. 58. 33,6   | 11. 25. 16,3    | 43. 36. 10,1   | 1200     |
| 4   | 408      | 41       | 401      | 96. 57. 20,1    | 5. 43. 29,3     | 77. 19. 10,6   | 8160     |
| 5   | 40       | 13       | 37       | 93. 41. 42,8    | 18. 55. 28,7    | 67. 22. 48,5   | 240      |
| 6   | 44       | 15       | 37       | 107. 56. 42,9   | 18. 55. 28,7    | 53. 7. 48,4    | 264      |
| 7   | 102      | 61       | 109      | 66. 59. 25,4    | 33. 23. 54,6    | 79. 36. 40,0   | 3060     |
| 8   | 232      | 61       | 229      | 85. 11. 58,6    | 15. 11. 21,4    | 79. 36. 40,0   | 6960     |
| 9   | 312      | 109      | 229      | 131. 24. 44,0   | 15. 11. 21,4    | 33. 23. 54,6   | 9360     |
| 10  | 240      | 53       | 197      | 139. 56. 16,8   | 8. 10. 16,4     | 31. 53. 26,8   | 3360     |
| 11  | 200      | 85       | 205      | 74. 36. 28,4    | 24. 11. 22,3    | 81. 12. 9,3    | 8400     |
| 12  | 450      | 85       | 445      | 87. 55. 0,3     | 10. 52. 50,4    | 81. 12. 9,3    | 18900    |
| 13  | 624      | 205      | 445      | 144. 55. 47,3   | 10. 52. 50,4    | 24. 11. 22,3   | 26208    |
| 14  | 222      | 149      | 221      | 70. 42. 30,0    | 39. 18. 27,5    | 69. 59. 2,5    | 15540    |
| 15  | 400      | 85       | 325      | 148. 34. 57,8   | 6. 21. 34,8     | 25. 3. 27,4    | 7200     |
| 16  | 318      | 181      | 349      | 64. 58. 38,5    | 31. 2. 53,6     | 83. 58. 27,9   | 28620    |
| 17  | 630      | 73       | 577      | 134. 6. 57,7    | 4. 46. 18,8     | 41. 6. 43,5    | 15120    |
| 18  | 600      | 125      | 485      | 154. 11. 6,7    | 5. 12. 18,4     | 20. 36. 34,9   | 13200    |
| 19  | 328      | 169      | 241      | 104. 53. 51,0   | 29. 51. 46,0    | 45. 14. 23,0   | 19680    |
| 20  | 510      | 169      | 409      | 117. 41. 55,5   | 17. 3. 41,5     | 45. 14. 24,0   | 30600    |
| 21  | 600      | 241      | 409      | 133. 4. 32,5    | 17. 3. 41,5     | 29. 51. 46,0   | 36000    |
| 22  | 520      | 193      | 457      | 97. 55. 6,7     | 21. 34. 6,9     | 60. 30. 46,4   | 43680    |
| 23  | 560      | 157      | 493      | 107. 14. 55,5   | 15. 31. 49,2    | 57. 13. 15,3   | 36960    |
| 24  | 390      | 373      | 277      | 72. 1. 42,8     | 65. 28. 13,6    | 42. 30. 3,6    | 49140    |
| 25  | 480      | 509      | 221      | 69. 50. 38,8    | 84. 32. 50,5    | 25. 36. 30,7   | 52800    |
| 26  | 712      | 601      | 289      | 100. 19. 6,4    | 56. 8. 41,9     | 23. 32. 11,7   | 85440    |
| 27  | 510      | 533      | 317      | 68. 23. 7,1     | 76. 18. 52,0    | 35. 18. 0,9    | 78540    |
| 28  | 606      | 565      | 445      | 72. 38. 34,1    | 62. 51. 32,9    | 44. 29. 53,0   | 119988   |
| 29  | 904      | 625      | 505      | 105. 46. 14,4   | 41. 42. 32,1    | 32. 31. 13,5   | 151872   |
| 30  | 370      | 541      | 421      | 43. 1. 23,5     | 86. 3. 0,4      | 50. 55. 36,1   | 77700    |
| 31  | 120      | 17       | 113      | 110. 26. 39,6   | 7. 37. 41,3     | 61. 55. 39,1   | 900      |
| 32  | 240      | 221      | 29       | 128. 9. 0,6     | 46. 23. 49,9    | 5. 27. 9,5     | 2520     |
| 33  | 840      | 761      | 89       | 151. 4. 23,4    | 25. 59. 21,2    | 2. 56. 15,4    | 16380    |
| 34  | 1040     | 1013     | 53       | 119. 20. 41,0   | 58. 6. 33,2     | 2. 32. 45,8    | 23400    |
| 35  | 296      | 233      | 137      | 103. 10. 52,4   | 50. 2. 1,6      | 26. 47. 6,0    | 15540    |



| No. | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> | $\alpha$      | $\beta$       | $\gamma$     | <i>F</i> |
|-----|----------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|----------|
| 36  | 816      | 233      | 617      | 143° 25' 0,5" | 90° 57' 53,5" | 26° 47' 6,0" | 42840    |
| 37  | 696      | 137      | 617      | 120. 10. 4,9  | 9. 57. 53,5   | 50. 2. 1,6   | 36540    |
| 38  | 584      | 557      | 173      | 90. 15. 39,7  | 72. 30. 27,6  | 17. 13. 52,7 | 48180    |
| 39  | 776      | 773      | 197      | 83. 33. 34,9  | 81. 49. 43,6  | 14. 36. 41,5 | 75660    |
| 40  | 680      | 569      | 281      | 100. 45. 20,9 | 55. 17. 31,0  | 23. 57. 8,1  | 78540    |
| 41  | 872      | 785      | 305      | 96. 7. 48,0   | 63. 31. 8,3   | 20. 21. 3,7  | 119028   |
| 42  | 1160     | 821      | 629      | 105. 29. 41,2 | 43. 0. 10,3   | 31. 30. 8,5  | 248820   |
| 43  | 861      | 500      | 689      | 91. 22. 50,0  | 35. 29. 21,6  | 53. 7. 48,4  | 172200   |
| 44  | 1869     | 1700     | 881      | 86. 41. 20,5  | 65. 14. 18,6  | 28. 4. 20,9  | 747600   |
| 45  | 549      | 1300     | 1201     | 24. 57. 29,3  | 87. 39. 42,2  | 67. 22. 48,5 | 329400   |
| 46  | 354,9    | 370,0    | 120,1    | 73. 24. 49,1  | 87. 39. 42,2  | 18. 55. 28,7 | 21294    |
| 47  | 93       | 34       | 65       | 137. 40. 39,0 | 14. 15. 0,1   | 28. 4. 20,9  | 744      |
| 48  | 69       | 50       | 73       | 65. 8. 53,2   | 41. 6. 43,5   | 73. 44. 23,3 | 1656     |
| 49  | 51       | 58       | 41       | 59. 4. 39,3   | 77. 19. 10,6  | 43. 36. 10,1 | 1020     |
| 50  | 123      | 106      | 65       | 88. 37. 10,0  | 59. 29. 23,2  | 31. 53. 26,8 | 3444     |
| 51  | 52       | 15       | 41       | 130. 26. 59,0 | 12. 40. 49,4  | 36. 52. 11,6 | 234      |
| 52  | 44       | 39       | 17       | 95. 27. 9,4   | 61. 55. 39,1  | 22. 37. 11,5 | 330      |
| 53  | 92       | 75       | 29       | 117. 20. 33,4 | 46. 23. 49,9  | 16. 15. 36,7 | 966      |
| 54  | 236      | 183      | 65       | 139. 6. 3,2   | 30. 30. 36,8  | 10. 23. 20,0 | 3894     |
| 55  | 52       | 51       | 53       | 59. 57. 47,7  | 58. 6. 33,2   | 61. 55. 39,1 | 1170     |
| 56  | 332      | 255      | 89       | 145. 12. 48,1 | 25. 59. 21,2  | 8. 47. 50,7  | 6474     |
| 57  | 76       | 87       | 65       | 57. 51. 10,2  | 75. 44. 59,9  | 46. 23. 49,4 | 2394     |
| 58  | 188      | 195      | 101      | 70. 54. 39,5  | 78. 34. 43,7  | 30. 30. 36,8 | 9306     |
| 59  | 572      | 149      | 435      | 153. 15. 4,0  | 6. 43. 58,5   | 20. 0. 57,5  | 14586    |
| 60  | 284      | 125      | 267      | 84. 37. 13,7  | 25. 59. 21,2  | 69. 23. 25,1 | 16614    |
| 61  | 1924     | 137      | 1839     | 126. 41. 35,0 | 3. 16. 23,4   | 50. 2. 1,6   | 101010   |
| 62  | 716      | 185      | 543      | 156. 1. 45,0  | 6. 1. 32,1    | 17. 56. 42,9 | 20406    |
| 63  | 196      | 173      | 219      | 58. 36. 15,9  | 48. 53. 16,5  | 72. 30. 27,6 | 16170    |
| 64  | 244      | 233      | 111      | 82. 8. 22,7   | 71. 4. 31,3   | 26. 47. 6,0  | 12810    |
| 65  | 1052     | 269      | 795      | 160. 9. 29,1  | 4. 58. 44,7   | 14. 51. 46,2 | 36294    |
| 66  | 244      | 197      | 291      | 56. 5. 46,3   | 42. 4. 30,1   | 81. 49. 43,6 | 23790    |
| 67  | 668      | 221      | 555      | 111. 21. 44,6 | 17. 56. 42,9  | 50. 41. 32,5 | 57114    |
| 68  | 1244     | 317      | 939      | 161. 43. 59,6 | 4. 34. 52,4   | 13. 41. 8,0  | 46650    |
| 69  | 484      | 365      | 123      | 163. 4. 38,7  | 12. 40. 49,4  | 4. 14. 31,9  | 6534     |
| 70  | 428      | 257      | 471      | 64. 22. 24,9  | 32. 46. 44,7  | 82. 50. 50,4 | 54570    |
| 71  | 268      | 281      | 255      | 59. 45. 56,4  | 64. 56. 32,6  | 55. 17. 31,0 | 30954    |
| 72  | 1004     | 305      | 807      | 122. 23. 45,3 | 14. 51. 46,2  | 42. 44. 28,5 | 103914   |
| 73  | 436      | 377      | 159      | 100. 54. 38,2 | 58. 6. 33,2   | 20. 58. 58,6 | 29430    |
| 74  | 1676     | 425      | 1263     | 164. 14. 16,2 | 3. 56. 59,6   | 11. 48. 44,2 | 72906    |
| 75  | 572      | 293      | 579      | 73. 55. 57,2  | 29. 29. 13,6  | 76. 34. 49,2 | 81510    |
| 76  | 316      | 305      | 327      | 59. 52. 46,3  | 56. 36. 5,4   | 63. 31. 8,3  | 43134    |
| 77  | 1196     | 353      | 951      | 126. 43. 0,1  | 13. 41. 8,0   | 39. 35. 51,9 | 134550   |
| 78  | 388      | 389      | 195      | 75. 10. 52,0  | 75. 44. 59,9  | 29. 4. 8,1   | 36666    |
| 79  | 1916     | 485      | 1443     | 165. 14. 58,9 | 3. 41. 42,8   | 11. 3. 18,3  | 89094    |
| 80  | 436      | 365      | 507      | 57. 15. 27,9  | 44. 45. 37,0  | 77. 58. 55,1 | 77826    |
| 81  | 908      | 377      | 681      | 89. 14. 51,9  | 24. 31. 46,4  | 66. 13. 21,7 | 156630   |
| 82  | 364      | 425      | 303      | 57. 5. 18,6   | 78. 34. 43,7  | 44. 19. 57,7 | 54054    |
| 83  | 1628     | 461      | 1275     | 133. 42. 17,3 | 11. 48. 44,2  | 34. 28. 58,5 | 212454   |
| 84  | 676      | 557      | 219      | 113. 52. 50,8 | 48. 53. 16,5  | 17. 13. 52,7 | 55770    |



| No. | $a$  | $b$ | $c$  | $\alpha$      | $\beta$      | $\gamma$     | $F$    |
|-----|------|-----|------|---------------|--------------|--------------|--------|
| 85  | 644  | 617 | 111  | 99° 7' 35,2"  | 71° 4' 31,3" | 9° 57' 53,5" | 33810  |
| 86  | 508  | 401 | 615  | 55. 16. 30,3  | 40. 26. 59,0 | 84. 16. 30,7 | 101346 |
| 87  | 412  | 449 | 375  | 59. 11. 23,2  | 69. 23. 25,1 | 51. 25. 11,7 | 72306  |
| 88  | 1868 | 521 | 1455 | 136. 33. 59,4 | 11. 3. 18,3  | 32. 22. 42,3 | 260586 |
| 89  | 628  | 569 | 255  | 91. 6. 19,3   | 64. 56. 32,6 | 23. 57. 8,1  | 72534  |
| 90  | 2732 | 689 | 2055 | 167. 37. 57,9 | 3. 5. 46,7   | 9. 16. 15,4  | 151626 |
| 91  | 764  | 485 | 867  | 61. 21. 0,3   | 33. 51. 18,1 | 84. 47. 41,6 | 184506 |
| 92  | 532  | 509 | 555  | 59. 48. 50,3  | 55. 47. 40,4 | 64. 23. 29,3 | 122094 |
| 93  | 1532 | 533 | 1299 | 105. 44. 7,6  | 19. 33. 53,3 | 54. 41. 59,1 | 333210 |
| 94  | 964  | 773 | 291  | 123. 18. 48,4 | 42. 4. 30,1  | 14. 36. 41,5 | 93990  |
| 95  | 3356 | 845 | 2523 | 168. 50. 8,9  | 2. 47. 39,7  | 8. 22. 11,4  | 206394 |
| 96  | 956  | 533 | 1011 | 68. 39. 17,9  | 31. 17. 4,2  | 80. 3. 37,9  | 250950 |
| 97  | 604  | 545 | 663  | 59. 2. 21,3   | 50. 41. 32,5 | 70. 16. 6,2  | 154926 |
| 98  | 1772 | 593 | 1479 | 110. 1. 59,9  | 18. 19. 28,9 | 51. 38. 31,2 | 411990 |
| 99  | 532  | 629 | 435  | 56 31. 27,9   | 80. 28. 21,8 | 43. 0. 10,3  | 114114 |
| 100 | 2684 | 725 | 2067 | 143. 23. 11,2 | 9. 16. 15,4  | 27. 20. 33,4 | 446886 |



# Register.

|                            | Nr.    |                                | Nr.    |
|----------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| Aenderung, stetige . . . . | 2      | Funktion reciproke . . . .     | 14     |
| Arcuscosinus . . . . .     | 39     | „ „ transcendente . . . .      | 3      |
| Arcussinus . . . . .       | 39     | Funktionsgrösse . . . . .      | 2      |
| Arcustangens . . . . .     | 39     | Modul des log. Systems . . . . | 43     |
| Cofunktion . . . . .       | 15     | Primzahl . . . . .             | 43     |
| Cosecans . . . . .         | 13. 27 | Quotient der Reihe . . . . .   | 36     |
| Cosinus . . . . .          | 8. 21  | Reihe, convergente . . . . .   | 36     |
| Cosinussatz . . . . .      | 48     | „ „ divergente . . . . .       | 36     |
| Cotangens . . . . .        | 13. 27 | Secans . . . . .               | 13. 27 |
| Funktion . . . . .         | 1      | Sinus *) . . . . .             | 13. 27 |
| „ algebraische . . . . .   | 3      | Sinussatz . . . . .            | 47     |
| „ coordinirte . . . . .    | 14     | Tangens . . . . .              | 13. 27 |
| „ directe . . . . .        | 15     | Tangentialsatz . . . . .       | 52     |
| „ indirecte . . . . .      | 15     | Winkel, congruente . . . . .   | 21     |
| „ inverse . . . . .        | 39     | Winkelfunktion . . . . .       | 5      |

\*) Uebersetzung eines arabischen Wortes, welches ausser dem mathematischen Begriffe noch die Bedeutung „Busen“ hat.

## Berichtigungen.

Seite 64 Formel 13 muss es heissen  $\sin R = 1$  statt  $\sin R = 0$ .







# Tafeln

## vierstelliger Logarithmen.

---

A n h a n g

zum

Lehrbuch der elementaren Mathematik, Th. III

von

**Victor Schlegel,**  
Oberlehrer am Gymnasium in Waren.

---







## Einleitung.\*)

Die in den folgenden Tafeln stehenden Logarithmen beziehen sich auf die Grundzahl Zehn, gehören also dem gemeinen logarithmischen Systeme an.

### Tafel I. Die Logarithmen der Decimalzahlen (S. 98—101).

Die Kennziffer des Logarithmus wird nach Th. I, 172, 175, 176 bestimmt; die Tafel enthält nur die Mantissen.

#### A. Gegeben die Zahl, gesucht der Logarithmus.

1) Liegt die Zahl zwischen 0 und 200, so suche man sie in der ersten, mit N. überschriebenen Spalte auf; die in der zweiten (mit L. 0 überschriebenen) Spalte rechts daneben stehende Zahl ist die zugehörige Mantisse. (Z. B.:  $\lg 167 = 2,2227$ .)

2) Liegt die Zahl zwischen 200 und 2000, so denke man sich ihre Einerstelle weg, und suche die übrig bleibende Zahl (wie in 1) in der ersten, mit N. überschriebenen Spalte auf; dann gehe man in derselben wagerechten Reihe nach rechts bis in diejenige Spalte, welche mit der Einerziffer der gegebenen Zahl überschrieben ist; die dort stehende Zahl ist die zu der gegebenen Zahl gehörige Mantisse. (Z. B.:  $\lg 1837 = 3,2641$ .)

3) Liegt die Zahl zwischen 2000 und 20000, so denke man sich ihre Einerstelle weg, und suche den Logarithmus der übrig bleibenden Zahl nach 2) auf. Dann bestimme man den Unterschied zwischen der gefundenen und der folgenden Mantisse,\*\*) suche in der mit P. P. überschriebenen Spalte die-

---

\*) Ueber die Anwendung der Logarithmen zur Berechnung von Näherungswerthen im Allgemeinen, und über das gemeine logarithmische System insbesondere siehe Th. I, Nr. 167, 168, 169.

\*\*) Sämmtliche Mantissen auf den 4 Seiten der Tafel folgen aufeinander wie die Wörter, Zeilen und Seiten eines Buches.



jenige kleine Tafel auf, welche mit diesem Unterschiede überschrieben ist, und suche in dieser Tafel links die Einerziffer der gegebenen Zahl auf. Den rechts danebenstehenden Decimalbruch addire man zu der vorher gefundenen Mantisse, und runde seine Decimalstelle (welche für die Mantisse die Bedeutung einer fünften Decimalstelle hat) nach Th. I, Regel 169 ab. (Z. B.:  $\log 12489$ . Es ist

Mantisse von  $\log 1248$  gleich 0962.

Differenz zwischen 0962 und 0966 gleich 4.

In Tafel 4 steht neben 9 der Bruch 3.6. Also:

$$\begin{array}{r} 0962 \\ 3.6 \\ \hline 0965.6. \end{array}$$

Also, da die wegzulassende Decimalstelle  $6 > 4$  ist,  $\log 12489 = 4,0966$ .)

Anm. Bereits in diesem Intervall sind die Logarithmen zweier auf einander folgender Zahlen um so häufiger einander gleich, je grösser die gegebene Zahl ist. So ist z. B.  $\log 12489 = \log 12490$ . Dasselbe findet statt, wenn die gegebene Zahl grösser als 20000 ist. Man runde daher in diesem Falle ihre Einerstelle ab (z. B. 16 zu 20, 14 zu 10) und verfähre dann nach 3).

### B. Gegeben der Logarithmus, gesucht die Zahl.

Die Mantissen von 0000 bis 3031 suche man auf S. 100 und 101, die von 3032 bis 9999 auf S. 98 unterhalb der starken wagerechten Linie, und auf S. 99.

1) Steht die Mantisse des gegebenen Logarithmus in der Tafel, so gehe man in derselben wagerechten Reihe nach links bis in die mit N. überschriebene Spalte. Die dort stehende Zahl ist der erste Theil der gesuchten Zahl (bis auf die Einerstelle). Als Einerstelle schreibt man dann die Ziffer, welche die Ueberschrift derjenigen Spalte bildet, in der man die Mantisse gefunden. Zuletzt wird das Komma bestimmt. (Z. B.: Gegeben 2,1995. Die Zahl ist 158,3.)

2) Steht die Mantisse des gegebenen Logarithmus nicht in der Tafel, so suche man die nächst kleinere Mantisse, und bestimme nach 1) die zugehörige Zahl. Dann bestimme man den Unterschied zwischen der gefundenen und der folgenden Mantisse, suche in der mit P. P. überschriebenen Spalte diejenige kleine Tafel auf, welche mit die-



sem Unterschiede überschrieben ist, und suche in dieser Tafel rechts den Unterschied zwischen der gefundenen und der gegebenen Mantisse (oder denjenigen Decimalbruch, welcher diesem Unterschiede am nächsten kommt). Die links daneben stehende Zahl schreibt man als Einerziffer zu der bereits gefundenen Zahl hinzu. Zuletzt wird das Komma bestimmt. (Z. B.: Gegeben 1,4376. Die nächst kleinere Mantisse ist 4362, die zugehörige Zahl 273.

Unterschied zwischen der gefundenen und der folgenden Mantisse:  
 $4378 - 4362 = 16$ . Also Tafel 16.

Unterschied zwischen der gefundenen und der gegebenen Mantisse:  
 $4376 - 4362 = 14$ .

In Tafel 16 kommt diesem Unterschied am nächsten 14.4. Die links dabei stehende Zahl ist 9, also die gesuchte Zahl 2739, und nach Bestimmung des Kommas 27,39.)

## Tafel II. Die Logarithmen der trigonometrischen Funktionen (S. 102—115).

Die Kennziffer für alle in einer Spalte befindlichen Mantissen steht am Fuss dieser Spalte. Steht über der ersten Ziffer der Mantisse ein wagerechter Strich, so ist die Kennziffer um Eins zu erniedrigen. — Sämmtliche Kennziffern sind um Zehn zu gross.

### A. Gegeben der Winkel, gesucht der $\overline{l}_{tg}$ oder $\overline{l}_{sin}$ .

1) Ist der Winkel in Graden und Minuten gegeben, so gehe man in der mit der Zahl der Grade überschriebenen Spalte bis in diejenige wagerechte Reihe, welche links in der ersten Spalte mit der Anzahl der Minuten bezeichnet ist. Die dort stehende Zahl ist die gesuchte Mantisse. (Z. B.:  $\overline{l}_{sin} 36^{\circ} 44' = 9,7768$ ).

Anm. Die Tafel der  $\overline{l}_{sin}$  enthält von  $45^{\circ}$  bis  $90^{\circ}$  nur die geraden Minuten. Ist nun die Minutenzahl des gegebenen Winkels ungerade, so addire man zu der Mantisse, welche zu der nächst niederen geraden Zahl gehört, 2, wenn die Differenz dieser und der folgenden Mantisse 3 beträgt, dagegen 1, wenn diese Differenz 2 oder 1 beträgt, und nichts, wenn sie 0 beträgt.

2) Ist der Winkel in Graden, Minuten und Zehntelminuten gegeben (oder auf solche abgerundet), so suche man



zuerst [nach 1)] die zu den Graden und Minuten gehörige Mantisse. Dann bestimme man den Unterschied zwischen der gefundenen und der folgenden Mantisse, suche in der mit P. P. überschriebenen Spalte diejenige kleine Tafel auf, welche mit diesem Unterschiede überschrieben ist, und suche in dieser Tafel links die Zahl der Zehntelminuten auf. Den rechts danebenstehenden Decimalbruch addire man zu der vorhergefundenen Mantisse, und runde seine Decimalstelle (welche für die Mantisse die Bedeutung einer fünften Decimalstelle hat) nach Th. I, Regel 169 ab. (Z. B.:  $\lg 11^\circ 34,6'$ . Es ist

Mantisse von  $\lg 11^\circ 34'$  gleich 3110.

Differenz zwischen 3110 und 3117 gleich 7.

In Tafel 7 steht neben 6 der Bruch 4.2. Also:

$$\begin{array}{r} 3110 \\ 4.2 \\ \hline 3114.2. \end{array}$$

Also, da die wegzulassende Decimalstelle  $2 < 5$  ist,  $\lg 11^\circ 34,6' = 9,3114$ .)

Anm. Zwischen  $0^\circ$  und  $5^\circ$  beträgt beim  $\lg$ , wie beim  $\sin$  der Unterschied zweier auf einander folgender Mantissen meistens mehr als 15, während die kleinen Tafeln für höhere Differenzen als 15 fehlen. Man findet dann die zur Mantisse zu addirende Zahl, indem man die Differenz der beiden Mantissen durch 10 dividirt, und mit der Zahl der Zehntelminuten multiplicirt. (Z. B.  $\lg 30^\circ 32,7'$ . Mantisse zu  $30^\circ 32'$ : 7906. Folgende Mantisse: 7927. Differenz: 21. Durch 10 dividirt: 2,1. Mit 7 multiplicirt: 14,7. Abgerundet: 15. Zu 7906 addirt: 7921. Also  $\lg 30^\circ 32,7' = 8,7921$ .)

#### B. Gegeben der $\lg$ oder $\sin$ , gesucht der Winkel.

1) Steht der gegebene Logarithmus in der Tafel, so giebt die Ueberschrift der Spalte, in der man ihn gefunden, die Zahl der Grade, und die in derselben wagerechten Reihe links in der ersten Spalte stehende Zahl die Zahl der Minuten des gesuchten Winkels an. (Z. B.: Gegeben  $\sin x = 9,4588$ . Der Winkel ist  $16^\circ 43'$ .)

Anm. Findet sich dieselbe Mantisse mehrmals hinter einander in der Tafel (was in der Tafel der  $\sin$  von  $69^\circ$  an vorkommt), so nehme man das arithmetische Mittel der zur ersten und zur letzten dieser gleichen Mantissen gehörigen Minutenzahlen.



2) Steht der gegebene Logarithmus nicht in der Tafel, so suche man die nächst kleinere Mantisse und bestimme nach 1) den zugehörigen Winkel. Dann bestimme man den Unterschied zwischen der gefundenen und der folgenden Mantisse, suche in der mit P. P. überschriebenen Spalte diejenige kleine Tafel auf, welche mit diesem Unterschiede überschrieben ist, und suche in dieser Tafel rechts den Unterschied zwischen der gefundenen und der gegebenen Mantisse (oder denjenigen Decimalbruch, welcher diesem Unterschiede am nächsten kommt). Die links daneben stehende Zahl ist die Anzahl der Zehntelminuten des gesuchten Winkels. (Z. B.: Gegeben  $\lg x = 9,0376$ . Die nächst kleinere Mantisse ist 0371, der zugehörige Winkel  $6^{\circ} 13'$ .

Unterschied zwischen der gefundenen und der folgenden Mantisse:  $0383 - 0371 = 12$ . Also Tafel 12.

Unterschied zwischen der gefundenen und der gegebenen Mantisse:  $0376 - 0371 = 5$ .

In Tafel 12 kommt diesem Unterschied am nächsten 4 . 8. Die links dabei stehende Zahl ist 4, also der gesuchte Winkel  $6^{\circ} 13,4'$ .)

Anm. Fehlt die kleine Tafel, in der man die Anzahl der Zehntelminuten aufsuchen soll [s. Anm. zu A, 2)], so multiplicire man den Unterschied zwischen der gefundenen und der gegebenen Mantisse mit Zehn, und dividire ihn dann durch den Unterschied zwischen der gefundenen und der folgenden Mantisse. Dieser Quotient, zu Ganzen abgerundet, giebt die gesuchten Zehntelminuten. (Z. B.: Gegeben  $\lg x = 8,7921$ . Die nächst kleinere Mantisse ist 7906, der zugehörige Winkel  $3^{\circ} 32'$ .

Unterschied zwischen der gefundenen und der folgenden Mantisse  $7927 - 7906 = 21$ .

Unterschied zwischen der gefundenen und der gegebenen Mantisse  $7921 - 7906 = 15$ .

Also: 
$$\begin{array}{r} 21 \mid 150 \mid 7,1 \\ \quad 147 \\ \hline \quad \quad 30 \end{array}$$

Man hat also, wenn 7,1 zu 7 abgerundet wird, 7 Zehntelminuten, und der gesuchte Winkel ist  $3^{\circ} 32,7'$ .)

*Weitere Bemerkungen zu Tafel II.* — In der Tafel der Tangenslogarithmen ist 2 die kleinste Differenz zweier auf einander folgender Mantissen. In der Tafel der Sinuslogarithmen verschwindet diese Differenz bei Winkeln über  $45^{\circ}$  oft



ganz. Ein Winkel kann daher aus seiner Sinusfunktion nicht immer mit gleicher Genauigkeit bestimmt werden wie aus seiner Tangensfunktion. — Ist nun in diesem Falle

$$\sin x = \frac{p}{q}$$

gegeben, so folgt hieraus

$$\operatorname{tg} x = \frac{p}{\sqrt{q^2 - p^2}} = \frac{p}{\sqrt{(q + p)(q - p)}};$$

also

$$l \operatorname{tg} x = l p - \frac{1}{2} (l(q + p) + l(q - p)).$$

Berechnet man hieraus  $l \operatorname{tg} x$ , so kann daraus der gesuchte Winkel mit genügender Genauigkeit gefunden werden.

Z. B.: Gegeben  $\sin x = 0,9$ ; also  $l \sin x = 9,9542$ . Hieraus findet sich nach der Sinustafel  $x = 64^\circ 8'$ . Es ist nun

$$\operatorname{tg} x = \frac{9}{\sqrt{100 - 81}} = \frac{9}{\sqrt{19}};$$

$$l \operatorname{tg} x = 0,9542 - 0,6394 = 10,3148;$$

also  $x = 64^\circ 9,3'$ .

### Tafel III. Complement- und Supplementwinkel (S. 116).

1) Bestimmung des Logarithmus einer Cofunktion. — Da

$$\cos x = \sin (90^\circ - x) \text{ und } \cot x = \operatorname{tg} (90^\circ - x)$$

ist, so hat man, wenn  $l \cos x$  oder  $l \cot x$  gesucht wird, nur  $l \sin (90^\circ - x)$  oder  $l \operatorname{tg} (90^\circ - x)$  zu bestimmen. Es kommt also darauf an, zu jedem Winkel  $x$  den Complementwinkel  $90^\circ - x$  zu bestimmen. Die hierzu erforderliche Rechnung wird durch Tafel III erspart, welche für jeden in Graden, Minuten und Zehntelminuten gegebenen Winkel den Complementwinkel liefert.

Man suche in dem linken Theile der Tafel in einer der mit W. unterschriebenen Spalten die Gradzahl des gegebenen Winkels. Die links daneben in der mit C. unterschriebenen Spalte stehende Zahl giebt die Grade des Complementwinkels. — Dann suche man im rechten Theile der Tafel die Minuten-



zahl des gegebenen Winkels, die daneben stehende Zahl (innerhalb derselben Doppellinien) giebt die Minuten des Complementwinkels.

2) Bestimmung des Logarithmus der Funktion eines stumpfen Winkels. — Da jede Funktion eines Winkels (abgesehen vom Vorzeichen) gleich derselben Funktion seines Supplementwinkels ist, so kommt es, um den Logarithmus der Funktion eines stumpfen Winkels zu finden, nur darauf an, zu jedem Winkel  $x$  den Supplementwinkel  $180^0 - x$  zu bestimmen. Diesen Winkel liefert ebenfalls Tafel III, und zwar durch das in 1) beschriebene Verfahren. Nur hat man als Gradzahl des Supplementwinkels die rechts neben der gegebenen Zahl in der mit S unterschriebenen Spalte stehende Zahl zu nehmen.

---



| N. | L. 0 | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | P. P. |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 0  | —∞   | 0000 | 3010 | 4771 | 6021 | 6990 | 7782 | 8451 | 9031 | 9542 | 22    | 21   |
| 1  | 0000 | 0414 | 0792 | 1139 | 1461 | 1761 | 2041 | 2304 | 2553 | 2788 | 1     | 2.2  |
| 2  | 3010 | 3222 | 3424 | 3617 | 3802 | 3979 | 4150 | 4314 | 4472 | 4624 | 2     | 4.4  |
| 3  | 4771 | 4914 | 5051 | 5185 | 5315 | 5441 | 5563 | 5682 | 5798 | 5911 | 3     | 6.6  |
| 4  | 6021 | 6128 | 6232 | 6335 | 6435 | 6532 | 6628 | 6721 | 6812 | 6902 | 4     | 8.8  |
| 5  | 6990 | 7076 | 7160 | 7243 | 7324 | 7404 | 7482 | 7559 | 7634 | 7709 | 5     | 11.0 |
| 6  | 7782 | 7853 | 7924 | 7993 | 8062 | 8129 | 8195 | 8261 | 8325 | 8388 | 6     | 13.2 |
| 7  | 8451 | 8513 | 8573 | 8633 | 8692 | 8751 | 8808 | 8865 | 8921 | 8976 | 7     | 15.4 |
| 8  | 9031 | 9085 | 9138 | 9191 | 9243 | 9294 | 9345 | 9395 | 9445 | 9494 | 8     | 17.6 |
| 9  | 9542 | 9590 | 9638 | 9685 | 9731 | 9777 | 9823 | 9868 | 9912 | 9956 | 9     | 19.8 |
| 10 | 0000 | 0043 | 0086 | 0128 | 0170 | 0212 | 0253 | 0294 | 0334 | 0374 | 20    | 19   |
| 11 | 0414 | 0453 | 0492 | 0531 | 0569 | 0607 | 0645 | 0682 | 0719 | 0755 | 1     | 2.0  |
| 12 | 0792 | 0828 | 0864 | 0899 | 0934 | 0969 | 1004 | 1038 | 1072 | 1106 | 2     | 4.0  |
| 13 | 1139 | 1173 | 1206 | 1239 | 1271 | 1303 | 1335 | 1367 | 1399 | 1430 | 3     | 6.0  |
| 14 | 1461 | 1492 | 1523 | 1553 | 1584 | 1614 | 1644 | 1673 | 1703 | 1732 | 4     | 8.0  |
| 15 | 1761 | 1790 | 1818 | 1847 | 1875 | 1903 | 1931 | 1959 | 1987 | 2014 | 5     | 10.0 |
| 16 | 2041 | 2068 | 2095 | 2122 | 2148 | 2175 | 2201 | 2227 | 2253 | 2279 | 6     | 12.0 |
| 17 | 2304 | 2330 | 2355 | 2380 | 2405 | 2430 | 2455 | 2480 | 2504 | 2529 | 7     | 14.0 |
| 18 | 2553 | 2577 | 2601 | 2625 | 2648 | 2672 | 2695 | 2718 | 2742 | 2765 | 8     | 16.0 |
| 19 | 2788 | 2810 | 2833 | 2856 | 2878 | 2900 | 2923 | 2945 | 2967 | 2989 | 9     | 18.0 |
| 20 | 3010 | 3032 | 3054 | 3075 | 3096 | 3118 | 3139 | 3160 | 3181 | 3201 | 18    | 17   |
| 21 | 3222 | 3243 | 3263 | 3284 | 3304 | 3324 | 3345 | 3365 | 3385 | 3404 | 1     | 1.8  |
| 22 | 3424 | 3444 | 3464 | 3483 | 3502 | 3522 | 3541 | 3560 | 3579 | 3598 | 2     | 3.6  |
| 23 | 3617 | 3636 | 3655 | 3674 | 3692 | 3711 | 3729 | 3747 | 3766 | 3784 | 3     | 5.4  |
| 24 | 3802 | 3820 | 3838 | 3856 | 3874 | 3892 | 3909 | 3927 | 3945 | 3962 | 4     | 7.2  |
| 25 | 3979 | 3997 | 4014 | 4031 | 4048 | 4065 | 4082 | 4099 | 4116 | 4133 | 5     | 9.0  |
| 26 | 4150 | 4166 | 4183 | 4200 | 4216 | 4232 | 4249 | 4265 | 4281 | 4298 | 6     | 10.8 |
| 27 | 4314 | 4330 | 4346 | 4362 | 4378 | 4393 | 4409 | 4425 | 4440 | 4456 | 7     | 12.6 |
| 28 | 4472 | 4487 | 4502 | 4518 | 4533 | 4548 | 4564 | 4579 | 4594 | 4609 | 8     | 14.4 |
| 29 | 4624 | 4639 | 4654 | 4669 | 4683 | 4698 | 4713 | 4728 | 4742 | 4757 | 9     | 16.2 |
| 30 | 4771 | 4786 | 4800 | 4814 | 4829 | 4843 | 4857 | 4871 | 4886 | 4900 | 16    | 15   |
| 31 | 4914 | 4928 | 4942 | 4955 | 4969 | 4983 | 4997 | 5011 | 5024 | 5038 | 1     | 1.6  |
| 32 | 5051 | 5065 | 5079 | 5092 | 5105 | 5119 | 5132 | 5145 | 5159 | 5172 | 2     | 3.2  |
| 33 | 5185 | 5198 | 5211 | 5224 | 5237 | 5250 | 5263 | 5276 | 5289 | 5302 | 3     | 4.8  |
| 34 | 5315 | 5328 | 5340 | 5353 | 5366 | 5378 | 5391 | 5403 | 5416 | 5428 | 4     | 6.4  |
| 35 | 5441 | 5453 | 5465 | 5478 | 5490 | 5502 | 5514 | 5527 | 5539 | 5551 | 5     | 8.0  |
| 36 | 5563 | 5575 | 5587 | 5599 | 5611 | 5623 | 5635 | 5647 | 5658 | 5670 | 6     | 9.6  |
| 37 | 5682 | 5694 | 5705 | 5717 | 5729 | 5740 | 5752 | 5763 | 5775 | 5786 | 7     | 11.2 |
| 38 | 5798 | 5809 | 5821 | 5832 | 5843 | 5855 | 5866 | 5877 | 5888 | 5900 | 8     | 12.8 |
| 39 | 5911 | 5922 | 5933 | 5944 | 5955 | 5966 | 5977 | 5988 | 5999 | 6010 | 9     | 14.4 |
| 40 | 6021 | 6031 | 6042 | 6053 | 6064 | 6075 | 6085 | 6096 | 6107 | 6117 | 14    | 13   |
| 41 | 6128 | 6138 | 6149 | 6160 | 6170 | 6180 | 6191 | 6201 | 6212 | 6222 | 1     | 1.4  |
| 42 | 6232 | 6243 | 6253 | 6263 | 6274 | 6284 | 6294 | 6304 | 6314 | 6325 | 2     | 2.8  |
| 43 | 6335 | 6345 | 6355 | 6365 | 6375 | 6385 | 6395 | 6405 | 6415 | 6425 | 3     | 4.2  |
| 44 | 6435 | 6444 | 6454 | 6464 | 6474 | 6484 | 6493 | 6503 | 6513 | 6522 | 4     | 5.6  |
| 45 | 6532 | 6542 | 6551 | 6561 | 6571 | 6580 | 6590 | 6599 | 6609 | 6618 | 5     | 7.0  |
| 46 | 6628 | 6637 | 6646 | 6656 | 6665 | 6675 | 6684 | 6693 | 6702 | 6712 | 6     | 8.4  |
| 47 | 6721 | 6730 | 6739 | 6749 | 6758 | 6767 | 6776 | 6785 | 6794 | 6803 | 7     | 9.8  |
| 48 | 6812 | 6821 | 6830 | 6839 | 6848 | 6857 | 6866 | 6875 | 6884 | 6893 | 8     | 11.2 |
| 49 | 6902 | 6911 | 6920 | 6928 | 6937 | 6946 | 6955 | 6964 | 6972 | 6981 | 9     | 12.6 |
| 50 | 6990 | 6998 | 7007 | 7016 | 7024 | 7033 | 7042 | 7050 | 7059 | 7067 |       |      |
| N. | L. 0 | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    |       |      |



| N.  | L. 0 | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | P. P. |      |     |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-----|
| 50  | 6990 | 6998 | 7007 | 7016 | 7024 | 7033 | 7042 | 7050 | 7059 | 7067 |       | 12   | 11  |
| 51  | 7076 | 7084 | 7093 | 7101 | 7110 | 7118 | 7126 | 7135 | 7143 | 7152 | 1     | 1.2  | 1.1 |
| 52  | 7160 | 7168 | 7177 | 7185 | 7193 | 7202 | 7210 | 7218 | 7226 | 7235 | 2     | 2.4  | 2.2 |
| 53  | 7243 | 7251 | 7259 | 7267 | 7275 | 7284 | 7292 | 7300 | 7308 | 7316 | 3     | 3.6  | 3.3 |
| 54  | 7324 | 7332 | 7340 | 7348 | 7356 | 7364 | 7372 | 7380 | 7388 | 7396 | 4     | 4.8  | 4.4 |
| 55  | 7404 | 7412 | 7419 | 7427 | 7435 | 7443 | 7451 | 7459 | 7466 | 7474 | 5     | 6.0  | 5.5 |
| 56  | 7482 | 7490 | 7497 | 7505 | 7513 | 7520 | 7528 | 7536 | 7543 | 7551 | 6     | 7.2  | 6.6 |
| 57  | 7559 | 7566 | 7574 | 7582 | 7589 | 7597 | 7604 | 7612 | 7619 | 7627 | 7     | 8.4  | 7.7 |
| 58  | 7634 | 7642 | 7649 | 7657 | 7664 | 7672 | 7679 | 7686 | 7694 | 7701 | 8     | 9.6  | 8.8 |
| 59  | 7709 | 7716 | 7723 | 7731 | 7738 | 7745 | 7752 | 7760 | 7767 | 7774 | 9     | 10.8 | 9.9 |
| 60  | 7782 | 7789 | 7796 | 7803 | 7810 | 7818 | 7825 | 7832 | 7839 | 7846 |       | 9    | 8   |
| 61  | 7853 | 7860 | 7868 | 7875 | 7882 | 7889 | 7896 | 7903 | 7910 | 7917 | 1     | 0.9  | 0.8 |
| 62  | 7924 | 7931 | 7938 | 7945 | 7952 | 7959 | 7966 | 7973 | 7980 | 7986 | 2     | 1.8  | 1.6 |
| 63  | 7993 | 8000 | 8007 | 8014 | 8021 | 8028 | 8035 | 8041 | 8048 | 8055 | 3     | 2.7  | 2.4 |
| 64  | 8062 | 8069 | 8075 | 8082 | 8089 | 8096 | 8102 | 8109 | 8116 | 8122 | 4     | 3.6  | 3.2 |
| 65  | 8129 | 8136 | 8142 | 8149 | 8156 | 8162 | 8169 | 8176 | 8182 | 8189 | 5     | 4.5  | 4.0 |
| 66  | 8195 | 8202 | 8209 | 8215 | 8222 | 8228 | 8235 | 8241 | 8248 | 8254 | 6     | 5.4  | 4.8 |
| 67  | 8261 | 8267 | 8274 | 8280 | 8287 | 8293 | 8299 | 8306 | 8312 | 8319 | 7     | 6.3  | 5.6 |
| 68  | 8325 | 8331 | 8338 | 8344 | 8351 | 8357 | 8363 | 8370 | 8376 | 8382 | 8     | 7.2  | 6.4 |
| 69  | 8388 | 8395 | 8401 | 8407 | 8414 | 8420 | 8426 | 8432 | 8439 | 8445 | 9     | 8.1  | 7.2 |
| 70  | 8451 | 8457 | 8463 | 8470 | 8476 | 8482 | 8488 | 8494 | 8500 | 8506 |       | 7    | 6   |
| 71  | 8513 | 8519 | 8525 | 8531 | 8537 | 8543 | 8549 | 8555 | 8561 | 8567 | 1     | 0.7  | 0.6 |
| 72  | 8573 | 8579 | 8585 | 8591 | 8597 | 8603 | 8609 | 8615 | 8621 | 8627 | 2     | 1.4  | 1.2 |
| 73  | 8633 | 8639 | 8645 | 8651 | 8657 | 8663 | 8669 | 8675 | 8681 | 8686 | 3     | 2.1  | 1.8 |
| 74  | 8692 | 8698 | 8704 | 8710 | 8716 | 8722 | 8727 | 8733 | 8739 | 8745 | 4     | 2.8  | 2.4 |
| 75  | 8751 | 8756 | 8762 | 8768 | 8774 | 8779 | 8785 | 8791 | 8797 | 8802 | 5     | 3.5  | 3.0 |
| 76  | 8808 | 8814 | 8820 | 8825 | 8831 | 8837 | 8842 | 8848 | 8854 | 8859 | 6     | 4.2  | 3.6 |
| 77  | 8865 | 8871 | 8876 | 8882 | 8887 | 8893 | 8899 | 8904 | 8910 | 8915 | 7     | 4.9  | 4.2 |
| 78  | 8921 | 8927 | 8932 | 8938 | 8943 | 8949 | 8954 | 8960 | 8965 | 8971 | 8     | 5.6  | 4.8 |
| 79  | 8976 | 8982 | 8987 | 8993 | 8998 | 9004 | 9009 | 9015 | 9020 | 9025 | 9     | 6.3  | 5.4 |
| 80  | 9031 | 9036 | 9042 | 9047 | 9053 | 9058 | 9063 | 9069 | 9074 | 9079 |       | 5    | 4   |
| 81  | 9085 | 9090 | 9096 | 9101 | 9106 | 9112 | 9117 | 9122 | 9128 | 9133 | 1     | 0.5  | 0.4 |
| 82  | 9138 | 9143 | 9149 | 9154 | 9159 | 9165 | 9170 | 9175 | 9180 | 9186 | 2     | 1.0  | 0.8 |
| 83  | 9191 | 9196 | 9201 | 9206 | 9212 | 9217 | 9222 | 9227 | 9232 | 9238 | 3     | 1.5  | 1.2 |
| 84  | 9243 | 9248 | 9253 | 9258 | 9263 | 9269 | 9274 | 9279 | 9284 | 9289 | 4     | 2.0  | 1.6 |
| 85  | 9294 | 9299 | 9304 | 9309 | 9315 | 9320 | 9325 | 9330 | 9335 | 9340 | 5     | 2.5  | 2.0 |
| 86  | 9345 | 9350 | 9355 | 9360 | 9365 | 9370 | 9375 | 9380 | 9385 | 9390 | 6     | 3.0  | 2.4 |
| 87  | 9395 | 9400 | 9405 | 9410 | 9415 | 9420 | 9425 | 9430 | 9435 | 9440 | 7     | 3.5  | 2.8 |
| 88  | 9445 | 9450 | 9455 | 9460 | 9465 | 9469 | 9474 | 9479 | 9484 | 9489 | 8     | 4.0  | 3.2 |
| 89  | 9494 | 9499 | 9504 | 9509 | 9513 | 9518 | 9523 | 9528 | 9533 | 9538 | 9     | 4.5  | 3.6 |
| 90  | 9542 | 9547 | 9552 | 9557 | 9562 | 9566 | 9571 | 9576 | 9581 | 9586 |       |      |     |
| 91  | 9590 | 9595 | 9600 | 9605 | 9609 | 9614 | 9619 | 9624 | 9628 | 9633 |       |      |     |
| 92  | 9638 | 9643 | 9647 | 9652 | 9657 | 9661 | 9666 | 9671 | 9675 | 9680 |       |      |     |
| 93  | 9685 | 9689 | 9694 | 9699 | 9703 | 9708 | 9713 | 9717 | 9722 | 9727 |       |      |     |
| 94  | 9731 | 9736 | 9741 | 9745 | 9750 | 9754 | 9759 | 9763 | 9768 | 9773 |       |      |     |
| 95  | 9777 | 9782 | 9786 | 9791 | 9795 | 9800 | 9805 | 9809 | 9814 | 9818 |       |      |     |
| 96  | 9823 | 9827 | 9832 | 9836 | 9841 | 9845 | 9850 | 9854 | 9859 | 9863 |       |      |     |
| 97  | 9868 | 9872 | 9877 | 9881 | 9886 | 9890 | 9894 | 9899 | 9903 | 9908 |       |      |     |
| 98  | 9912 | 9917 | 9921 | 9926 | 9930 | 9934 | 9939 | 9943 | 9948 | 9952 |       |      |     |
| 99  | 9956 | 9961 | 9965 | 9969 | 9974 | 9978 | 9983 | 9987 | 9991 | 9996 |       |      |     |
| 100 | 0000 | 0004 | 0009 | 0013 | 0017 | 0022 | 0026 | 0030 | 0035 | 0039 |       |      |     |
| N.  | L. 0 | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    |       |      |     |



| N.         | L. 0 | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | P. P. |     |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-----|
| <b>100</b> | 0000 | 0004 | 0009 | 0013 | 0017 | 0022 | 0026 | 0030 | 0035 | 0039 | 5     |     |
| 101        | 0043 | 0048 | 0052 | 0056 | 0060 | 0065 | 0069 | 0073 | 0077 | 0082 | 1     | 0.5 |
| 102        | 0086 | 0090 | 0095 | 0099 | 0103 | 0107 | 0111 | 0116 | 0120 | 0124 | 2     | 1.0 |
| 103        | 0128 | 0133 | 0137 | 0141 | 0145 | 0149 | 0154 | 0158 | 0162 | 0166 | 3     | 1.5 |
| 104        | 0170 | 0175 | 0179 | 0183 | 0187 | 0191 | 0195 | 0199 | 0204 | 0208 | 4     | 2.0 |
| 105        | 0212 | 0216 | 0220 | 0224 | 0228 | 0233 | 0237 | 0241 | 0245 | 0249 | 5     | 2.5 |
| 106        | 0253 | 0257 | 0261 | 0265 | 0269 | 0273 | 0278 | 0282 | 0286 | 0290 | 6     | 3.0 |
| 107        | 0294 | 0298 | 0302 | 0306 | 0310 | 0314 | 0318 | 0322 | 0326 | 0330 | 7     | 3.5 |
| 108        | 0334 | 0338 | 0342 | 0346 | 0350 | 0354 | 0358 | 0362 | 0366 | 0370 | 8     | 4.0 |
| 109        | 0374 | 0378 | 0382 | 0386 | 0390 | 0394 | 0398 | 0402 | 0406 | 0410 | 9     | 4.5 |
| <b>110</b> | 0414 | 0418 | 0422 | 0426 | 0430 | 0434 | 0438 | 0441 | 0445 | 0449 | 4     |     |
| 111        | 0453 | 0457 | 0461 | 0465 | 0469 | 0473 | 0477 | 0481 | 0484 | 0488 | 1     | 0.4 |
| 112        | 0492 | 0496 | 0500 | 0504 | 0508 | 0512 | 0515 | 0519 | 0523 | 0527 | 2     | 0.8 |
| 113        | 0531 | 0535 | 0538 | 0542 | 0546 | 0550 | 0554 | 0558 | 0561 | 0565 | 3     | 1.2 |
| 114        | 0569 | 0573 | 0577 | 0580 | 0584 | 0588 | 0592 | 0596 | 0599 | 0603 | 4     | 1.6 |
| 115        | 0607 | 0611 | 0615 | 0618 | 0622 | 0626 | 0630 | 0633 | 0637 | 0641 | 5     | 2.0 |
| 116        | 0645 | 0648 | 0652 | 0656 | 0660 | 0663 | 0667 | 0671 | 0674 | 0678 | 6     | 2.4 |
| 117        | 0682 | 0686 | 0689 | 0693 | 0697 | 0700 | 0704 | 0708 | 0711 | 0715 | 7     | 2.8 |
| 118        | 0719 | 0722 | 0726 | 0730 | 0734 | 0737 | 0741 | 0745 | 0748 | 0752 | 8     | 3.2 |
| 119        | 0755 | 0759 | 0763 | 0766 | 0770 | 0774 | 0777 | 0781 | 0785 | 0788 | 9     | 3.6 |
| <b>120</b> | 0792 | 0795 | 0799 | 0803 | 0806 | 0810 | 0813 | 0817 | 0821 | 0824 | 3     |     |
| 121        | 0828 | 0831 | 0835 | 0839 | 0842 | 0846 | 0849 | 0853 | 0856 | 0860 | 1     | 0.3 |
| 122        | 0864 | 0867 | 0871 | 0874 | 0878 | 0881 | 0885 | 0888 | 0892 | 0896 | 2     | 0.6 |
| 123        | 0899 | 0903 | 0906 | 0910 | 0913 | 0917 | 0920 | 0924 | 0927 | 0931 | 3     | 0.9 |
| 124        | 0934 | 0938 | 0941 | 0945 | 0948 | 0952 | 0955 | 0959 | 0962 | 0966 | 4     | 1.2 |
| 125        | 0969 | 0973 | 0976 | 0980 | 0983 | 0986 | 0990 | 0993 | 0997 | 1000 | 5     | 1.5 |
| 126        | 1004 | 1007 | 1011 | 1014 | 1017 | 1021 | 1024 | 1028 | 1031 | 1035 | 6     | 1.8 |
| 127        | 1038 | 1041 | 1045 | 1048 | 1052 | 1055 | 1059 | 1062 | 1065 | 1069 | 7     | 2.1 |
| 128        | 1072 | 1075 | 1079 | 1082 | 1086 | 1089 | 1093 | 1096 | 1099 | 1103 | 8     | 2.4 |
| 129        | 1106 | 1109 | 1113 | 1116 | 1119 | 1123 | 1126 | 1129 | 1133 | 1136 | 9     | 2.7 |
| <b>130</b> | 1139 | 1143 | 1146 | 1149 | 1153 | 1156 | 1159 | 1163 | 1166 | 1169 | 2     |     |
| 131        | 1173 | 1176 | 1179 | 1183 | 1186 | 1189 | 1193 | 1196 | 1199 | 1202 | 1     | 0.2 |
| 132        | 1206 | 1209 | 1212 | 1216 | 1219 | 1222 | 1225 | 1229 | 1232 | 1235 | 2     | 0.4 |
| 133        | 1239 | 1242 | 1245 | 1248 | 1252 | 1255 | 1258 | 1261 | 1265 | 1268 | 3     | 0.6 |
| 134        | 1271 | 1274 | 1278 | 1281 | 1284 | 1287 | 1290 | 1294 | 1297 | 1300 | 4     | 0.8 |
| 135        | 1303 | 1307 | 1310 | 1313 | 1316 | 1319 | 1323 | 1326 | 1329 | 1332 | 5     | 1.0 |
| 136        | 1335 | 1339 | 1342 | 1345 | 1348 | 1351 | 1355 | 1358 | 1361 | 1364 | 6     | 1.2 |
| 137        | 1367 | 1370 | 1374 | 1377 | 1380 | 1383 | 1386 | 1389 | 1392 | 1396 | 7     | 1.4 |
| 138        | 1399 | 1402 | 1405 | 1408 | 1411 | 1414 | 1418 | 1421 | 1424 | 1427 | 8     | 1.6 |
| 139        | 1430 | 1433 | 1436 | 1440 | 1443 | 1446 | 1449 | 1452 | 1455 | 1458 | 9     | 1.8 |
| <b>140</b> | 1461 | 1464 | 1467 | 1471 | 1474 | 1477 | 1480 | 1483 | 1486 | 1489 |       |     |
| 141        | 1492 | 1495 | 1498 | 1501 | 1504 | 1508 | 1511 | 1514 | 1517 | 1520 |       |     |
| 142        | 1523 | 1526 | 1529 | 1532 | 1535 | 1538 | 1541 | 1544 | 1547 | 1550 |       |     |
| 143        | 1553 | 1556 | 1559 | 1562 | 1565 | 1569 | 1572 | 1575 | 1578 | 1581 |       |     |
| 144        | 1584 | 1587 | 1590 | 1593 | 1596 | 1599 | 1602 | 1605 | 1608 | 1611 |       |     |
| 145        | 1614 | 1617 | 1620 | 1623 | 1626 | 1629 | 1632 | 1635 | 1638 | 1641 |       |     |
| 146        | 1644 | 1647 | 1649 | 1652 | 1655 | 1658 | 1661 | 1664 | 1667 | 1670 |       |     |
| 147        | 1673 | 1676 | 1679 | 1682 | 1685 | 1688 | 1691 | 1694 | 1697 | 1700 |       |     |
| 148        | 1703 | 1706 | 1708 | 1711 | 1714 | 1717 | 1720 | 1723 | 1726 | 1729 |       |     |
| 149        | 1732 | 1735 | 1738 | 1741 | 1744 | 1746 | 1749 | 1752 | 1755 | 1758 |       |     |
| <b>150</b> | 1761 | 1764 | 1767 | 1770 | 1772 | 1775 | 1778 | 1781 | 1784 | 1787 |       |     |
| N.         | L. 0 | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    |       |     |



| N.         | L. 0 | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | P. P. |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| <b>150</b> | 1761 | 1764 | 1767 | 1770 | 1772 | 1775 | 1778 | 1781 | 1784 | 1787 |       |
| 151        | 1790 | 1793 | 1796 | 1798 | 1801 | 1804 | 1807 | 1810 | 1813 | 1816 |       |
| 152        | 1818 | 1821 | 1824 | 1827 | 1830 | 1833 | 1836 | 1838 | 1841 | 1844 |       |
| 153        | 1847 | 1850 | 1853 | 1855 | 1858 | 1861 | 1864 | 1867 | 1870 | 1872 |       |
| 154        | 1875 | 1878 | 1881 | 1884 | 1886 | 1889 | 1892 | 1895 | 1898 | 1901 |       |
| 155        | 1903 | 1906 | 1909 | 1912 | 1915 | 1917 | 1920 | 1923 | 1926 | 1928 |       |
| 156        | 1931 | 1934 | 1937 | 1940 | 1942 | 1945 | 1948 | 1951 | 1953 | 1956 |       |
| 157        | 1959 | 1962 | 1965 | 1967 | 1970 | 1973 | 1976 | 1978 | 1981 | 1984 |       |
| 158        | 1987 | 1989 | 1992 | 1995 | 1998 | 2000 | 2003 | 2006 | 2009 | 2011 |       |
| 159        | 2014 | 2017 | 2019 | 2022 | 2025 | 2028 | 2030 | 2033 | 2036 | 2038 |       |
| <b>160</b> | 2041 | 2044 | 2047 | 2049 | 2052 | 2055 | 2057 | 2060 | 2063 | 2066 | 3     |
| 161        | 2068 | 2071 | 2074 | 2076 | 2079 | 2082 | 2084 | 2087 | 2090 | 2092 | 1 0.3 |
| 162        | 2095 | 2098 | 2101 | 2103 | 2106 | 2109 | 2111 | 2114 | 2117 | 2119 | 2 0.6 |
| 163        | 2122 | 2125 | 2127 | 2130 | 2133 | 2135 | 2138 | 2140 | 2143 | 2146 | 3 0.9 |
| 164        | 2148 | 2151 | 2154 | 2156 | 2159 | 2162 | 2164 | 2167 | 2170 | 2172 | 4 1.2 |
| 165        | 2175 | 2177 | 2180 | 2183 | 2185 | 2188 | 2191 | 2193 | 2196 | 2198 | 5 1.5 |
| 166        | 2201 | 2204 | 2206 | 2209 | 2212 | 2214 | 2217 | 2219 | 2222 | 2225 | 6 1.8 |
| 167        | 2227 | 2230 | 2232 | 2235 | 2238 | 2240 | 2243 | 2245 | 2248 | 2251 | 7 2.1 |
| 168        | 2253 | 2256 | 2258 | 2261 | 2263 | 2266 | 2269 | 2271 | 2274 | 2276 | 8 2.4 |
| 169        | 2279 | 2281 | 2284 | 2287 | 2289 | 2292 | 2294 | 2297 | 2299 | 2302 | 9 2.7 |
| <b>170</b> | 2304 | 2307 | 2310 | 2312 | 2315 | 2317 | 2320 | 2322 | 2325 | 2327 |       |
| 171        | 2330 | 2333 | 2335 | 2338 | 2340 | 2343 | 2345 | 2348 | 2350 | 2353 |       |
| 172        | 2355 | 2358 | 2360 | 2363 | 2365 | 2368 | 2370 | 2373 | 2375 | 2378 |       |
| 173        | 2380 | 2383 | 2385 | 2388 | 2390 | 2393 | 2395 | 2398 | 2400 | 2403 |       |
| 174        | 2405 | 2408 | 2410 | 2413 | 2415 | 2418 | 2420 | 2423 | 2425 | 2428 |       |
| 175        | 2430 | 2433 | 2435 | 2438 | 2440 | 2443 | 2445 | 2448 | 2450 | 2453 |       |
| 176        | 2455 | 2458 | 2460 | 2463 | 2465 | 2467 | 2470 | 2472 | 2475 | 2477 |       |
| 177        | 2480 | 2482 | 2485 | 2487 | 2490 | 2492 | 2494 | 2497 | 2499 | 2502 |       |
| 178        | 2504 | 2507 | 2509 | 2512 | 2514 | 2516 | 2519 | 2521 | 2524 | 2526 |       |
| 179        | 2529 | 2531 | 2533 | 2536 | 2538 | 2541 | 2543 | 2545 | 2548 | 2550 |       |
| <b>180</b> | 2553 | 2555 | 2558 | 2560 | 2562 | 2565 | 2567 | 2570 | 2572 | 2574 | 2     |
| 181        | 2577 | 2579 | 2582 | 2584 | 2586 | 2589 | 2591 | 2594 | 2596 | 2598 | 1 0.2 |
| 182        | 2601 | 2603 | 2605 | 2608 | 2610 | 2613 | 2615 | 2617 | 2620 | 2622 | 2 0.4 |
| 183        | 2625 | 2627 | 2629 | 2632 | 2634 | 2636 | 2639 | 2641 | 2643 | 2646 | 3 0.6 |
| 184        | 2648 | 2651 | 2653 | 2655 | 2658 | 2660 | 2662 | 2665 | 2667 | 2669 | 4 0.8 |
| 185        | 2672 | 2674 | 2676 | 2679 | 2681 | 2683 | 2686 | 2688 | 2690 | 2693 | 5 1.0 |
| 186        | 2695 | 2697 | 2700 | 2702 | 2704 | 2707 | 2709 | 2711 | 2714 | 2716 | 6 1.2 |
| 187        | 2718 | 2721 | 2723 | 2725 | 2728 | 2730 | 2732 | 2735 | 2737 | 2739 | 7 1.4 |
| 188        | 2742 | 2744 | 2746 | 2749 | 2751 | 2753 | 2755 | 2758 | 2760 | 2762 | 8 1.6 |
| 189        | 2765 | 2767 | 2769 | 2772 | 2774 | 2776 | 2778 | 2781 | 2783 | 2785 | 9 1.8 |
| <b>190</b> | 2788 | 2790 | 2792 | 2794 | 2797 | 2799 | 2801 | 2804 | 2806 | 2808 |       |
| 191        | 2810 | 2813 | 2815 | 2817 | 2819 | 2822 | 2824 | 2826 | 2828 | 2831 |       |
| 192        | 2833 | 2835 | 2838 | 2840 | 2842 | 2844 | 2847 | 2849 | 2851 | 2853 |       |
| 193        | 2856 | 2858 | 2860 | 2862 | 2865 | 2867 | 2869 | 2871 | 2874 | 2876 |       |
| 194        | 2878 | 2880 | 2883 | 2885 | 2887 | 2889 | 2891 | 2894 | 2896 | 2898 |       |
| 195        | 2900 | 2903 | 2905 | 2907 | 2909 | 2911 | 2914 | 2916 | 2918 | 2920 |       |
| 196        | 2923 | 2925 | 2927 | 2929 | 2931 | 2934 | 2936 | 2938 | 2940 | 2942 |       |
| 197        | 2945 | 2947 | 2949 | 2951 | 2953 | 2956 | 2958 | 2960 | 2962 | 2964 |       |
| 198        | 2967 | 2969 | 2971 | 2973 | 2975 | 2978 | 2980 | 2982 | 2984 | 2986 |       |
| 199        | 2989 | 2991 | 2993 | 2995 | 2997 | 2999 | 3002 | 3004 | 3006 | 3008 |       |
| <b>200</b> | 3010 | 3012 | 3015 | 3017 | 3019 | 3021 | 3023 | 3025 | 3028 | 3030 |       |
| N.         | L. 0 | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    |       |







|    | 00   | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 60   | 70   | 80   | 90   | 100  | 110  | 120  | 130  | 140  | 150  | 160  | 170  | 180  | 190  | 200  | 210  | P. P. |         |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| 30 | 9409 | 4181 | 6401 | 7865 | 8960 | 9836 | 0567 | 1194 | 1745 | 2236 | 2680 | 3085 | 3458 | 3804 | 4127 | 4430 | 4716 | 4987 | 5245 | 5491 | 5727 | 5954 | 8     | 7       |
| 31 | 9551 | 4229 | 6430 | 7886 | 8976 | 9849 | 0578 | 1204 | 1754 | 2244 | 2687 | 3091 | 3464 | 3809 | 4132 | 4435 | 4721 | 4992 | 5249 | 5496 | 5731 | 5958 | 1     | 0.8 0.7 |
| 32 | 9689 | 4276 | 6459 | 7906 | 8992 | 9862 | 0589 | 1214 | 1762 | 2252 | 2694 | 3098 | 3469 | 3815 | 4137 | 4440 | 4725 | 4996 | 5254 | 5500 | 5735 | 5961 | 2     | 1.6 1.4 |
| 33 | 9823 | 4323 | 6487 | 7927 | 9008 | 9875 | 0600 | 1223 | 1771 | 2259 | 2701 | 3104 | 3475 | 3820 | 4142 | 4445 | 4730 | 5000 | 5258 | 5504 | 5739 | 5965 | 3     | 2.4 2.1 |
| 34 | 9952 | 4370 | 6515 | 7947 | 9024 | 9888 | 0611 | 1233 | 1779 | 2267 | 2708 | 3110 | 3481 | 3826 | 4147 | 4449 | 4735 | 5005 | 5262 | 5508 | 5743 | 5969 | 4     | 3.2 2.8 |
| 35 | 0078 | 4416 | 6544 | 7967 | 9040 | 9901 | 0622 | 1243 | 1788 | 2275 | 2715 | 3117 | 3487 | 3831 | 4153 | 4454 | 4739 | 5009 | 5266 | 5512 | 5747 | 5972 | 5     | 4.0 3.5 |
| 36 | 0200 | 4461 | 6571 | 7988 | 9056 | 9915 | 0633 | 1252 | 1797 | 2282 | 2722 | 3123 | 3493 | 3837 | 4158 | 4459 | 4744 | 5014 | 5270 | 5516 | 5750 | 5976 | 6     | 4.8 4.2 |
| 37 | 0319 | 4506 | 6599 | 8008 | 9071 | 9928 | 0645 | 1262 | 1805 | 2290 | 2729 | 3130 | 3499 | 3842 | 4163 | 4464 | 4748 | 5018 | 5275 | 5520 | 5754 | 5980 | 7     | 5.6 4.9 |
| 38 | 0435 | 4551 | 6627 | 8028 | 9087 | 9940 | 0656 | 1272 | 1814 | 2298 | 2736 | 3136 | 3505 | 3848 | 4168 | 4469 | 4753 | 5022 | 5279 | 5524 | 5758 | 5984 | 8     | 6.4 5.6 |
| 39 | 0548 | 4595 | 6654 | 8048 | 9103 | 9953 | 0667 | 1281 | 1822 | 2305 | 2743 | 3142 | 3511 | 3853 | 4173 | 4474 | 4758 | 5027 | 5283 | 5528 | 5762 | 5987 | 9     | 7.2 6.3 |
| 40 | 0658 | 4638 | 6682 | 8067 | 9118 | 9966 | 0678 | 1291 | 1831 | 2313 | 2750 | 3149 | 3517 | 3859 | 4178 | 4479 | 4762 | 5031 | 5287 | 5531 | 5766 | 5991 | 6     | 5       |
| 41 | 0765 | 4682 | 6709 | 8087 | 9134 | 9979 | 0688 | 1300 | 1839 | 2321 | 2757 | 3155 | 3523 | 3864 | 4184 | 4484 | 4767 | 5035 | 5291 | 5535 | 5770 | 5995 | 1     | 0.6 0.5 |
| 42 | 0870 | 4725 | 6736 | 8107 | 9150 | 9992 | 0699 | 1310 | 1848 | 2328 | 2764 | 3162 | 3529 | 3870 | 4189 | 4488 | 4771 | 5040 | 5295 | 5539 | 5773 | 5998 | 2     | 1.2 1.0 |
| 43 | 0972 | 4767 | 6762 | 8126 | 9165 | 0005 | 0710 | 1319 | 1856 | 2336 | 2770 | 3168 | 3535 | 3875 | 4194 | 4493 | 4776 | 5044 | 5300 | 5543 | 5777 | 6002 | 3     | 1.8 1.5 |
| 44 | 1072 | 4809 | 6789 | 8146 | 9180 | 0017 | 0721 | 1329 | 1864 | 2343 | 2777 | 3174 | 3541 | 3881 | 4199 | 4498 | 4781 | 5049 | 5304 | 5547 | 5781 | 6006 | 4     | 2.4 2.0 |
| 45 | 1170 | 4851 | 6815 | 8165 | 9196 | 0030 | 0732 | 1338 | 1873 | 2351 | 2784 | 3181 | 3546 | 3886 | 4204 | 4503 | 4785 | 5053 | 5308 | 5551 | 5785 | 6009 | 5     | 3.0 2.5 |
| 46 | 1265 | 4892 | 6842 | 8185 | 9211 | 0043 | 0743 | 1348 | 1881 | 2359 | 2791 | 3187 | 3552 | 3892 | 4209 | 4508 | 4790 | 5057 | 5312 | 5555 | 5789 | 6013 | 6     | 3.6 3.0 |
| 47 | 1359 | 4933 | 6868 | 8204 | 9226 | 0055 | 0754 | 1357 | 1890 | 2366 | 2798 | 3193 | 3558 | 3897 | 4214 | 4513 | 4794 | 5062 | 5316 | 5559 | 5792 | 6017 | 7     | 4.2 3.5 |
| 48 | 1450 | 4973 | 6894 | 8223 | 9241 | 0068 | 0764 | 1367 | 1898 | 2374 | 2805 | 3200 | 3564 | 3903 | 4220 | 4517 | 4799 | 5066 | 5320 | 5563 | 5796 | 6020 | 8     | 4.8 4.0 |
| 49 | 1540 | 5013 | 6920 | 8242 | 9256 | 0080 | 0775 | 1376 | 1906 | 2381 | 2812 | 3206 | 3570 | 3908 | 4225 | 4522 | 4803 | 5070 | 5324 | 5567 | 5800 | 6024 | 9     | 5.4 4.5 |
| 50 | 1627 | 5053 | 6945 | 8261 | 9272 | 0093 | 0786 | 1385 | 1915 | 2389 | 2819 | 3212 | 3576 | 3914 | 4230 | 4527 | 4808 | 5075 | 5329 | 5571 | 5804 | 6028 | 4     | 3       |
| 51 | 1713 | 5092 | 6971 | 8280 | 9287 | 0105 | 0796 | 1395 | 1923 | 2396 | 2825 | 3219 | 3581 | 3919 | 4235 | 4532 | 4813 | 5079 | 5333 | 5575 | 5808 | 6031 | 1     | 0.4 0.3 |
| 52 | 1798 | 5131 | 6996 | 8299 | 9302 | 0118 | 0807 | 1404 | 1931 | 2404 | 2832 | 3225 | 3587 | 3924 | 4240 | 4537 | 4817 | 5083 | 5337 | 5579 | 5811 | 6035 | 2     | 0.8 0.6 |
| 53 | 1880 | 5170 | 7021 | 8317 | 9316 | 0130 | 0818 | 1413 | 1940 | 2411 | 2839 | 3231 | 3593 | 3930 | 4245 | 4541 | 4822 | 5088 | 5341 | 5583 | 5815 | 6039 | 3     | 1.2 0.9 |
| 54 | 1962 | 5208 | 7046 | 8336 | 9331 | 0143 | 0828 | 1423 | 1948 | 2419 | 2846 | 3237 | 3599 | 3935 | 4250 | 4546 | 4826 | 5092 | 5345 | 5587 | 5819 | 6042 | 4     | 1.6 1.2 |
| 55 | 2041 | 5246 | 7071 | 8355 | 9346 | 0155 | 0839 | 1432 | 1956 | 2426 | 2853 | 3244 | 3605 | 3941 | 4255 | 4551 | 4831 | 5096 | 5349 | 5591 | 5823 | 6046 | 5     | 2.0 1.5 |
| 56 | 2120 | 5283 | 7096 | 8373 | 9361 | 0167 | 0849 | 1441 | 1964 | 2434 | 2859 | 3250 | 3611 | 3946 | 4260 | 4556 | 4835 | 5101 | 5353 | 5595 | 5827 | 6050 | 6     | 2.4 1.8 |
| 57 | 2196 | 5321 | 7121 | 8392 | 9376 | 0180 | 0860 | 1450 | 1973 | 2441 | 2866 | 3256 | 3616 | 3952 | 4265 | 4561 | 4840 | 5105 | 5357 | 5599 | 5830 | 6053 | 7     | 2.8 2.1 |
| 58 | 2272 | 5358 | 7145 | 8410 | 9390 | 0192 | 0871 | 1460 | 1981 | 2448 | 2873 | 3262 | 3622 | 3957 | 4270 | 4565 | 4844 | 5109 | 5362 | 5603 | 5834 | 6057 | 8     | 3.2 2.4 |
| 59 | 2346 | 5394 | 7170 | 8428 | 9405 | 0204 | 0881 | 1469 | 1989 | 2456 | 2880 | 3269 | 3628 | 3962 | 4275 | 4570 | 4849 | 5113 | 5366 | 5607 | 5838 | 6060 | 9     | 3.6 2.7 |
| 8  | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9     |         |







|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



Log. Tangens  $45^0-67^0$ .

|    | 450  | 460  | 470  | 480  | 490  | 500  | 510  | 520  | 530  | 540  | 550  | 560  | 570  | 580  | 590  | 600  | 610  | 620  | 630  | 640  | 650  | 660  | 670  | P.P.  |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 0  | 0000 | 0152 | 0303 | 0456 | 0608 | 0762 | 0916 | 1072 | 1229 | 1387 | 1548 | 1710 | 1875 | 2042 | 2212 | 2386 | 2562 | 2743 | 2928 | 3118 | 3313 | 3514 | 3721 | 2     |
| 1  | 0003 | 0154 | 0306 | 0458 | 0611 | 0764 | 0919 | 1075 | 1231 | 1390 | 1550 | 1713 | 1878 | 2045 | 2215 | 2389 | 2565 | 2746 | 2931 | 3121 | 3317 | 3518 | 3725 | 1 0.2 |
| 2  | 0005 | 0157 | 0309 | 0461 | 0613 | 0767 | 0921 | 1077 | 1234 | 1393 | 1553 | 1716 | 1880 | 2048 | 2218 | 2391 | 2568 | 2749 | 2935 | 3125 | 3320 | 3521 | 3729 | 2 0.4 |
| 3  | 0008 | 0159 | 0311 | 0463 | 0616 | 0770 | 0924 | 1080 | 1237 | 1395 | 1556 | 1718 | 1883 | 2051 | 2221 | 2394 | 2571 | 2752 | 2938 | 3128 | 3323 | 3524 | 3732 | 3 0.6 |
| 4  | 0010 | 0162 | 0314 | 0466 | 0619 | 0772 | 0927 | 1082 | 1239 | 1398 | 1558 | 1721 | 1886 | 2053 | 2224 | 2397 | 2574 | 2755 | 2941 | 3131 | 3326 | 3528 | 3736 | 4 0.8 |
| 5  | 0013 | 0164 | 0316 | 0468 | 0621 | 0775 | 0929 | 1085 | 1242 | 1401 | 1561 | 1724 | 1889 | 2056 | 2227 | 2400 | 2577 | 2759 | 2944 | 3134 | 3330 | 3531 | 3739 | 5 1.0 |
| 6  | 0015 | 0167 | 0319 | 0471 | 0624 | 0777 | 0932 | 1088 | 1245 | 1403 | 1564 | 1726 | 1891 | 2059 | 2229 | 2403 | 2580 | 2762 | 2947 | 3137 | 3333 | 3535 | 3743 | 6 1.2 |
| 7  | 0018 | 0169 | 0321 | 0473 | 0626 | 0780 | 0934 | 1090 | 1247 | 1406 | 1567 | 1729 | 1894 | 2062 | 2232 | 2406 | 2583 | 2765 | 2950 | 3141 | 3336 | 3538 | 3746 | 7 1.4 |
| 8  | 0020 | 0172 | 0324 | 0476 | 0629 | 0782 | 0937 | 1093 | 1250 | 1409 | 1569 | 1732 | 1897 | 2065 | 2235 | 2409 | 2586 | 2768 | 2953 | 3144 | 3340 | 3541 | 3750 | 8 1.6 |
| 9  | 0023 | 0174 | 0326 | 0478 | 0631 | 0785 | 0940 | 1095 | 1253 | 1411 | 1572 | 1735 | 1900 | 2067 | 2238 | 2412 | 2589 | 2771 | 2957 | 3147 | 3343 | 3545 | 3753 | 9 1.8 |
| 10 | 0025 | 0177 | 0329 | 0481 | 0634 | 0788 | 0942 | 1098 | 1255 | 1414 | 1575 | 1737 | 1903 | 2070 | 2241 | 2415 | 2592 | 2774 | 2960 | 3150 | 3346 | 3548 | 3757 |       |
| 11 | 0028 | 0179 | 0331 | 0484 | 0636 | 0790 | 0945 | 1101 | 1258 | 1417 | 1577 | 1740 | 1905 | 2073 | 2244 | 2418 | 2595 | 2777 | 2963 | 3154 | 3350 | 3552 | 3760 |       |
| 12 | 0030 | 0182 | 0334 | 0486 | 0639 | 0793 | 0947 | 1103 | 1260 | 1419 | 1580 | 1743 | 1908 | 2076 | 2247 | 2421 | 2598 | 2780 | 2966 | 3157 | 3353 | 3555 | 3764 |       |
| 13 | 0033 | 0184 | 0336 | 0489 | 0642 | 0795 | 0950 | 1106 | 1263 | 1422 | 1583 | 1746 | 1911 | 2079 | 2250 | 2424 | 2601 | 2783 | 2969 | 3160 | 3356 | 3559 | 3767 |       |
| 14 | 0035 | 0187 | 0339 | 0491 | 0644 | 0798 | 0953 | 1108 | 1266 | 1425 | 1585 | 1748 | 1914 | 2082 | 2252 | 2427 | 2604 | 2786 | 2972 | 3163 | 3360 | 3562 | 3771 |       |
| 15 | 0038 | 0190 | 0341 | 0494 | 0647 | 0800 | 0955 | 1111 | 1268 | 1427 | 1588 | 1751 | 1916 | 2084 | 2255 | 2429 | 2607 | 2789 | 2975 | 3166 | 3363 | 3565 | 3774 |       |
| 16 | 0040 | 0192 | 0344 | 0496 | 0649 | 0803 | 0958 | 1114 | 1271 | 1430 | 1591 | 1754 | 1919 | 2087 | 2258 | 2432 | 2610 | 2792 | 2978 | 3170 | 3366 | 3569 | 3778 |       |
| 17 | 0043 | 0195 | 0347 | 0499 | 0652 | 0806 | 0960 | 1116 | 1274 | 1433 | 1594 | 1757 | 1922 | 2090 | 2261 | 2435 | 2613 | 2795 | 2982 | 3173 | 3370 | 3572 | 3781 |       |
| 18 | 0045 | 0197 | 0349 | 0501 | 0654 | 0808 | 0963 | 1119 | 1276 | 1435 | 1596 | 1759 | 1925 | 2093 | 2264 | 2438 | 2616 | 2798 | 2985 | 3176 | 3373 | 3576 | 3785 |       |
| 19 | 0048 | 0200 | 0352 | 0504 | 0657 | 0811 | 0965 | 1121 | 1279 | 1438 | 1599 | 1762 | 1928 | 2096 | 2267 | 2441 | 2619 | 2801 | 2988 | 3179 | 3376 | 3579 | 3789 |       |
| 20 | 0051 | 0202 | 0354 | 0506 | 0659 | 0813 | 0968 | 1124 | 1282 | 1441 | 1602 | 1765 | 1930 | 2098 | 2270 | 2444 | 2622 | 2804 | 2991 | 3183 | 3380 | 3583 | 3792 | 3     |
| 21 | 0053 | 0205 | 0357 | 0509 | 0662 | 0816 | 0971 | 1127 | 1284 | 1443 | 1604 | 1767 | 1933 | 2101 | 2273 | 2447 | 2625 | 2808 | 2994 | 3186 | 3383 | 3586 | 3796 | 1 0.3 |
| 22 | 0056 | 0207 | 0359 | 0512 | 0665 | 0818 | 0973 | 1129 | 1287 | 1446 | 1607 | 1770 | 1936 | 2104 | 2275 | 2450 | 2628 | 2811 | 2997 | 3189 | 3386 | 3589 | 3799 | 2 0.6 |
| 23 | 0058 | 0210 | 0362 | 0514 | 0667 | 0821 | 0976 | 1132 | 1289 | 1449 | 1610 | 1773 | 1939 | 2107 | 2278 | 2453 | 2631 | 2814 | 3001 | 3192 | 3390 | 3593 | 3803 | 3 0.9 |
| 24 | 0061 | 0212 | 0364 | 0517 | 0670 | 0824 | 0978 | 1135 | 1292 | 1451 | 1612 | 1776 | 1941 | 2110 | 2281 | 2456 | 2634 | 2817 | 3004 | 3196 | 3393 | 3596 | 3806 | 4 1.2 |
| 25 | 0063 | 0215 | 0367 | 0519 | 0672 | 0826 | 0981 | 1137 | 1295 | 1454 | 1615 | 1778 | 1944 | 2113 | 2284 | 2459 | 2637 | 2820 | 3007 | 3199 | 3396 | 3600 | 3810 | 5 1.5 |
| 26 | 0066 | 0217 | 0369 | 0522 | 0675 | 0829 | 0984 | 1140 | 1297 | 1457 | 1618 | 1781 | 1947 | 2115 | 2287 | 2462 | 2640 | 2823 | 3010 | 3202 | 3400 | 3603 | 3813 | 6 1.8 |
| 27 | 0068 | 0220 | 0372 | 0524 | 0677 | 0831 | 0986 | 1142 | 1300 | 1459 | 1621 | 1784 | 1950 | 2118 | 2290 | 2465 | 2643 | 2826 | 3013 | 3205 | 3403 | 3607 | 3817 | 7 2.1 |
| 28 | 0071 | 0222 | 0374 | 0527 | 0680 | 0834 | 0989 | 1145 | 1303 | 1462 | 1623 | 1787 | 1953 | 2121 | 2293 | 2468 | 2646 | 2829 | 3016 | 3209 | 3406 | 3610 | 3821 | 8 2.4 |
| 29 | 0073 | 0225 | 0377 | 0529 | 0682 | 0836 | 0991 | 1148 | 1305 | 1465 | 1626 | 1789 | 1955 | 2124 | 2296 | 2471 | 2649 | 2832 | 3019 | 3212 | 3410 | 3614 | 3824 | 9 2.7 |
|    | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10    |











| P. P. | P. P. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       | 9     | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   |
| 1     | 0.9   | 1.1  | 1.3  | 1.5  | 1.7  | 1.9  | 2.1  | 2.3  | 2.5  | 2.7  |
| 2     | 1.8   | 2.2  | 2.6  | 3.0  | 3.4  | 3.8  | 4.2  | 4.6  | 5.0  | 5.4  |
| 3     | 2.7   | 3.3  | 3.9  | 4.5  | 5.1  | 5.7  | 6.3  | 6.9  | 7.5  | 8.1  |
| 4     | 3.6   | 4.4  | 5.2  | 6.0  | 6.8  | 7.6  | 8.4  | 9.2  | 10.0 | 10.8 |
| 5     | 4.5   | 5.5  | 6.5  | 7.5  | 8.5  | 9.5  | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
| 6     | 5.4   | 6.6  | 7.8  | 9.0  | 10.2 | 11.4 | 12.6 | 13.8 | 15.0 | 16.2 |
| 7     | 6.3   | 7.7  | 9.1  | 10.5 | 11.9 | 13.3 | 14.7 | 16.1 | 17.5 | 18.9 |
| 8     | 7.2   | 8.8  | 10.4 | 12.0 | 13.6 | 15.2 | 16.8 | 18.4 | 20.0 | 21.6 |
| 9     | 8.1   | 9.9  | 11.7 | 13.5 | 15.3 | 17.1 | 18.9 | 20.7 | 22.5 | 24.3 |
| 10    | 9.0   | 10.9 | 12.9 | 14.9 | 16.9 | 18.9 | 20.9 | 22.9 | 24.9 | 26.9 |
| 11    | 10.0  | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 |
| 12    | 11.0  | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 27.0 | 29.0 |
| 13    | 12.0  | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 30.0 |
| 14    | 13.0  | 15.0 | 17.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 27.0 | 29.0 | 31.0 |
| 15    | 14.0  | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 |
| 16    | 15.0  | 17.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 27.0 | 29.0 | 31.0 | 33.0 |
| 17    | 16.0  | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 34.0 |
| 18    | 17.0  | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 27.0 | 29.0 | 31.0 | 33.0 | 35.0 |
| 19    | 18.0  | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 34.0 | 36.0 |
| 20    | 19.0  | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 27.0 | 29.0 | 31.0 | 33.0 | 35.0 | 37.0 |
| 21    | 20.0  | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 |
| 22    | 21.0  | 23.0 | 25.0 | 27.0 | 29.0 | 31.0 | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 39.0 |
| 23    | 22.0  | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 |
| 24    | 23.0  | 25.0 | 27.0 | 29.0 | 31.0 | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 |
| 25    | 24.0  | 26.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 |
| 26    | 25.0  | 27.0 | 29.0 | 31.0 | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 |
| 27    | 26.0  | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 |
| 28    | 27.0  | 29.0 | 31.0 | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 |
| 29    | 28.0  | 30.0 | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 |
| 30    | 29.0  | 31.0 | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 |
| 31    | 30.0  | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 | 48.0 |
| 32    | 31.0  | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 |
| 33    | 32.0  | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 |
| 34    | 33.0  | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 |
| 35    | 34.0  | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 |
| 36    | 35.0  | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 |
| 37    | 36.0  | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 |
| 38    | 37.0  | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 |
| 39    | 38.0  | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 |
| 40    | 39.0  | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 |
| 41    | 40.0  | 42.0 | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 |
| 42    | 41.0  | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 |
| 43    | 42.0  | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 |
| 44    | 43.0  | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 |
| 45    | 44.0  | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 |
| 46    | 45.0  | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 | 63.0 |
| 47    | 46.0  | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 64.0 |
| 48    | 47.0  | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 | 63.0 | 65.0 |
| 49    | 48.0  | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 64.0 | 66.0 |
| 50    | 49.0  | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 | 63.0 | 65.0 | 67.0 |
| 51    | 50.0  | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 64.0 | 66.0 | 68.0 |
| 52    | 51.0  | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 | 63.0 | 65.0 | 67.0 | 69.0 |
| 53    | 52.0  | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 64.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 |
| 54    | 53.0  | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 | 63.0 | 65.0 | 67.0 | 69.0 | 71.0 |
| 55    | 54.0  | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 64.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 |
| 56    | 55.0  | 57.0 | 59.0 | 61.0 | 63.0 | 65.0 | 67.0 | 69.0 | 71.0 | 73.0 |
| 57    | 56.0  | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 64.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 |
| 58    | 57.0  | 59.0 | 61.0 | 63.0 | 65.0 | 67.0 | 69.0 | 71.0 | 73.0 | 75.0 |
| 59    | 58.0  | 60.0 | 62.0 | 64.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 |
| 60    | 59.0  | 61.0 | 63.0 | 65.0 | 67.0 | 69.0 | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 77.0 |



|    | 00   | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 60   | 70   | 80   | 90   | 100  | 110  | 120  | 130  | 140  | 150  | 160  | 170  | 180  | 190  | 200  | 210  | P. P. |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 15    | 14   |
| 0  | —    | 2419 | 5428 | 7188 | 8436 | 9403 | 0192 | 0859 | 1436 | 1943 | 2397 | 2806 | 3179 | 3521 | 3837 | 4130 | 4403 | 4659 | 4900 | 5126 | 5341 | 5543 |       |      |
| 1  | 4637 | 2490 | 5464 | 7212 | 8454 | 9417 | 0204 | 0869 | 1445 | 1951 | 2404 | 2812 | 3185 | 3526 | 3842 | 4135 | 4408 | 4663 | 4904 | 5130 | 5344 | 5547 | 1.5   | 1.4  |
| 2  | 7648 | 2561 | 5500 | 7236 | 8472 | 9432 | 0216 | 0879 | 1453 | 1959 | 2411 | 2819 | 3191 | 3532 | 3847 | 4139 | 4412 | 4668 | 4908 | 5134 | 5347 | 5550 | 3.0   | 2.8  |
| 3  | 9408 | 2630 | 5535 | 7260 | 8490 | 9446 | 0228 | 0890 | 1462 | 1967 | 2418 | 2825 | 3197 | 3537 | 3852 | 4144 | 4417 | 4672 | 4911 | 5137 | 5351 | 5553 | 4.5   | 4.2  |
| 4  | 0658 | 2699 | 5571 | 7283 | 8508 | 9460 | 0240 | 0900 | 1471 | 1975 | 2425 | 2832 | 3202 | 3543 | 3857 | 4149 | 4421 | 4676 | 4915 | 5141 | 5354 | 5557 | 6.0   | 5.6  |
| 5  | 1627 | 2766 | 5605 | 7307 | 8525 | 9475 | 0252 | 0910 | 1480 | 1983 | 2432 | 2838 | 3208 | 3548 | 3862 | 4153 | 4425 | 4680 | 4919 | 5145 | 5358 | 5560 | 7.5   | 7.0  |
| 6  | 2419 | 2832 | 5640 | 7330 | 8543 | 9489 | 0264 | 0920 | 1489 | 1991 | 2439 | 2845 | 3214 | 3554 | 3867 | 4158 | 4430 | 4684 | 4923 | 5148 | 5361 | 5563 | 9.0   | 8.4  |
| 7  | 3088 | 2898 | 5674 | 7354 | 8560 | 9503 | 0276 | 0930 | 1498 | 1999 | 2447 | 2851 | 3220 | 3559 | 3872 | 4163 | 4434 | 4688 | 4927 | 5152 | 5365 | 5566 | 10.5  | 9.8  |
| 8  | 3668 | 2962 | 5708 | 7377 | 8578 | 9517 | 0287 | 0940 | 1507 | 2007 | 2454 | 2858 | 3226 | 3564 | 3877 | 4168 | 4438 | 4692 | 4931 | 5156 | 5368 | 5570 | 12.0  | 11.2 |
| 9  | 4180 | 3025 | 5742 | 7400 | 8595 | 9531 | 0299 | 0951 | 1516 | 2015 | 2461 | 2864 | 3232 | 3570 | 3882 | 4172 | 4443 | 4696 | 4935 | 5159 | 5372 | 5573 | 13.5  | 12.6 |
| 10 | 4637 | 3088 | 5776 | 7423 | 8613 | 9545 | 0311 | 0961 | 1525 | 2022 | 2468 | 2870 | 3238 | 3575 | 3887 | 4177 | 4447 | 4700 | 4939 | 5163 | 5375 | 5576 | 13    | 12   |
| 11 | 5051 | 3150 | 5809 | 7445 | 8630 | 9559 | 0323 | 0971 | 1533 | 2030 | 2475 | 2877 | 3244 | 3581 | 3892 | 4181 | 4452 | 4705 | 4942 | 5167 | 5379 | 5579 | 1.3   | 1.2  |
| 12 | 5429 | 3210 | 5842 | 7468 | 8647 | 9573 | 0334 | 0981 | 1542 | 2038 | 2482 | 2883 | 3250 | 3586 | 3897 | 4186 | 4456 | 4709 | 4946 | 5170 | 5382 | 5583 | 2.6   | 2.4  |
| 13 | 5777 | 3270 | 5875 | 7491 | 8665 | 9587 | 0346 | 0991 | 1551 | 2046 | 2489 | 2890 | 3255 | 3591 | 3902 | 4191 | 4460 | 4713 | 4950 | 5174 | 5385 | 5586 | 3.9   | 3.6  |
| 14 | 6099 | 3329 | 5907 | 7513 | 8682 | 9601 | 0357 | 1001 | 1560 | 2054 | 2496 | 2896 | 3261 | 3597 | 3907 | 4195 | 4465 | 4717 | 4954 | 5177 | 5389 | 5589 | 5.2   | 4.8  |
| 15 | 6398 | 3388 | 5939 | 7535 | 8699 | 9614 | 0369 | 1011 | 1568 | 2061 | 2503 | 2902 | 3267 | 3602 | 3912 | 4200 | 4469 | 4721 | 4958 | 5181 | 5392 | 5592 | 6.5   | 6.0  |
| 16 | 6678 | 3445 | 5972 | 7557 | 8716 | 9628 | 0380 | 1020 | 1577 | 2069 | 2510 | 2909 | 3273 | 3608 | 3917 | 4205 | 4473 | 4725 | 4962 | 5185 | 5396 | 5596 | 7.8   | 7.2  |
| 17 | 6942 | 3502 | 6003 | 7580 | 8733 | 9642 | 0392 | 1030 | 1586 | 2077 | 2517 | 2915 | 3279 | 3613 | 3922 | 4209 | 4478 | 4729 | 4965 | 5188 | 5399 | 5599 | 9.1   | 8.4  |
| 18 | 7190 | 3558 | 6035 | 7602 | 8749 | 9655 | 0403 | 1040 | 1594 | 2085 | 2524 | 2921 | 3284 | 3618 | 3927 | 4214 | 4482 | 4733 | 4969 | 5192 | 5402 | 5602 | 10.4  | 9.6  |
| 19 | 7425 | 3613 | 6066 | 7623 | 8766 | 9669 | 0415 | 1050 | 1603 | 2092 | 2531 | 2928 | 3290 | 3624 | 3932 | 4219 | 4486 | 4737 | 4973 | 5196 | 5406 | 5605 | 11.7  | 10.8 |
| 20 | 7648 | 3668 | 6097 | 7645 | 8783 | 9682 | 0426 | 1060 | 1612 | 2100 | 2538 | 2934 | 3296 | 3629 | 3937 | 4223 | 4491 | 4741 | 4977 | 5199 | 5409 | 5609 | 11    | 9    |
| 21 | 7859 | 3722 | 6128 | 7667 | 8799 | 9696 | 0438 | 1070 | 1620 | 2108 | 2545 | 2940 | 3302 | 3634 | 3942 | 4228 | 4495 | 4745 | 4981 | 5203 | 5413 | 5612 | 1.1   | 0.9  |
| 22 | 8061 | 3775 | 6159 | 7688 | 8816 | 9709 | 0449 | 1080 | 1629 | 2115 | 2551 | 2947 | 3308 | 3640 | 3947 | 4232 | 4499 | 4749 | 4984 | 5206 | 5416 | 5615 | 2.2   | 1.8  |
| 23 | 8255 | 3828 | 6189 | 7710 | 8833 | 9723 | 0460 | 1089 | 1637 | 2123 | 2558 | 2953 | 3313 | 3645 | 3952 | 4237 | 4503 | 4753 | 4988 | 5210 | 5420 | 5618 | 3.3   | 2.7  |
| 24 | 8439 | 3880 | 6220 | 7731 | 8849 | 9736 | 0472 | 1099 | 1646 | 2131 | 2565 | 2959 | 3319 | 3650 | 3957 | 4242 | 4508 | 4757 | 4992 | 5213 | 5423 | 5621 | 4.4   | 3.6  |
| 25 | 8617 | 3931 | 6250 | 7752 | 8865 | 9750 | 0483 | 1109 | 1655 | 2138 | 2572 | 2965 | 3325 | 3655 | 3961 | 4246 | 4512 | 4761 | 4996 | 5217 | 5426 | 5625 | 5.5   | 4.5  |
| 26 | 8787 | 3982 | 6279 | 7773 | 8882 | 9763 | 0494 | 1118 | 1663 | 2146 | 2579 | 2972 | 3331 | 3661 | 3966 | 4251 | 4516 | 4765 | 5000 | 5221 | 5430 | 5628 | 6.6   | 5.4  |
| 27 | 8951 | 4032 | 6309 | 7794 | 8898 | 9776 | 0505 | 1128 | 1672 | 2153 | 2586 | 2978 | 3336 | 3666 | 3971 | 4255 | 4521 | 4769 | 5003 | 5224 | 5433 | 5631 | 7.7   | 6.3  |
| 28 | 9109 | 4082 | 6339 | 7815 | 8914 | 9789 | 0516 | 1138 | 1680 | 2161 | 2593 | 2984 | 3342 | 3671 | 3976 | 4260 | 4525 | 4773 | 5007 | 5228 | 5436 | 5634 | 8.8   | 7.2  |
| 29 | 9261 | 4131 | 6368 | 7836 | 8930 | 9803 | 0527 | 1147 | 1689 | 2169 | 2600 | 2990 | 3348 | 3677 | 3981 | 4264 | 4529 | 4777 | 5011 | 5231 | 5440 | 5638 | 9.9   | 8.1  |
| 7  | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9     | 9    |







|    | 220  | 230  | 240  | 250  | 260  | 270  | 280  | 290  | 300  | 310  | 320  | 330  | 340  | 350  | 360  | 370  | 380  | 390  | 400  | 410  | 420  | 430  | 440  | P.P.  |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 0  | 5736 | 5919 | 6093 | 6259 | 6418 | 6570 | 6716 | 6856 | 6990 | 7118 | 7242 | 7361 | 7476 | 7586 | 7692 | 7795 | 7893 | 7989 | 8081 | 8169 | 8255 | 8338 | 8418 | 4     |
| 1  | 5739 | 5922 | 6096 | 6262 | 6421 | 6573 | 6718 | 6858 | 6992 | 7120 | 7244 | 7363 | 7477 | 7588 | 7694 | 7796 | 7895 | 7990 | 8082 | 8171 | 8257 | 8339 | 8419 | 1 0.4 |
| 2  | 5742 | 5925 | 6099 | 6265 | 6424 | 6575 | 6721 | 6860 | 6994 | 7123 | 7246 | 7365 | 7479 | 7590 | 7696 | 7798 | 7897 | 7992 | 8084 | 8172 | 8258 | 8341 | 8420 | 2 0.8 |
| 3  | 5745 | 5928 | 6102 | 6268 | 6426 | 6578 | 6723 | 6863 | 6996 | 7125 | 7248 | 7367 | 7481 | 7591 | 7697 | 7800 | 7898 | 7993 | 8085 | 8174 | 8259 | 8342 | 8422 | 3 1.2 |
| 4  | 5748 | 5931 | 6104 | 6270 | 6429 | 6580 | 6726 | 6865 | 6998 | 7127 | 7250 | 7369 | 7483 | 7593 | 7699 | 7801 | 7900 | 7995 | 8087 | 8175 | 8261 | 8343 | 8423 | 4 1.6 |
| 5  | 5751 | 5934 | 6107 | 6273 | 6431 | 6583 | 6728 | 6867 | 7001 | 7129 | 7252 | 7371 | 7485 | 7595 | 7701 | 7803 | 7901 | 7997 | 8088 | 8177 | 8262 | 8345 | 8424 | 5 2.0 |
| 6  | 5754 | 5937 | 6110 | 6276 | 6434 | 6585 | 6730 | 6869 | 7003 | 7131 | 7254 | 7373 | 7487 | 7597 | 7703 | 7805 | 7903 | 7998 | 8090 | 8178 | 8264 | 8346 | 8426 | 6 2.4 |
| 7  | 5758 | 5940 | 6113 | 6278 | 6437 | 6588 | 6733 | 6872 | 7005 | 7133 | 7256 | 7375 | 7489 | 7599 | 7704 | 7806 | 7905 | 8000 | 8091 | 8180 | 8265 | 8347 | 8427 | 7 2.8 |
| 8  | 5761 | 5943 | 6116 | 6281 | 6439 | 6590 | 6735 | 6874 | 7007 | 7135 | 7258 | 7377 | 7491 | 7600 | 7706 | 7808 | 7906 | 8001 | 8093 | 8181 | 8266 | 8349 | 8428 | 8 3.2 |
| 9  | 5764 | 5945 | 6119 | 6284 | 6442 | 6592 | 6737 | 6876 | 7009 | 7137 | 7260 | 7379 | 7492 | 7602 | 7708 | 7810 | 7908 | 8003 | 8094 | 8182 | 8268 | 8350 | 8429 | 9 3.6 |
| 10 | 5767 | 5948 | 6121 | 6286 | 6444 | 6595 | 6740 | 6878 | 7012 | 7139 | 7262 | 7380 | 7494 | 7604 | 7710 | 7811 | 7910 | 8004 | 8096 | 8184 | 8269 | 8351 | 8431 |       |
| 11 | 5770 | 5951 | 6124 | 6289 | 6447 | 6598 | 6742 | 6881 | 7014 | 7141 | 7264 | 7382 | 7496 | 7606 | 7711 | 7813 | 7911 | 8006 | 8097 | 8185 | 8270 | 8353 | 8432 |       |
| 12 | 5773 | 5954 | 6127 | 6292 | 6449 | 6600 | 6744 | 6883 | 7016 | 7144 | 7266 | 7384 | 7498 | 7607 | 7713 | 7815 | 7913 | 8007 | 8099 | 8187 | 8272 | 8354 | 8433 |       |
| 13 | 5776 | 5957 | 6130 | 6295 | 6452 | 6603 | 6747 | 6885 | 7018 | 7146 | 7268 | 7386 | 7500 | 7609 | 7715 | 7816 | 7914 | 8009 | 8100 | 8188 | 8273 | 8355 | 8435 |       |
| 14 | 5779 | 5960 | 6133 | 6297 | 6454 | 6605 | 6749 | 6887 | 7020 | 7148 | 7270 | 7388 | 7502 | 7611 | 7716 | 7818 | 7916 | 8010 | 8102 | 8190 | 8275 | 8357 | 8436 |       |
| 15 | 5782 | 5963 | 6135 | 6300 | 6457 | 6607 | 6752 | 6890 | 7022 | 7150 | 7272 | 7390 | 7504 | 7613 | 7718 | 7820 | 7918 | 8012 | 8103 | 8191 | 8276 | 8358 | 8437 |       |
| 16 | 5785 | 5966 | 6138 | 6303 | 6460 | 6610 | 6754 | 6892 | 7025 | 7152 | 7274 | 7392 | 7505 | 7615 | 7720 | 7821 | 7919 | 8014 | 8105 | 8193 | 8277 | 8359 | 8439 |       |
| 17 | 5789 | 5969 | 6141 | 6305 | 6462 | 6612 | 6756 | 6894 | 7027 | 7154 | 7276 | 7394 | 7507 | 7616 | 7722 | 7823 | 7921 | 8015 | 8106 | 8194 | 8279 | 8361 | 8440 |       |
| 18 | 5792 | 5972 | 6144 | 6308 | 6465 | 6615 | 6759 | 6896 | 7029 | 7156 | 7278 | 7396 | 7509 | 7618 | 7723 | 7825 | 7922 | 8017 | 8108 | 8195 | 8280 | 8362 | 8441 |       |
| 19 | 5795 | 5975 | 6147 | 6311 | 6467 | 6617 | 6761 | 6899 | 7031 | 7158 | 7280 | 7398 | 7511 | 7620 | 7725 | 7826 | 7924 | 8018 | 8109 | 8197 | 8282 | 8363 | 8442 |       |
| 20 | 5798 | 5978 | 6149 | 6313 | 6470 | 6620 | 6763 | 6901 | 7033 | 7160 | 7282 | 7400 | 7513 | 7622 | 7727 | 7828 | 7926 | 8020 | 8111 | 8198 | 8283 | 8365 | 8444 | 3     |
| 21 | 5801 | 5981 | 6152 | 6316 | 6472 | 6622 | 6766 | 6903 | 7035 | 7162 | 7284 | 7402 | 7515 | 7624 | 7728 | 7830 | 7927 | 8021 | 8112 | 8200 | 8284 | 8366 | 8445 | 1 0.3 |
| 22 | 5804 | 5984 | 6155 | 6319 | 6475 | 6625 | 6768 | 6905 | 7037 | 7164 | 7286 | 7404 | 7517 | 7625 | 7730 | 7831 | 7929 | 8023 | 8114 | 8201 | 8286 | 8367 | 8446 | 2 0.6 |
| 23 | 5807 | 5987 | 6158 | 6321 | 6477 | 6627 | 6770 | 6908 | 7040 | 7166 | 7288 | 7406 | 7518 | 7627 | 7732 | 7833 | 7930 | 8024 | 8115 | 8203 | 8287 | 8369 | 8448 | 3 0.9 |
| 24 | 5810 | 5990 | 6161 | 6324 | 6480 | 6629 | 6773 | 6910 | 7042 | 7168 | 7290 | 7407 | 7520 | 7629 | 7734 | 7835 | 7932 | 8026 | 8117 | 8204 | 8289 | 8370 | 8449 | 4 1.2 |
| 25 | 5813 | 5992 | 6163 | 6327 | 6483 | 6632 | 6775 | 6912 | 7044 | 7171 | 7292 | 7409 | 7522 | 7631 | 7735 | 7836 | 7934 | 8027 | 8118 | 8205 | 8290 | 8371 | 8450 | 5 1.5 |
| 26 | 5816 | 5995 | 6166 | 6329 | 6485 | 6634 | 6777 | 6914 | 7046 | 7173 | 7294 | 7411 | 7524 | 7632 | 7737 | 7838 | 7935 | 8029 | 8120 | 8207 | 8291 | 8373 | 8451 | 6 1.8 |
| 27 | 5819 | 5998 | 6169 | 6332 | 6488 | 6637 | 6780 | 6917 | 7048 | 7175 | 7296 | 7413 | 7526 | 7634 | 7739 | 7840 | 7937 | 8031 | 8121 | 8208 | 8293 | 8374 | 8453 | 7 2.1 |
| 28 | 5822 | 6001 | 6172 | 6335 | 6490 | 6639 | 6782 | 6919 | 7050 | 7177 | 7298 | 7415 | 7528 | 7636 | 7740 | 7841 | 7938 | 8032 | 8122 | 8210 | 8294 | 8375 | 8454 | 8 2.4 |
| 29 | 5825 | 6004 | 6174 | 6337 | 6493 | 6642 | 6784 | 6921 | 7053 | 7179 | 7300 | 7417 | 7529 | 7638 | 7742 | 7843 | 7940 | 8034 | 8124 | 8211 | 8295 | 8377 | 8455 | 9 2.7 |
|    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    |       |



|    | 220  | 230  | 240  | 250  | 260  | 270  | 280  | 290  | 300  | 310  | 320  | 330  | 340  | 350  | 360  | 370  | 380  | 390  | 400  | 410  | 420  | 430  | 440  | P. P  |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 30 | 5828 | 6007 | 6177 | 6340 | 6495 | 6644 | 6787 | 6923 | 7055 | 7181 | 7302 | 7419 | 7531 | 7640 | 7744 | 7844 | 7941 | 8035 | 8125 | 8213 | 8297 | 8378 | 8457 | 2     |
| 31 | 5831 | 6010 | 6180 | 6342 | 6498 | 6646 | 6789 | 6926 | 7057 | 7183 | 7304 | 7421 | 7533 | 7641 | 7746 | 7846 | 7943 | 8037 | 8127 | 8214 | 8298 | 8379 | 8458 | 1 0.2 |
| 32 | 5834 | 6013 | 6183 | 6345 | 6500 | 6649 | 6791 | 6928 | 7059 | 7185 | 7306 | 7423 | 7535 | 7643 | 7747 | 7848 | 7945 | 8038 | 8128 | 8216 | 8300 | 8381 | 8459 | 2 0.4 |
| 33 | 5838 | 6016 | 6186 | 6348 | 6503 | 6651 | 6794 | 6930 | 7061 | 7187 | 7308 | 7425 | 7537 | 7645 | 7749 | 7849 | 7946 | 8040 | 8130 | 8217 | 8301 | 8382 | 8460 | 3 0.6 |
| 34 | 5841 | 6019 | 6188 | 6350 | 6505 | 6654 | 6796 | 6932 | 7063 | 7189 | 7310 | 7427 | 7539 | 7647 | 7751 | 7851 | 7948 | 8041 | 8131 | 8218 | 8302 | 8383 | 8462 | 4 0.8 |
| 35 | 5844 | 6021 | 6191 | 6353 | 6508 | 6656 | 6798 | 6935 | 7065 | 7191 | 7312 | 7428 | 7540 | 7648 | 7752 | 7853 | 7949 | 8043 | 8133 | 8220 | 8304 | 8385 | 8463 | 5 1.0 |
| 36 | 5847 | 6024 | 6194 | 6356 | 6510 | 6659 | 6801 | 6937 | 7068 | 7193 | 7314 | 7430 | 7542 | 7650 | 7754 | 7854 | 7951 | 8044 | 8134 | 8221 | 8305 | 8386 | 8464 | 6 1.2 |
| 37 | 5850 | 6027 | 6197 | 6358 | 6513 | 6661 | 6803 | 6939 | 7070 | 7195 | 7316 | 7432 | 7544 | 7652 | 7756 | 7856 | 7953 | 8046 | 8136 | 8223 | 8306 | 8387 | 8466 | 7 1.4 |
| 38 | 5853 | 6030 | 6199 | 6361 | 6515 | 6663 | 6805 | 6941 | 7072 | 7197 | 7318 | 7434 | 7546 | 7654 | 7757 | 7858 | 7954 | 8047 | 8137 | 8224 | 8308 | 8389 | 8467 | 8 1.6 |
| 39 | 5856 | 6033 | 6202 | 6364 | 6518 | 6666 | 6808 | 6943 | 7074 | 7199 | 7320 | 7436 | 7548 | 7655 | 7759 | 7859 | 7956 | 8049 | 8139 | 8225 | 8309 | 8390 | 8468 | 9 1.8 |
| 40 | 5859 | 6036 | 6205 | 6366 | 6521 | 6668 | 6810 | 6946 | 7076 | 7201 | 7322 | 7438 | 7550 | 7657 | 7761 | 7861 | 7957 | 8050 | 8140 | 8227 | 8311 | 8391 | 8469 |       |
| 41 | 5862 | 6039 | 6208 | 6369 | 6523 | 6671 | 6812 | 6948 | 7078 | 7203 | 7324 | 7440 | 7551 | 7659 | 7763 | 7863 | 7959 | 8052 | 8142 | 8228 | 8312 | 8393 | 8471 |       |
| 42 | 5865 | 6042 | 6210 | 6371 | 6526 | 6673 | 6814 | 6950 | 7080 | 7205 | 7326 | 7442 | 7553 | 7661 | 7764 | 7864 | 7960 | 8053 | 8143 | 8230 | 8313 | 8394 | 8472 |       |
| 43 | 5868 | 6045 | 6213 | 6374 | 6528 | 6675 | 6817 | 6952 | 7082 | 7208 | 7328 | 7444 | 7555 | 7662 | 7766 | 7866 | 7962 | 8055 | 8145 | 8231 | 8315 | 8395 | 8473 |       |
| 44 | 5871 | 6047 | 6216 | 6377 | 6531 | 6678 | 6819 | 6955 | 7085 | 7210 | 7330 | 7445 | 7557 | 7664 | 7768 | 7867 | 7964 | 8056 | 8146 | 8233 | 8316 | 8397 | 8475 |       |
| 45 | 5874 | 6050 | 6219 | 6379 | 6533 | 6680 | 6821 | 6957 | 7087 | 7212 | 7332 | 7447 | 7559 | 7666 | 7769 | 7869 | 7965 | 8058 | 8148 | 8234 | 8317 | 8398 | 8476 |       |
| 46 | 5877 | 6053 | 6221 | 6382 | 6536 | 6683 | 6824 | 6959 | 7089 | 7214 | 7334 | 7449 | 7561 | 7668 | 7771 | 7871 | 7967 | 8060 | 8149 | 8235 | 8319 | 8399 | 8477 |       |
| 47 | 5880 | 6056 | 6224 | 6385 | 6538 | 6685 | 6826 | 6961 | 7091 | 7216 | 7336 | 7451 | 7562 | 7669 | 7773 | 7872 | 7968 | 8061 | 8150 | 8237 | 8320 | 8401 | 8478 |       |
| 48 | 5883 | 6059 | 6227 | 6387 | 6541 | 6687 | 6828 | 6963 | 7093 | 7218 | 7338 | 7453 | 7564 | 7671 | 7774 | 7874 | 7970 | 8063 | 8152 | 8238 | 8322 | 8402 | 8480 |       |
| 49 | 5886 | 6062 | 6230 | 6390 | 6543 | 6690 | 6831 | 6966 | 7095 | 7220 | 7340 | 7455 | 7566 | 7673 | 7776 | 7876 | 7971 | 8064 | 8153 | 8240 | 8323 | 8403 | 8481 |       |
| 50 | 5889 | 6065 | 6232 | 6392 | 6546 | 6692 | 6833 | 6968 | 7097 | 7222 | 7342 | 7457 | 7568 | 7675 | 7778 | 7877 | 7973 | 8066 | 8155 | 8241 | 8324 | 8405 | 8482 |       |
| 51 | 5892 | 6068 | 6235 | 6395 | 6548 | 6695 | 6835 | 6970 | 7099 | 7224 | 7344 | 7459 | 7570 | 7676 | 7780 | 7879 | 7975 | 8067 | 8156 | 8242 | 8326 | 8406 | 8483 |       |
| 52 | 5895 | 6070 | 6238 | 6398 | 6551 | 6697 | 6837 | 6972 | 7102 | 7226 | 7345 | 7461 | 7571 | 7678 | 7781 | 7880 | 7976 | 8069 | 8158 | 8244 | 8327 | 8407 | 8485 |       |
| 53 | 5898 | 6073 | 6240 | 6400 | 6553 | 6699 | 6840 | 6974 | 7104 | 7228 | 7347 | 7462 | 7573 | 7680 | 7783 | 7882 | 7978 | 8070 | 8159 | 8245 | 8328 | 8409 | 8486 |       |
| 54 | 5901 | 6076 | 6243 | 6403 | 6556 | 6702 | 6842 | 6977 | 7106 | 7230 | 7349 | 7464 | 7575 | 7682 | 7785 | 7884 | 7979 | 8072 | 8161 | 8247 | 8330 | 8410 | 8487 |       |
| 55 | 5904 | 6079 | 6246 | 6405 | 6558 | 6704 | 6844 | 6979 | 7108 | 7232 | 7351 | 7466 | 7577 | 7683 | 7786 | 7885 | 7981 | 8073 | 8162 | 8248 | 8331 | 8411 | 8489 |       |
| 56 | 5907 | 6082 | 6249 | 6408 | 6561 | 6707 | 6847 | 6981 | 7110 | 7234 | 7353 | 7468 | 7579 | 7685 | 7788 | 7887 | 7982 | 8075 | 8164 | 8249 | 8332 | 8412 | 8490 |       |
| 57 | 5910 | 6085 | 6251 | 6411 | 6563 | 6709 | 6849 | 6983 | 7112 | 7236 | 7355 | 7470 | 7580 | 7687 | 7790 | 7889 | 7984 | 8076 | 8165 | 8251 | 8334 | 8414 | 8491 |       |
| 58 | 5913 | 6087 | 6254 | 6413 | 6566 | 6711 | 6851 | 6985 | 7114 | 7238 | 7357 | 7472 | 7582 | 7689 | 7791 | 7890 | 7986 | 8078 | 8167 | 8252 | 8335 | 8415 | 8492 |       |
| 59 | 5916 | 6090 | 6257 | 6416 | 6568 | 6714 | 6853 | 6988 | 7116 | 7240 | 7359 | 7474 | 7584 | 7690 | 7793 | 7892 | 7987 | 8079 | 8168 | 8254 | 8336 | 8416 | 8494 |       |
|    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9     |







# Log. Sinus 68°—89°.

|    | 680  | 690  | 700  | 710  | 720  | 730  | 740  | 750  | 760  | 770  | 780  | 790  | 800  | 810  | 820  | 830  | 840  | 850  | 860  | 870  | 880  | 890  | P. P. |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 0  | 9672 | 9702 | 9730 | 9757 | 9782 | 9806 | 9828 | 9849 | 9869 | 9887 | 9904 | 9919 | 9934 | 9946 | 9958 | 9968 | 9976 | 9983 | 9989 | 9994 | 9997 | 9999 |       |
| 2  | 9673 | 9702 | 9731 | 9758 | 9783 | 9807 | 9829 | 9850 | 9870 | 9888 | 9905 | 9920 | 9934 | 9947 | 9958 | 9968 | 9976 | 9984 | 9990 | 9994 | 9997 | 9999 |       |
| 4  | 9674 | 9703 | 9732 | 9758 | 9784 | 9808 | 9830 | 9851 | 9870 | 9888 | 9905 | 9920 | 9934 | 9947 | 9958 | 9968 | 9977 | 9984 | 9990 | 9994 | 9997 | 9999 |       |
| 6  | 9675 | 9704 | 9733 | 9759 | 9785 | 9808 | 9831 | 9851 | 9871 | 9889 | 9906 | 9921 | 9935 | 9947 | 9959 | 9968 | 9977 | 9984 | 9990 | 9994 | 9997 | 9999 |       |
| 8  | 9676 | 9705 | 9734 | 9760 | 9785 | 9809 | 9831 | 9852 | 9872 | 9890 | 9906 | 9921 | 9935 | 9948 | 9959 | 9969 | 9977 | 9984 | 9990 | 9995 | 9998 | 0000 |       |
| 10 | 9677 | 9706 | 9734 | 9761 | 9786 | 9810 | 9832 | 9853 | 9872 | 9890 | 9907 | 9922 | 9936 | 9948 | 9959 | 9969 | 9977 | 9985 | 9990 | 9995 | 9998 | 0000 |       |
| 12 | 9678 | 9707 | 9735 | 9762 | 9787 | 9811 | 9833 | 9853 | 9873 | 9891 | 9907 | 9922 | 9936 | 9949 | 9960 | 9969 | 9978 | 9985 | 9990 | 9995 | 9998 | 0000 |       |
| 14 | 9679 | 9708 | 9736 | 9763 | 9788 | 9811 | 9833 | 9854 | 9873 | 9891 | 9908 | 9923 | 9937 | 9949 | 9960 | 9970 | 9978 | 9985 | 9991 | 9995 | 9998 | 0000 |       |
| 16 | 9680 | 9709 | 9737 | 9764 | 9789 | 9812 | 9834 | 9855 | 9874 | 9892 | 9908 | 9923 | 9937 | 9949 | 9960 | 9970 | 9978 | 9985 | 9991 | 9995 | 9998 | 0000 |       |
| 18 | 9681 | 9710 | 9738 | 9764 | 9789 | 9813 | 9835 | 9855 | 9875 | 9892 | 9909 | 9924 | 9937 | 9950 | 9961 | 9970 | 9978 | 9985 | 9991 | 9995 | 9998 | 0000 |       |
| 20 | 9682 | 9711 | 9739 | 9765 | 9790 | 9814 | 9836 | 9856 | 9875 | 9893 | 9909 | 9924 | 9938 | 9950 | 9961 | 9971 | 9979 | 9986 | 9991 | 9995 | 9998 | 0000 |       |
| 22 | 9683 | 9712 | 9740 | 9766 | 9791 | 9814 | 9836 | 9857 | 9876 | 9894 | 9910 | 9925 | 9938 | 9951 | 9961 | 9971 | 9979 | 9986 | 9991 | 9995 | 9998 | 0000 |       |
| 24 | 9684 | 9713 | 9741 | 9767 | 9792 | 9815 | 9837 | 9857 | 9876 | 9894 | 9910 | 9925 | 9939 | 9951 | 9962 | 9971 | 9979 | 9986 | 9991 | 9996 | 9998 | 0000 |       |
| 26 | 9685 | 9714 | 9742 | 9768 | 9793 | 9816 | 9838 | 9858 | 9877 | 9895 | 9911 | 9926 | 9939 | 9951 | 9962 | 9971 | 9979 | 9986 | 9992 | 9996 | 9998 | 0000 |       |
| 28 | 9686 | 9715 | 9743 | 9769 | 9793 | 9817 | 9838 | 9859 | 9878 | 9895 | 9911 | 9926 | 9940 | 9952 | 9962 | 9972 | 9980 | 9986 | 9992 | 9996 | 9998 | 0000 |       |
| 30 | 9687 | 9716 | 9743 | 9770 | 9794 | 9817 | 9839 | 9859 | 9878 | 9896 | 9912 | 9927 | 9940 | 9952 | 9963 | 9972 | 9980 | 9987 | 9992 | 9996 | 9999 | 0000 |       |
| 32 | 9688 | 9717 | 9744 | 9770 | 9795 | 9818 | 9840 | 9860 | 9879 | 9896 | 9912 | 9927 | 9940 | 9952 | 9963 | 9972 | 9980 | 9987 | 9992 | 9996 | 9999 | 0000 |       |
| 34 | 9689 | 9718 | 9745 | 9771 | 9796 | 9819 | 9841 | 9861 | 9880 | 9897 | 9913 | 9928 | 9941 | 9953 | 9963 | 9973 | 9980 | 9987 | 9992 | 9996 | 9999 | 0000 |       |
| 36 | 9690 | 9719 | 9746 | 9772 | 9797 | 9820 | 9841 | 9861 | 9880 | 9897 | 9913 | 9928 | 9941 | 9953 | 9964 | 9973 | 9981 | 9987 | 9992 | 9996 | 9999 | 0000 |       |
| 38 | 9691 | 9720 | 9747 | 9773 | 9797 | 9820 | 9842 | 9862 | 9881 | 9898 | 9914 | 9929 | 9942 | 9954 | 9964 | 9973 | 9981 | 9987 | 9992 | 9996 | 9999 | 0000 |       |
| 40 | 9692 | 9721 | 9748 | 9774 | 9798 | 9821 | 9843 | 9863 | 9881 | 9899 | 9914 | 9929 | 9942 | 9954 | 9964 | 9973 | 9981 | 9988 | 9993 | 9996 | 9999 | 0000 |       |
| 42 | 9693 | 9722 | 9749 | 9775 | 9799 | 9822 | 9843 | 9863 | 9882 | 9899 | 9915 | 9929 | 9943 | 9954 | 9965 | 9974 | 9981 | 9988 | 9993 | 9997 | 9999 | 0000 |       |
| 44 | 9694 | 9722 | 9750 | 9775 | 9800 | 9823 | 9844 | 9864 | 9883 | 9900 | 9915 | 9930 | 9943 | 9955 | 9965 | 9974 | 9982 | 9988 | 9993 | 9997 | 9999 | 0000 |       |
| 46 | 9695 | 9723 | 9751 | 9776 | 9801 | 9823 | 9845 | 9865 | 9883 | 9900 | 9916 | 9930 | 9943 | 9955 | 9965 | 9974 | 9982 | 9988 | 9993 | 9997 | 9999 | 0000 |       |
| 48 | 9696 | 9724 | 9751 | 9777 | 9801 | 9824 | 9845 | 9865 | 9884 | 9901 | 9916 | 9931 | 9944 | 9955 | 9966 | 9975 | 9982 | 9988 | 9993 | 9997 | 9999 | 0000 |       |
| 50 | 9697 | 9725 | 9752 | 9778 | 9802 | 9825 | 9846 | 9866 | 9884 | 9901 | 9917 | 9931 | 9944 | 9956 | 9966 | 9975 | 9982 | 9989 | 9993 | 9997 | 9999 | 0000 |       |
| 52 | 9698 | 9726 | 9753 | 9779 | 9803 | 9826 | 9847 | 9867 | 9885 | 9902 | 9917 | 9932 | 9945 | 9956 | 9966 | 9975 | 9983 | 9989 | 9994 | 9997 | 9999 | 0000 |       |
| 54 | 9699 | 9727 | 9754 | 9780 | 9804 | 9826 | 9847 | 9867 | 9885 | 9902 | 9918 | 9932 | 9945 | 9956 | 9967 | 9975 | 9983 | 9989 | 9994 | 9997 | 9999 | 0000 |       |
| 56 | 9700 | 9728 | 9755 | 9780 | 9804 | 9827 | 9848 | 9868 | 9886 | 9903 | 9918 | 9933 | 9945 | 9957 | 9967 | 9976 | 9983 | 9989 | 9994 | 9997 | 9999 | 0000 |       |
| 58 | 9701 | 9729 | 9756 | 9781 | 9805 | 9828 | 9849 | 9868 | 9887 | 9904 | 9919 | 9933 | 9946 | 9957 | 9967 | 9976 | 9983 | 9989 | 9994 | 9997 | 9999 | 0000 |       |
|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 10    |







### Berichtigungen zu Teil III.

S. 22 gehört die Randnummer 33 in die unterste Zeile.

S. 75, Aufgabe 179 lies 4 *pro* statt *pro*.

S. 83, Nr. 77 u. S. 85, Nr. 36 u. 37 ist die Minutenzahl von  $\beta$  47 und nicht 57.

S. 98 ist die Verstärkung der unter dem Numerus 20 stehenden wagerechten Linie versehentlich unterblieben.

---























Schlegel, Victor,

Lehrbuch der elementaren Mathematik

Bd.: 3

1880

Math.u. 176 m-3

urn:nbn:de:bvb:12-bsb11652301-8